



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 02-03-2004

Αριθ. πρωτ.: 97439

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5  
Ταχ. Κώδικας: 101 64 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 36 17 103  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 212 45 08

ΠΡΟΣ: 1. ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.  
Βιλτανιώτη 36  
145 64 - Κηφισιά  
(με απόδειξη)  
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α) Διευθύνσεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
β) Διευθύνσεις Εμπορίου  
Έδρες τους  
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο φυτοπροστα-  
τευτικό προϊόν (ακαρεοκτόνο)  
TEMPER 80 EC ”

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 (ΦΕΚ 298/Α/1977) για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. 2) και 5 (παρ. 2 και 8).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15.5.97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97) Προεδρικό Διάταγμα.
4. Τη με αριθ. 75143/23.5.96 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 2069 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης φυτοπροστατευτικό προϊόν (ακαρεοκτόνο) COMITE 80 EC.
5. Τη με αριθ. 399580/30.10.2001 (ΦΕΚ 1479/Β/31.10.2001) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη".
6. Τις σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 19-12-2003 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.

## Αποφασίζουμε

**I.** Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **2099** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ακαρεοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** TEMPER 80 EC
2. **Μορφή:** Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** propargite 80% β/ο  
βοηθητικές ουσίες: 16,1% β/β
4. **Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** 90% min.
5. **Παρασκευαστής:** ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., Βιλτανιώτη 36, 145 64 – Κηφισιά.
6. **Αντιπρόσωπος:** -----
7. **Τυποποιητής:** ο παρασκευαστής.
8. **Συσκευαστής:** ο παρασκευαστής.
9. **Συσκευασία: 9α. Είδος-μέγεθος:** -Φιάλες των 100, 150, 200, 250, 350, 400, 500, 600, 800 κ.εκ. και 1 λίτρου.  
-Δοχεία των 3, 4, 5, 10 και 20 λίτρων.  
**9β. Υλικό:** Αδιαφανές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ή COEX.

**10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**  
Ακαρεοκτόνο που δρα δι' επαφής και με ατμούς. Έχει εκλεκτική δράση.

**11. Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.

**12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση με νερό. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**13. Φάσμα δράσης:**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./100 λίτρα νερό)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (5), (6)
<b>Αμυγδαλιά, καρυδιά</b>	-Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi) -Κίτρινος τετράνυχος (Tetranychus urticae) -Άλλα ακάρεα (Tetranychidae, κλπ.) -Aculus cornutus	60 – 70	Μετά τα μέσα Ιουνίου μέχρι αργά το καλοκαίρι, εναντίον των προνυμφών και ακμαίων και επανάληψη των ψεκασμών εφόσον χρειασθεί.
<b>Μηλιά (1)</b>	-Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi) -Κίτρινος τετράνυχος (Tetranychus urticae)	60 – 70	>>
<b>Πυρηνόκαρπα (κερασιά, βερικοκιά, βυσσινιά, δαμασκηνιά ροδακινιά) (2)</b>	-Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi) -Κίτρινος τετράνυχος (Tetranychus urticae) -Άλλα ακάρεα (Tetranychidae, κλπ.) -Aculus cornutus	60 – 70	>>

<b>Αμπέλι</b> (3)	-Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi) -Κίτρινος τετράνυχος (Tetranychus urticae, Tetranychus carpini, Tetranychus atlanticus, Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus mcDanieli)	60 – 70 (με 150 λίτρα ψεκαστικό υγρό ανά στρέμμα)	15–20 ημέρες μετά την άνθηση. Επανάληψη των ψεκασμών εφόσον χρειασθεί.
<b>Βαμβάκι</b> (4)	-Τετράνυχος (Tetranychus urticae)	70 – 180 κ.εκ./στρ.	Με την εμφάνιση των προνυμφών ή των ακμαίων

#### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Στις μηλιές δεν πρέπει να ψεκάζεται πριν από τα μέσα Ιουνίου. Μόνο 1–3 ψεκασμοί το χρόνο. Χρησιμοποιείτε 200–250 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα.
2. Μόνο 1–2 ψεκασμοί το χρόνο. Χρησιμοποιείτε 200–250 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα.
3. Ψεκάζετε μόνον (15–20 ημέρες μετά την άνθηση), σε αμπέλια που δεν υποφέρουν από ξηρασία, διάφορες ασθένειες, νηματώδεις κ.λ.π.
4. Μην ψεκάζετε νεαρό βαμβάκι, όταν είναι κάτω των 25 εκ. Χρησιμοποιείτε 40–50 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Το εύρος των δόσεων διαφοροποιείται ανάλογα με την ανάπτυξη των βαμβακοφύτων δηλ. 70 κ.εκ./στρ. για φυτά ύψους 25–30 εκ., 100 κ.εκ./στρ. για τα μεσαίου ύψους βαμβακόφυτα και 180 κ.εκ./στρ. για τα μεγάλου ύψους βαμβακόφυτα.
5. Για καλύτερα αποτελέσματα ψεκάζετε κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Γενικά μη ψεκάζετε όταν υπάρχουν προβλήματα ξηρασίας, διαφόρων ασθενειών προσβολές από νηματώδεις, τροφοπενίες ή όταν τα φυτά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πρέπει πάντα να γίνεται καλός ψεκασμός ώστε να επιτυγχάνεται καλό λούσιμο των φυτών και ειδικότερα των φύλλων και στις δύο επιφάνειες.
6. Η διάρκεια δράσης του σκευάσματος είναι μεγαλύτερη από 30 ημέρες, γι' αυτό οι ψεκασμοί πρέπει να επαναλαμβάνονται μόνον εφ' όσον εμφανισθούν εκ νέου τα ακάρεα.

#### **14. Φυτοτοξικότητα:**

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής, εφόσον ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

#### **15. Συνδυαστικότητα:**

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης και θερινούς πολτούς, όπου οι ψεκασμοί δεν πρέπει να γίνονται πριν περάσουν 30 ημέρες από τον τελευταίο ψεκασμό τους. Σε περίπτωση ανάμιξης με περισσότερα σκευάσματα, καλό είναι να γίνεται προηγουμένως μία δοκιμή συνδυαστικότητας, με μικρή ποσότητα φαρμάκου σε μικρή έκταση.

#### **16. Σήμανση τοξικότητας: Xn – Επικίνδυνο, Xi – Ερεθιστικό.**

#### **17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

**R10** Εύφλεκτο.

**R20/21/22** Βλαβερό όταν εισπνέετε, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης.

**R38/36** Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

#### **18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R & RO φράσεις):**

**RO3** Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

**RO4/RO7** Πολύ τοξικό για τα ψάρια και γενικά για τους υδρόβιους οργανισμούς.

## 19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.  
**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
**S15/16** Μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα.  
**S20/21** Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.  
**S23** Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό.  
**S24/25** Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.  
**S26** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
**S27** Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό.  
**S35** Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με τρύπημα. Η χρήση τους για οποιοδήποτε σκοπό είναι επικίνδυνη.  
**S36** Φοράτε κατάλληλη μάσκα και γάντια.  
**SY4** Φοράτε γυαλιά.  
**SY10** Μην αυξάνετε τις δόσεις.  
**SY11** Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.  
**SY12** Κρατείστε μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή άσχετα πρόσωπα μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

## 20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

**S45** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα).

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.**

## 21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

**SO3** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

## 22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

**A1** Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.  
Απαγορεύεται η εφαρμογή του κοντά σε επίγεια χερσαία ύδατα.  
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

## 23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

**Π1** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

-Μηλιές, πυρηνόκαρπα: 7 ημέρες.

-Βαμβάκι: 14 ημέρες.

-Λοιπές καλλιέργειες: 21 ημέρες.

## 24. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης :

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

## II. Κείμενο ετικέτας:

**α.** Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 22 (παρ. 1) του Ν. 721/77 και με την παρούσα Απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**ΠΙ. α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2008**.

**β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ**