



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 2-3-2004

Αριθ. Πρωτ.: 97416

**Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας : 101 64 ΑΘΗΝΑ**

TELEFAX: 3617103

**Πληροφορίες: Α.Φονταρά
Τηλέφωνο: 212 44 98**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(απολυμαντικό εδάφους),
SODAM BLUE 32 SL**

**ΠΡΟΣ: 1) Παπαοικονόμου Αγροχημικά ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Τ.Θ. 89**

**570 22 Σίνδος, Θεσ/νίκη
(Με απόδειξη)**

2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

α) Δ/σεις Γεωργίας

Έδρες τους

β) Δ/σεις Εμπορίου

Έδρες τους

3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό

Ινστιτούτο

Τμήμα Ελέγχου

Γεωργικών Φαρμάκων

Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

4) Τμήματα Β', Γ' και Ε' της Δ/σής μας

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 «για τη έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ.2, το άρθρο 5, παρ.8, το άρθρο 6, παρ. β και το άρθρο 9.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας για «την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων » Κεφ Β.,παρ.1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88)απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 75133/23-5-96 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ.6639 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιο με το αιτούμενο σκεύασμα SODAM 32 SL.
5. Τη με αριθ. 399580/30-10-2001 (Β'1479/31-10-2001) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη».
6. Τις από 15-5-03 και 3-12-03 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 3-12-03 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **6944** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο), με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα** : SODAM BLUE 32 SL
2. **Μορφή** : Πυκνό διάλυμα (SL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση**: metham sodium 32 % β/ο,
βοηθητικές ουσίες 32,81% β/β
4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται το σκεύασμα: 42 % β/β min (51 % β/ο min) του οίκου Tamisco, Βέλγιο.
5. **Παρασκευαστής**: ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΑΒΒΕ ,ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 89, 57022 Σίνδος
6. **Αντιπρόσωπος**: -
7. **Τυποποιητής**: Ο παρασκευαστής
8. **Συσκευαστής**: Ο παρασκευαστής
9. **Συσκευασία**.: **9α. Είδος -Μέγεθος**: Δοχεία 10, 15, 20, 25 και 30 λίτρων
9β. Υλικό : Πλαστικό πολυαιθυλενίου (HDPE)

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:

Απολυμαντικό για την απολύμανση εδάφους, πριν την εγκατάσταση των καλλιεργειών. Καταπολεμά ορισμένους νηματώδεις, μύκητες εδάφους και βλαστώντες σπόρους ζιζανίων. Επίσης χρησιμοποιείται για την απολύμανση μιγμάτων χρώματος (κομπόστες). Δρα με τους ατμούς ισοθειοκυανικού μεθυλίου που παράγονται κατά τη διάσπασή του στο έδαφος.

11. Τρόπος εφαρμογής:

Η εφαρμογή του ανάλογα με την έκταση που πρόκειται να απολυμανθεί, γίνεται με ποτιστήρι, με ψεκαστήρα, με τεχνητή βροχή καθώς και με ειδικούς εγχυτήρες όταν εφαρμόζεται στις γραμμές σποράς ή φύτευσης.

12. Τρόπος παρασκευής του διαλύματος.

Προσθέτουμε τη συνιστώμενη δόση σκευάσματος στην ανάλογη ποσότητα νερού και αφού αναδεύσουμε κάνουμε στη συνέχεια την εφαρμογή.

13. Φάσμα δράσης

13.1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ

ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ

Εκτός από τους
κυστονηματώδεις
όπως του γένους
Heterodera

ΜΥΚΗΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Φυτόφθορα
(Phytophthora spp)
Πύθιο
(Pythium spp)
Σκληρωτίνια
(Sclerotinia spp)
Φουζάριο
(Fusarium spp)
Βερτιτσίλλιο
(Verticillium spp)
Ριζοκτόνια
(Rhizoctonia spp)

ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κανονικά εδάφη

1,5-2 λίτρα σε 10 λίτρα
νερό για 10 τετρ. μέτρα
εδάφους

Βαριά και υγρά εδάφη

2,5 λίτρα σε 10 λίτρα νερό
για 10 τετρ. μέτρα
εδάφους

Πολύ βαριά-συνεκτικά

εδάφη

3 λίτρα σε 10 λίτρα νερό για
10 τετρ. μέτρα εδάφους

ZIZANIA

Βλαστώνοντες σπόροι
ζιζανίων σε βάθος μέχρι
25 εκατ. (Νεραγριάδα,
Λουβουδιά,
Γλυστρίδα, Σετάρια,
Αγριοτοματιά
Βέλιουρας κ.λ.π.)

Για τα ζιζάνια 0,8 λίτρα σε
10 λίτρα νερό για 10
τετρ.μέτρα εδάφους.
Ειδικά για την οξαλίδα 0,8
λίτρα σε 20 λίτρα νερό
για 10 τετρ.μέτρα.

13.2.ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΣ (κομπόστες)

2 λίτρα σε 10 λίτρα νερό
για 10 τετρ. μέτρα χώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.Απολύμανση εδάφους

Το έδαφος που θα απολυμανθεί πρέπει να είναι ψιλοχωματισμένο και να υπάρχει αρκετή εδαφική υγρασία (να βρίσκεται στο ρώγο του) και η θερμοκρασία του σε βάθος 10 εκ. πρέπει να κυμαίνεται από 10°-30°C.

Η εφαρμογή γίνεται έτσι ώστε η συνιστώμενη ποσότητα SODAM BLUE 32 SL να κατανεμηθεί ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του αγρού

Αμέσως μετά, συνιστάται ελαφρύ πότισμα με τεχνητή βροχή ώστε να δημιουργηθεί επιφανειακή κρούστα και να περιορίζεται έτσι η διαφυγή των αερίων από το έδαφος. Αν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα συνιστάται πότισμα με 10-15 λίτρα νερό ανά τετρ. μέτρο για τα σπορεία και 25-40 λίτρα για τις υπόλοιπες περιπτώσεις ώστε το SODAM BLUE 32 SL να πάει στο βάθος που πρέπει.

Εάν μετά την εφαρμογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος επικρατεί ξηρασία, πρέπει να γίνουν ελαφρά ποτίσματα τις επόμενες ημέρες.

Οκτώ (8) ημέρες, μετά την εφαρμογή του σκευάσματος πρέπει να γίνει ένα επιφανειακό φρεζάρισμα για να αεριστεί το χώμα χωρίς όμως να ανακατευθεί με μη απολυμασμένο χώμα.

2.Απολύμανση μιγμάτων χώματος (κομπόστα)

Απλώστε το μίγμα του χώματος (κομπόστα) σε προετοιμασμένο χώρο σε στρώμα πάχους 10 εκ. και ποτίστε με το σκευάσμα στη συνιστώμενη δόση και αμέσως μετά με 10-15 λίτρα νερό για κάθε τετραγωνικό μέτρο. Συνεχίστε την ίδια εργασία με το επόμενο στρώμα της κομπόστας. Μετά από 10-12 ημέρες από την εφαρμογή, αρχίστε το ανακάτεμα των διαφόρων στρωμάτων της κομπόστας, επαναλαμβάνοντας κάθε 2-3 ημέρες και συνολικά για 3-4 φορές ώστε να απελευθερωθούν οι ατμοί του ισοθειοκυανικού μεθυλίου. Η απολυμασμένη κομπόστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ

Η σπορά ή η φύτευση των καλλιεργειών μπορεί να γίνει:

α. 15 ημέρες μετά την εφαρμογή σε εδάφη ελαφρά ή μέσης σύστασης

β. 20 ημέρες μετά την εφαρμογή σε εδάφη βαριά, υγρά και συνεκτικά

γ. 30 ημέρες μετά την εφαρμογή αν κατά την εφαρμογή του και μετά από αυτή επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.

Τα ανωτέρω χρονικά όρια απαιτούνται για να απαλλαγεί το έδαφος από τους παραγόμενους ατμούς.

-Στον καπνό να χρησιμοποιείται η μικρή δόση για κάθε τύπο εδάφους και να γίνεται κάλυψη με πλαστικό αμέσως μετά την εφαρμογή.

-Μη το χρησιμοποιείτε όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 32°C.

-Μην το χρησιμοποιείτε σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από άλλες καλλιέργειες.

14.Φυτοτοξικότητα:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες εφόσον εφαρμόζεται στις δόσεις και με τους τρόπους που συνιστάται.

15.Συνδυαστικότητα:

Το σκεύασμα δεν συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Εφαρμόζεται μόνο του.

16.Σημάνσεις.Τοξικότητας: Χη, Επικίνδυνο , Χι, Ερεθιστικό Σταυρός του Αγίου Ανδρέα

17.Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R.Φράσεις):

(R10) Εύφλεκτο.

(R22) Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.

(R36/37/38) Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

18.Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

(R05) Τοξικό για τα ψάρια.

19.Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

(S 1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

(S 13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε μην καπνίζετε.

(S23) Μην αναπνέετε τους ατμούς του σκευάσματος ή του διαλύματος.

(S24/25) Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

(S26) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

(S28) Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπουνί και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

(S36/37/39) Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών /προσώπου.

(S44) Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

(S46) Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα

(S51) Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

(SY8) Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

(SY11) Μη ρυπαίνετε νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του.

20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης και εφόσον ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του προκαλέστε εμετό με μηχανικό ερεθισμό του φάρυγγα με μη αιχμηρό αντικείμενο και ζητήστε ιατρική συμβουλή

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο-Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις(A φράσεις):

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών(Π φράσεις):

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρήστε το στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό και σκιερό, μακριά από πηγές θερμότητας. Σ'αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II.Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 ,παρ.1 του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III.α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2008.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

IV. Ανακαλούμε τη με αριθ. **6639** οριστική έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο), **SODAM 32 SL**, της παρασκευάστριας εταιρείας ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Β.Ε., που χορηγήθηκε με την αριθ. **75133/23-5-96** απόφασή μας.

Τυχόν υπάρχοντα αποθέματα του προϊόντος επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρις εξαντλήσεως τους και όχι αργότερα από τις **30-6-2004**.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ