



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 10 - 9 - 2007
Αριθ. πρωτ: 121782

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 250
e-mail: syg036@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60.064 / 17-7-2006 έγκρισης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν FOSETYL AL DGA 80 WP (μυκητοκτόνο) ως προς το εμπορικό όνομα, τον κάτοχο της έγκρισης, τον παρασκευαστή, τον υπεύθυνο για την τελική συσκευασία και σήμανση, το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, το εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος, το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος και το χρόνο λήξης της έγκρισης»

Προς: SAPEC AGRO SA
Alameda dos Oceanos lote
1.06.1.1 – 3ª Parque das
Nasçoes,
1990-207 Lisboa, Portugal
Δια της
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.,
θέση ΝΤΡΑΣΕΖΑ (ΒΙ.ΠΑ),
Τ.Κ. 190 11 ΑΥΛΩΝΑΣ –
ΑΤΤΙΚΗ

(με απόδειξη)

- Κοιν.:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
 3. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
 4. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
 5. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
 6. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
 7. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
 8. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/νσής μας
- Γραμματεία της Δ/νσής μας
9. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Την με αρ.πρωτ. 120039/17-7-2006 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60.064 έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FOSETYL AL DGA 80 WP** (μυκητοκτόνο)
3. Την Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 116076/9-2-2007 (Β'261/28-2-2007) με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία της Επιτροπής, την Οδηγία 2006/64/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2006για καταχώρηση στο Παρ/μα Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της δραστικής ουσίας fosetyl
4. Το με αρ. 123951/14-6-2005 έγγραφο μας στο οποίο αναφέρονται τα εθνικά Ανώτατα Ορια Υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας Fosetyl Al
5. Τη με αριθ. Υ 132/11-10-2004 (1533/Β/14-10-2004) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό»
6. Τη με αριθ 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού»
7. Την με αριθ. πρωτ 118582/24-4-2007 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 60.064 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **FOSETYL AL DGA 80 WP** που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 120039/17-7-2006 Υπουργική Απόφαση, ως προς το εμπορικό όνομα, τον κάτοχο της έγκρισης, τον υπεύθυνο για την τελική συσκευασία και σήμανση, τον παρασκευαστή, το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, το εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος και την ημερομηνία λήξης και η οποία διαμορφώνεται ως εξής

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

**60064/
17.07.06
30.04.11**

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

ETYLIT 80

1.2.β Μορφή

ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ (WP)

1.3 Δραστική ουσία

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

FOSETYL AL

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

96 % (β/β) min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

**INDUSTRIAS AFRASA SA -
ΙΣΠΑΝΙΑ**

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
**1. HANGZHOU MARCH CHEMICALS LABORATORY,
KINA**
2. SHANDONG DACHENG PESTICIDE CO., Ltd, KINA

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **fosetyl Al** προσδιορίζονται στο **Annex II - Doc J** της αίτησης με ημερομηνία 25/04/2007 (Αρ. Πρ. ΥΓ 118806) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης

SAPEC AGRO SA
Alameda dos Oceanos lote 1.06.1.1 –
3ª Parque das Nações,
1990-207 Lisboa, Portugal
Mr. CARLOS ESMERALDO
Τηλ.: 00 351 213222749
Fax: 00 351 213222735
E-mail: cesmeraldo@agro.saptec.pt

Υπεύθυνος επικοινωνίας
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
A.E.B.E., θέση ΝΤΡΑΣΕΖΑ (ΒΙ.ΠΑ),
T.K. 190 11 ΑΥΛΩΝΑΣ – ΑΤΤΙΚΗ ,
ΤΗΛ: 2295029350
Κα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Fax: 2295029305
E-mail: info@elton.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
A.E.B.E., θέση ΝΤΡΑΣΕΖΑ (ΒΙ.ΠΑ),
T.K. 190 11 ΑΥΛΩΝΑΣ – ΑΤΤΙΚΗ ,
ΤΗΛ: 2295029350
Κα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Fax: 2295029305
E-mail: info@elton.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SAPEC AGRO SA
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
SAPEC AGRO SA
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Δ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1) Herdade das Praias – 2910 Setúbal, Portugal,
Τηλ.: 0035 265710120**

**2) ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Θεσ/νίκη
Τ.Κ. 57022 – ΒΙ.ΠΕ.Θ. – Τ.Θ. 26
Τηλ.: 2310 569630 - 33
Fax: 2310 797047
E-mail: farmachem@otenet.gr**

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία **80 % (β/β)**
Βοηθητικές ουσίες **16,67 % β/β**
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στη Πρόταση DPD που υποβάλλεται συνημμένα της αίτησης με αριθ. πρωτ 118582/24-4-2007

2

Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερική σακούλα	100, 200, 300, 4000 γραμ και 1 κιλού	Σακούλα PE/PET, κουτί χάρτινο

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος, εμβάπτιση ριζώματος, ριζοπότισμα, ενσωμάτωση σε τεχνικά υποστρώματα, επάλειψη στο λαιμό του δένδρο

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Οι σακούλες και οι σάκοι ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλιεργ.περ. Μεσοδιάστ. Εφαρμογών σε ημέρες
		γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	γρ/ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Γκρέιπ -φρουτ)	Φυτόφθορα (Phytophthora parasitica, Phytophthora citrophthora)	250-300	500 - 1200	200 - 400	Ένας ψεκάσμος το μήνα, αρχίζοντας την περίοδο της ενεργού βλάστησης, όταν ο καιρός είναι υγρός ή ένα ψεκάσμο στους 2-4 μήνες όταν έχουμε ξηρασία. Συνολικά κάνουμε 3-4 ψεκάσμούς το χρόνο (τέλος Απρίλη-Μάη, Ιούνιο και Σεπτέμβρη). Για τη φυτόφθορα των καρπών ψεκάζουμε το φύλλωμα μία φορά το μήνα αρχίζοντας μόλις αλλάζει το χρώμα (1-2 ψεκάσμοι).	4
Μηλιά	Φυτόφθορα λαιμού και ριζών (Phytophthora cactorum)	250	250 - 500	100 - 200	3-4 ψεκάσμοι στην περίοδο της ενεργού βλάστησης (άνοιξη-αρχές καλοκαιριού).	4
Αμπέλι	Περονόσπορος (Plasmopara viticola)	250-300	125 - 450	50 - 150	Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.	4
Φράουλα	Σήψεις λαιμού (Phytophthora cactorum)	200-250 400	- 200 - 280	50 - 70	Εμβάπτιση του ριζώματος για 15 λεπτά πριν τη φύτευση ή ένας φυλλοψεκάσμος αμέσως μετά τη φύτευση.	2
Κρεμμύδια	Περονόσπορος (Peronospora destructor)	600	300	40 - 50	Ψεκάσμοι που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται δύο φορές το μήνα.	2
Τομάτα υπαίθρου	Περονόσπορος (Phytophthora infestans)	200-300	100 - 300	50 - 100	Ψεκάσμοι που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται δύο φορές το μήνα.	4

Τομάτα θερμοκηπίου	Περονόσπορος (Phytophthora infestans)	300-400	150 - 800	50 -200	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας	4 / 8-10
Αγγούρι, (Υ) Κολοκύθι (Υ)	Περονόσπορος (Pseudo- peronospora cubensis)	200-300	100 -240	50 – 80	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της ασθένειας, δύο ψεκασμοί το μήνα με καλό λούσιμο των φυτών. Σε περίπτωση έντονης προσβολής συνιστάται ο ψεκασμός ανά 10ήμερο, με τη μεγαλύτερη δόση.	4
Αγγούρι, (Θ) Κολοκύθι (Θ)			100 – 600	50 – 200		
Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθες			100 - 300	50 - 100		
Κουνουπίδι, Λάχανο	Περονόσπορος (Peronospora parasitica)		60 γρ./τετρ. μέτρο		Δύο ριζοποτίσματα: Ένα κατά την σπορά και ένα πριν τη μεταφύτευση.	2
Μαρούλι	Περονόσπορος (Bremia lactucae)		60 γρ./τετρ. μέτρο		Δύο ριζοποτίσματα: Ένα κατά τη σπορά και ένα πριν τη μεταφύτευση.	2
Πράσα	Περονόσπορος (Phytophthora capsici)		300	50 - 80	Ψεκασμοί που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται δύο φορές το μήνα.	4
Πατάτα	Περονόσπορος (Phytophthora infestans)	250-300	125 - 300	50 - 100	Ψεκασμοί που αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επαναλαμβάνονται 2 φορές το μήνα.	4
Λυκίσκος	Περονόσπορος (Pseudoperonos pora humuli)	250-300	750 - 1500	300 - 500	Ψεκασμοί: 1ος όταν η βλάστηση έχει μήκος 5-10 εκ., και 2ος όταν φθάσει 20-30 εκ.	2
Καπνός	Περονόσπορος (Peronospora tabacina)	250-300	125 - 300	50 - 100	Προληπτικοί ψεκασμοί που αρχίζουν μία εβδομάδα μετά το σταύρωμα των φυτών στο σπορείο και ψεκασμοί στο χωράφι κάθε 14 ημέρες στην περίοδο που υπάρχει κίνδυνος προσβολής.	4
Κωνοφόρα	Προσβολή από Phytophthora cactorum	250	750 - 1250	300 - 500	Ψεκασμός μία φορά το μήνα στη διάρκεια της ανάπτυξης (συνολικά 2 ψεκασμοί).	2
Καλλωπιστικά (Φυτόρια- Σπορεία)	Φυτόφθορα (Phytophthora spp)		400 γρ./ κυβ.μέτρο χώματος. 10 γρ. / τετρ.μέτρο		Εφαρμόζεται με ενσωμάτωση στο μίγμα χώματος. Ριζοπότισμα αμέσως μετά τη φύτευση ή	4

					μεταφύτευση. Επανάληψη μία φορά το μήνα.	
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ						
<p>1. Στην τομάτα, πεπόνι και αγγούρι, η μεγάλη δόση χρησιμοποιείται όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή σε ασθένεια που εκδηλώνεται.</p> <p>2. Στην μηλιά για τη φυτόφθορα λαιμού συνιστάται επιπλέον η επάλειψη με πινέλο στο λαιμό του δέντρου με πυκνό διάλυμα 150 – 200 γρ./λίτρο νερό.</p> <p>3. Στις καλλιέργειες αμπέλι, μηλιά, πατάτα και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων</p>						

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

9 Σήμανση σκευάσματος:

Xi - Ερεθιστικό
N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10 Φράσεις R

R32 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

11 Φράσεις S

(S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
(S13) Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε.
(S22) Μην αναπνέετε τη σκόνη
(S26) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
(S36/37/39) Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
(S41) Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς
(S43) Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), αφρό ή χημική ουσία σε σκόνη. «Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό»
(S46) Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
(S61) Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
(S64) Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό
Για να αποφύγετε κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε στον παθόντα, εάν έχει τις αισθήσεις του, 2-3 ποτήρια νερό και μία κουταλιά σιρόπι IPECAC για να προκληθεί εμετός. Εάν δεν έχει προκληθεί εμετός σε 20 λεπτά, επαναλάβετε ακόμη μία φορά τη χορήγηση σιροπιού. Διαφορετικά προκαλέστε εμετό με το δάκτυλο. Μην προκαλείτε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του ή βρίσκεται σε σύγχυση. Σε όλες τις περιπτώσεις ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:(210) 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg

Τα εθνικά Ανώτατα Ορια Υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας Fosetyl Α αναφέρονται στο με αρ. 123951/14-6-2005 έγγραφο μας

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Γκρέϊπ -φρουτ)	3
Μηλιά	3
Αμπέλι	14
Φράουλα	14
Κρεμμύδια	3
Τομάτα υπαίθρου / θερμοκηπίου	3
Κολοκύθι (Θ), Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθες	3
Αγγούρι	1
Κουνουπίδι	3
Λάχανο	14
Μαρούλι	14
Πράσο	3
Πατάτα	3
Λυκίσκος	3

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος¹.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Η έγκριση θα ανακληθεί :

1) Στις 31-10-2007 εάν ,μετά την εξέταση των στοιχείων , αποδειχθεί ότι η δραστική ουσία δεν είναι ισοδύναμη με αυτήν που καταχωρήθηκε στο Παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ή/ και δεν υπάρχουν οι ισοδύναμες μελέτες με αυτές που αναφέρεται ότι προστατεύονται στο παράρτημα III της έκθεσης εξέτασης (review report) που συνοδεύει την οδηγία καταχώρησης της δ.ο. ethephon

2) στις 31-10-2009 εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος III για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/

¹ Η ημερομηνία λήξης θα αναγράφεται στην ετικέτα εάν είναι μικρότερη των δύο (2) ετών

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ

ΣΤ. ΣΕΝΗ