



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 18 - 10 - 2006

Αριθ. Πρωτ: 122166

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Τ.Κ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 7228
FAX: 210 92 12 090

ΠΡΟΣ:1) BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Αιγιάλειας 48
151 25 Μαρούσι
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.:1) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

Έδρες τους

3) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)

Έδρες τους

4) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής έγκρισης στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν, (ζιζανιοκτόνο),
BUTISAN 40/10 SC

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 8, (παρ. 2 και 3) και άρθρο 9 (παρ. 1)
2. Τις διατάξεις του Ν. 2538/27-11-1997 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-1997), άρθρο 1, παρ. 2 α.
3. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Την από 23-6-2006 αίτηση της εταιρείας BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ι. Χορηγούμε στην εταιρεία BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. **προσωρινή** έγκριση διάθεσης στην αγορά διάρκειας τεσσάρων (4) ετών με αριθμό **7795** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** BUTISAN
- 2. Μορφή:** Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC).
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** metazachlor 40% β/ο,
quinmerac 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες : 54.3% β/β.
- 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
 - 4α. metazachlor 94% min
 - 4β. quinmerac 98% min
- 5 α. Παρασκευαστής της δ.ο. :** Metazachlor, BASF Aktiengesellschaft, Γερμανία
Quinmerac, BASF Aktiengesellschaft, Γερμανία.
 - β. Εργοστάσιο/α παρασκευής της δ.ο.:** A) Metazachlor: BASF Aktiengesellschaft, Γερμανία,
B) Quinmerac: Ruetgers-Nease, Η.Π.Α.,
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Αιγιαλείας 48, 151 25 Μαρούσι.
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,
Αιγιαλείας 48, 151 25 Μαρούσι.
- 7. α. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** BASF Aktiengesellschaft, Γερμανία.
β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: BASF Agri-Production, Γαλλία.
- 8. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** BASF Agri-Production, Γαλλία.
- 9. Συσκευασία: 9α. Είδος-Μέγεθος :** Φιάλες των πεντακοσίων (500) κ.εκ., ενός (1) λίτρου, πέντε (5) και δέκα (10) λίτρων.
9β. Υλικό : Φιάλες HDPE
Σύνολο συσκευασιών: τέσσερις (4)
- 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:** Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο κατά των ετήσιων αγρωστωδών και πλατυφύλλων ζιζανίων στην χειμερινή ελαιοκράμβη.
- 11. Τρόπος εφαρμογής:** Το BUTISAN 40/10 SC είναι ένα ζιζανιοκτόνο για χρήση μετασπαρτικά, προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά, της ελαιοκράμβης.
- 12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**
Ανακινείτε καλά το BUTISAN 40/10 SC πριν από την εφαρμογή. Προτού το χρησιμοποιήσετε, ρυθμίστε το ψεκαστικό ώστε να εφαρμόζει την απαιτούμενη ποσότητα ψεκαστικού υγρού και ενεργοποιείτε το σύστημα ανάδευσης. Γεμίστε τα 3/4 του δοχείου με νερό και αναδεύοντας διαρκώς προσθέστε τις αναγκαίες ποσότητες BUTISAN 40/10 SC. Αφήστε τον αναδευτήρα σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και έως το τέλος του ψεκασμού. Αποφύγετε τις διακοπές κατά τον ψεκασμό.
Στα πλαίσια της ορθής γεωργικής πρακτικής, ξεπλύνετε 3 φορές τις συσκευασίες και αδειάστε το νερό της απόπλυσης στο δοχείο ψεκασμού.

13. Φάσμα δράσης

ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο
		κ. εκ. σκευάσματος /στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού, λίτρα / στρέμμα		
Ελαιοκράμβη	Πλατύφυλλα και Αγρωστώδη ζιζάνια	1) 200-250 (1) 2) 200-250 3) α) 150 β) 100	20-40 (2)	Ανάλογα με τις κλιματικές και καλλιεργητικές συνθήκες που επικρατούν συνιστάται εφαρμογή: 1) Προφυτρωτικά της ελαιοκράμβης και εντός 3 ημερών από τη σπορά ή 2) Μεταφυτρωτικά της ελαιοκράμβης, και πριν από τη βλάστηση των ζιζανίων έως το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων των ζιζανίων ή 3) Τμηματική εφαρμογή, προφυτρωτικά και μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας.	2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οι δόσεις εφαρμογής καθορίζονται από τον πληθυσμό των ζιζανίων. Σε μεγάλο πληθυσμό ζιζανίων εφαρμόζεται η μεγάλη δόση.
2. Το εύρος αυτό συνιστάται στις περιπτώσεις ζιζανιοκτόνων με εφαρμογές εδάφους, προφυτρωτικές ή νωρίμεταφυτρωτικές, για να καλύψει όλα τα είδη των ψεκαστικών μηχανημάτων του παραγωγού και τα διάφορα ανάγλυφα του εδάφους.
3. Μην αρδεύετε τις επόμενες 3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.
4. Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές: άνεμος, βροχή, έντονη ζέστη άνω των 25° C υπό σκιά.
5. Εφαρμόστε το προϊόν όταν ο καιρός είναι ήπιος για να προστατέψετε τις γειτονικές καλλιέργειες

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

1) Πλατύφυλλα ζιζάνια:

Ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*), Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), Κολλητσίδα (*Galium aparine*), Ζωχός πολυετής (*Sonchus arvensis*), Ζωχός τραχύς (*Sonchus asper*), Πορφυρό λάμιο (*Lamium purpureum*), Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*), Μυρόνι (*Scandix pecten-veneris*), Αγριοτομάτα (*Solanum nigrum*), Αναγαλίδα (*Anagalis arvensis*), Στελλάρια (*Stellaria media*), Βατράχιο (*Ranunculus arvensis*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum aviculare*), Λάπαθο (*Rumex* spp.), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), Σπέργουλα (*Spergula arvensis*), Θλάσπι (*Thlaspi arvensis*), Βερόνικα (*Veronica* spp.)

Η αποτελεσματικότητα του BUTISAN 40/10 SC είναι ικανοποιητική στην Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), στο Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*), στη Λουβουδιά (*Chenopodium* spp.). Η δράση του στο *Geranium* spp., στη *Viola* spp. και στο Αγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*) μπορεί να είναι ακανόνιστη.

2) Αγρωστώδη ζιζάνια:

Αγρωστη (*Agrostis spica-venti*), Αιματόχορτο (*Digitaria* app.), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Πόα κοινή (*Poa annua*), Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*), Τραχεία λειβαδοπόα (*Poa trivialis*), Μικρή φάλαρη (*Phalaris minor*), Ήρα (*Lolium multiflorum*), Σετάρια (*Setaria* spp.).

Το BUTISAN 40/10 SC εφαρμοζόμενο προφυτρωτικά της ελαιοκράμβης είναι αποτελεσματικό κατά της Αγριοβρώμης (*Avena fatua*) εκτός των περιπτώσεων πολύ υψηλών πληθυσμών του ζιζανίου που απαιτούν την εφαρμογή ειδικού αγρωστωδοκτόνου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

SZ3 Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα μπορεί να επανασπορεί ελαιοκράμβη, εάν η προετοιμασία έχει ήδη γίνει το φθινόπωρο, μετά από επιφανειακό σκάλισμα του εδάφους.

Σε περίπτωση παρατεταμένης ξηρασίας το φθινόπωρο και το χειμώνα συνιστάται η επανασπορά:

1. Το χειμώνα με μαλακό σίτο, σκληρό σίτο και κριθάρι, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει γίνει καλή προετοιμασία του εδάφους και ότι η σπορά θα είναι πυκνότερη από ότι συνήθως.

2. Την άνοιξη με

α) μαλακό σίτο, κριθάρι και τριφύλλι, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει γίνει καλή προετοιμασία του εδάφους και ότι η σπορά θα είναι πυκνότερη από ότι συνήθως,

β) τεύτλα, αραβόσιτο, πατάτα, μπιζέλι, σόργο, εαρινή ελαιοκράμβη, λινάρι, ηλίανθο και σόγια, χωρίς περιορισμούς (ανεξάρτητα από την εργασία που έχει προηγηθεί στο έδαφος),

γ) φασόλι, λάχανο, βίκο, μηδική, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί άρωση βάθους 15 εκ.

3. Το επόμενο φθινόπωρο: όλες οι καλλιέργειες.

SZ7 Μην ψεκάσετε όταν φυσάει.

SZ8 Μην διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.

SZ11 Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.

SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύντε καλά τα ψεκαστικά μηχανήματα με νερό και απορρυπαντικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1) Προφυτρωτική

Σε περιπτώσεις, όπως:

- Σπορά που πραγματοποιήθηκε σε φυσιολογική εποχή για την περιοχή, σε κλιματικές συνθήκες που ευνοούν τη βλάστηση, την ανάπτυξη και το ριζικό σύστημα.
- Καλά προετοιμασμένο έδαφος, λεπτόκοκκο χωρίς σβόλους.
- Καλυμμένοι σπόροι σε βάθος 2 – 3 cm, το BUTISAN 40/10 SC να χρησιμοποιείται με μια εφαρμογή, κατά προτίμηση ακριβώς μετά τη σπορά ή μέσα στις 3 επόμενες μέρες. Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος εάν προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις αμέσως μετά τον ψεκασμό.

2) Μεταφυτρωτική

Σε περιπτώσεις, όπως:

- Πετρώδες ή πολύ σβολιασμένο έδαφος που δεν επιτρέπει την κατάλληλη κάλυψη των σπόρων.
- Υπερβολικά συμπαγές ή διηθημένο έδαφος.
- Υπερβολικά ξηρό έδαφος που προκαλεί προβλήματα στη βλάστηση.
- Καθυστερημένη σπορά της ελαιοκράμβης,

το BUTISAN 40/10 SC πρέπει να χρησιμοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν μετά τη βλάστηση της ελαιοκράμβης, δηλαδή με το «άνοιγμα των κοτυληδόνων – 1^ο μυτερό φύλλο» της ελαιοκράμβης, στην πρώιμη βλάστηση. Προσοχή: Το οριακό διάστημα εφαρμογής εξαρτάται μόνο από το στάδιο των ζιζανίων. Το BUTISAN 40/10 SC είναι αποτελεσματικό πριν από τη βλάστησή τους ή όταν αυτά είναι όσο το δυνατόν πιο νεαρά. Σε κάθε περίπτωση, μην εφαρμόζετε το προϊόν μετά το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων των ζιζανίων. Στην πρώιμη αυτή εφαρμογή τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα, διότι το έδαφος θα είναι αρκετά υγρό για να ευνοήσει την κατανομή των δραστικών ουσιών στην επιφανειακή στρώση του εδάφους, επιτρέποντας μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης από τις ρίζες των ζιζανίων.

3) Τμηματική εφαρμογή, συνδυασμός προφυτρωτικής + μεταφυτρωτικής

Σε δύσκολες συνθήκες σποράς, συνιστάται επίσης η τμηματική εφαρμογή σε 2 δόσεις. Η πρώτη εφαρμογή στο προφυτρωτικό στάδιο εξασφαλίζει από νωρίς την απαλλαγή του εδάφους από τα ζιζάνια, ενώ η δεύτερη εφαρμογή στο μεταφυτρωτικό στάδιο εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα και εμποδίζει την επανεμφάνιση των ζιζανίων την άνοιξη.

Συνιστάται λοιπόν η 1^η εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά και προφυτρωτικά με δόσεις 150 κ.εκ./στρέμμα και, στη συνέχεια, μια 2^η εφαρμογή μεταφυτρωτικά, ανάλογα με τον πληθυσμό των ζιζανίων, από το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων της ελαιοκράμβης με δόση 100 κ.εκ. BUTISAN 40/10 SC /στρέμμα.

14. Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας.

15. Συνδυαστικότητα:

Προφυτρωτική εφαρμογή

Μπορείτε να συνδυάσετε το BUTISAN 40/10 SC ακριβώς πριν από την εφαρμογή μαζί με υγρό λίπασμα. Σε περίπτωση όπου υπάρχει φόβος τροφοπενίας βορίου, μπορείτε να προσθέσετε στο μίγμα ψεκασμού λίπασμα βορίου.

16. Σημάνσεις: Xi – Ερεθιστικό,

N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R43 – Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R & RO φράσεις):

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Ζώνη στην οποία το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται όσον αφορά την απόσταση από προσωρινούς ή μόνιμους όγκους νερού: 20 μέτρα.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν το χρησιμοποιείτε.

S24 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα.

S37 Φοράτε κατάλληλα γάντια.

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικές οδηγίες: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα. Εάν προκληθούν προβλήματα, ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την συσκευασία, την ετικέτα και/ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε τα αμέσως με τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση εισπνοής: Διατηρήστε τον άσχοντα ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύντε το στόμα αμέσως και πιείτε αρκετό νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΓΙΑΤΡΟΙ : Συστήνεται συμπτωματική θεραπεία, δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

S35 Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

S57 Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Π1 - Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή : ---

Μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs) σε σπόρο ελαιοκράμβης για το metazachlor: 0,05 ppm

Μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs) σε σπόρο ελαιοκράμβης για το quinmerac: 0,05 ppm

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Παραμένει σταθερό τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευόμενο στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από το ηλιακό φως και την υγρασία και σε θερμοκρασία από -5°C έως 40°C .

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III . Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **18 – 10 – 2010.**

IV. Η εταιρεία BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε να ενημερώνει την Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη ποσότητα και τη περιοχή όπου θα χρησιμοποιείται το BUTISAN 40/10 SC τον πρώτο μήνα μετά την εφαρμογή του κάθε χρόνο, και να αναφέρει κάθε παρατήρηση φαινομένων που έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω έγκριση.

V. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου καθώς και τις τυχόν παρενέργειες του ανήκει στην εταιρεία BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

α.α.

Θ. ΝΟΤΟΣ