



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 21 -11 - 2006

Αριθ. Πρωτ.: 122863

Ταχ.Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα
FAX: 210-92 12 090
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210-928 7228

ΠΡΟΣ: ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ

Περιβοίας 6
145 64 – Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ
(Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο

Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

Έδρες τους

3) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)

Έδρες τους

4) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής μας

5) Γραμματεία της Δ/σής μας

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της έγκρισης
του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (φυτορρυθμιστική
ουσία), GIBBER 4 SL,
ως προς το φάσμα δράσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-1997 (Α' 104/30-5-1997) για "την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί" και ειδικότερα το άρθρο 4, (παρ. 6) και το άρθρο 8, (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Β, παρ. 1, 7.
3. Τη με αριθμό 107813/6-7-2004 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 8144 έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας μορφής και μεγαλύτερης περιεκτικότητας φυτοπροστατευτικό προϊόν BERELEX 4 SL.
4. Τη με αριθ. Υ132/11-10-2004 (Β' 1533/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
5. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (Β' 1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με "Έντολή Υφυπουργού"».
6. Την από 31-10-2006 αίτηση της εταιρείας ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ, για την τροποποίηση της έγκρισης του σκευάσματός της GIBBER 4 SL.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. **8138**, οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία), **GIBBER 4 SL**, (δ.ο. gibberellic acid 4%), με παρασκευαστή την εταιρεία **ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 105234/3-7-2003 απόφασή μας ως προς το φάσμα δράσης και συγκεκριμένα η παράγραφος 13 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

13. Φάσμα δράσης:

| ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΟΣΗ (κ.εκ./100 λτ νερό) | Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα | Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--|---|
| ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: | | | | | |
| Γκρέιπ φρουτ | Για παράταση του χρόνου συγκομιδής | 25-37,5 | 200-400 | Όταν οι καρποί στην περιφέρεια του δέντρου εμφανίσουν τα πρώτα συμπτώματα κιτρινίσματος. | 1 |
| Λεμόνια | 1. Για συντόμηση του χρόνου συγκομιδής σε πολύφορες ποικιλίες, 2. για καθυστέρηση της συγκομιδής σε όλες τις ποικιλίες και 3. για αύξηση του μεγέθους του καρπού | 12,5-25 | 200-300 | Όταν οι περισσότεροι καρποί έχουν χρώμα από βαθύ πράσινο έως ελαφρό κίτρινο. | 1 |
| Κλημεντίνες | 1. Για αύξηση της καρπόδεσης και της παραγωγής σε δέντρα με χαμηλή παραγωγικότητα | 25-62,5 | 200-300 | Στην πλήρη άνθηση. | 1 |

| | | | | | |
|---|---|-------|---------|--|---|
| | 2. για παράταση του χρόνου συγκομιδής | 25 | | Αφού συγκομίσετε τους καρπούς, οι οποίοι βρίσκονται στην περιφέρεια του δέντρου και οι οποίοι ωριμάζουν νωρίς. | |
| Πορτοκάλια (εκτός ποικιλίας Valencia): | 1. Για παράταση του χρόνου συγκομιδής, 2. για βελτίωση της αντοχής του φλοιού του καρπού κατά την παραμονή στο δέντρο. | 25 | 300-400 | Για καλύτερα αποτελέσματα ψεκάστε μόλις το χρώμα του καρπού αρχίσει να αλλάζει από πράσινο σε κιτρινωπό. Εάν δεν επιδιώκετε μεγάλη καθυστέρηση της συγκομιδής, ψεκάστε αφού οι καρποί πάρουν το εμπορικό χρώμα τους. | 1 |
| | 3. Για περιορισμό των απωλειών που οφείλονται σε ρυτίδωση ή «φούσκωμα» του φλοιού κατά την εποχή συγκομιδής. | 25-50 | | 3-6 εβδομάδες πριν από την αλλαγή του χρώματος. | |
| ΜΗΛΟΕΙΔΗ | | | | | |
| Αχλάδια | 1. Για αύξηση του ποσοστού καρπόδεσης σε ποικιλίες που δε δένουν ικανοποιητικά. | 12,5 | 100 | Στην αρχή της άνθησης. | 1 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------------------|-------|---|---|
| | 2. Για ικανοποιητική καρπόδεση μετά την καταστροφή των ανθέων από παγετό. (1) | 37,5-62,5 | | | |
| ΣΤΑΦΥΛΙΑ: | | | | | |
| Άσπερμα: | | | | | |
| 1. Σουλτανίνα για επιτραπέζια χρήση: | Για αύξηση του ποσοστού καρπόδεσης σε ποικιλίες που δε δένουν. | 50-100 | 100 | Στο διάστημα από την πλήρη άνθηση (όταν δηλαδή το 70% των πλιδίων έχει πέσει) και μέχρις ότου οι ράγες αποκτήσουν μέγεθος 3 mm (σκαγιού). (2) | 2 |
| 2. Σουλτανίνα για παραγωγή σταφίδας: | Για αύξηση της παραγωγής και του μεγέθους της ράγας, όταν είναι μικρότερο του κανονικού. | 5-20 | | Ψεκάστε κατά το δέσιμο και όταν οι ράγες έχουν αποκτήσει μέγεθος 3 mm (σκαγιού). | 1 |
| 3. Μαύρη Κορινθιακή (σταφίδα): | Για βελτίωση της ποιότητας και αποφυγή του σχισίματος των ραγών. | 2,5-12,5 (3) | | Ψεκάστε προσεκτικά με GIBBER 4 SL όταν έχουν πέσει όλα τα πλιδία | 1 |
| ΛΑΧΑΝΙΚΑ | | | | | |
| Αγκινάρες | 1. Για πρωίμηση της αγκινάρας, 2. για βελτίωση της ποιότητας και 3. για αύξηση της παραγωγής. | 6,25-12,5 κ.εκ. σε 15 λίτρα νερό | 40-50 | Όταν εμφανιστούν 6-8 φύλλα ή 8-12 φύλλα για φυτά ενός έτους. (4) | 3 |
| ΠΑΤΑΤΑ: | 1. Για προβλάστηση του πατατόσπορου και 2. για αύξηση της παραγωγής | 25 κ.εκ. σε 600 λίτρα νερό | | Βυθίστε τους κονδύλους είτε κομμένους είτε όχι για 4 λεπτά σε διάλυμα του σκευάσματος. | 1 |

Παρατηρήσεις: Το GIBBER 4 SL πρέπει να εφαρμόζεται με προσθήκη προσκολλητικού σε όλες τις καλλιέργειες εκτός από τα λαχανικά. Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσεως του προσκολλητικού.

(1) Πρέπει να προσέξετε ώστε να μη συμβεί υπερβολική καρπόδεση.

(2) Προσέξτε ώστε να βραχούν καλά τα τσαμπιά. Για καλύτερα αποτελέσματα, ψεκάστε δυο φορές:
α) όταν το 70% των πιλιδίων έχουν πέσει (στην πλήρη άνθηση) και β) κατά την καρπόδεση, δηλαδή 5-12 ημέρες μετά τον πρώτο ψεκασμό, ανάλογα με τις οικολογικές συνθήκες της περιοχής.

(3) Προσθέστε 15-20 ppm PCPA (1,5-2 g PCPA σε 100 κιλά νερό).

(4) Συνιστώνται 3 συνολικά ψεκασμοί σε διαστήματα 15-20 ημερών μεταξύ τους. Πρέπει να αυξηθεί συγχρόνως η λίπανση κατά 30% και να εξασφαλιστεί η επαρκής άρδευση. Το νερό πρέπει να είναι κατάλληλο για άρδευση. Εάν το νερό άρδευσης είναι αλατούχο, πρέπει να αποφεύγεται η πολύ πρόωμη χρήση του GIBBER 4 SL.

II. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η αριθ. 105234/3-7-2003 απόφασή μας.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ