



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 24 - 6 - 2009
Αριθ. πρωτ: 129966

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 928 7161
e-mail: syg036@minagric.gr

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
152 31 - Χαλάνδρι
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(μυκητοκτόνο) BUMPER 25 EC ”

- Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού
κ. Σ. Χατζηγάκη
2. Γραφείο Υφυπουργού
κ. Κ. Κιλτίδη
3. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
4. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
5. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
6. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
7. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
8. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/νσής μας
-Γραμματεία της Δ/νσής μας
9 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. (1) και το Παράρτημα VI αυτού.
2. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».
4. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
5. Την ΚΥΑ 111095/22-9-2003 (ΦΕΚ 1577/Β/22-9-2003) των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καταχωρήθηκε στο Παράρτημα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστική ουσία beta-cyfluthrin
6. Τη γνωμοδότηση του **Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ** για το 2^ο θέμα της 8^{ης}/28-5-2009 Συνεδρίασής του.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 206/19-9-2007 (ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την με αριθμό 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής διεύθυνσης Προϊσταμένους Διεύθυνσης και προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υπουργού”».
9. Την από 30 -5-2007 αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο 4 παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **BUMPER 25 EC** της εταιρεία ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60.256

24-6-2009

31-5-2014

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

BUMPER

1.2.β Μορφή

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Propiconazole

(ομάδα τριαζολών /DMI)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

930 g/kg min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

IRVITA Plant Protection N.V. - Netherlands
Antilles

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.¹

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης Milenia Agrociencias SA Brazil

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική
πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I
της παρούσας)

:

¹ Αναγράφεται η διεύθυνση του κατόχου του εργοστασίου. Τα στοιχεία που αφορούν την διεύθυνση του εργοστασίου παραμένουν στα αρχεία της υπηρεσίας.

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας PROPICONAZOLE προσδιορίζονται στο Review Report της Οδηγίας 2003/70/EK για την καταχώρηση στο Παρ/μα Ι της Οδηγίας 91/414 της δ.ο ,κατατέθηκαν με την από 30-5-2007 (αρ.πρωτ.ΥΑΑκ Τρ 1197050) αίτηση της εταιρείας και παραμένουν και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Τ.Κ.: 15231- Αθήνα
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: martha.paissiou@alfagro.gr
technical@alfagro.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ΜΑΚΗΤΕSHIM CHEMICAL WORKS LTD
-ΙΣΡΑΗΛ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ΜΑΚΗΤΕSHIM CHEMICAL WORKS LTD
-ΙΣΡΑΗΛ

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1) ΜΑΚΗΤΕΣΗΜ CHEMICAL WORKS LTD
-ΙΣΡΑΗΛ

2) ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Διεύθυνση εργοστασίου:

Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας

Ταχ. Δ/ση:

32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας

Τηλ.: 2262 – 30821-3

FAX: 2262 – 30820

E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Propiconazole 25 % β/ο,
Βοηθητικές ουσίες 73 % β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 30-5-25007 (αρ.πρωτ.ΥΑΑκ Τρ 1197050) α αναφέρεται στο Part C του registration report και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2

Συσκευασίες

2.2 Συσκευασίες: 17 (Δέκαεπτά)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Φιαλίδια	20 & 30 κ.εκ.	Πλαστικό τύπου HDPE ή COEX με κατάλληλα πώματα ασφαλείας μέσα σε χαρτοκιβώτια τύπου ΚΣΚ
	Φιάλες ή Δοχεία	50, 60, 75, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 κ.εκ. και 1 & 5 λίτρα	Πλαστικό τύπου HDPE ή COEX με κατάλληλα πώματα ασφαλείας μέσα σε χαρτοκιβώτια τύπου ΚΣΚ

3

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες

Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμοί φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:
Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος, αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε στην συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των τριαζολικών μυκητοκτόνων της κατηγορίας των DMIs, με προστατευτική και θεραπευτική δράση.
Δρα παρεμποδίζοντας την βιοσύνθεση της εργοστερόλης.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο – Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Κ.εκ/ στρέμμα (max)	Κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Σιτάρι,	Ωίδιο (<i>Erysiphe graminis</i>) Σκωρίαση (<i>Puccinia</i> spp) Σεπτορίαση (<i>Septoria</i> spp.)	50		20-100	Ψεκασμός φυλλώματος, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών	2 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-21 ημέρες εφ' όσον απαιτείται
Σίκαλη	Ωίδιο (<i>Erysiphe graminis</i>) Σκωρίαση (<i>Puccinia recondita</i>) Ρυγχοσπορίωση (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	50	-	20-100		

Πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά)	Φαιά σήψη (<i>Monilinia laxa</i>)	45	20-30	100-150	Από το στάδιο της ρόδινης κορυφής έως την πτώση των πετάλων και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της ασθένειας	3 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-21 ημέρες εφ' όσον απαιτείται
Τριανταφυλλιά	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	15 max	10-15	100	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας	6 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-14 ημέρες εφ' όσον απαιτείται

Παρατηρήσεις

- 1) Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται

<p>Η χρήση στην καλλιέργεια του αμπελιού (επιτραπέζιου και οινοποιήσιμου) θα χορηγηθεί όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή</p>						
Αμπέλι	Ωίδιο (<i>Uncinula Erysiphe necator</i>)	20 max	10-20 (πριν-μετά την άνθηση)	50-100	Από το στάδιο που οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ. μέχρι την έναρξη της ωρίμασης και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της ασθένειας	3 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-21 ημέρες εφ' όσον απαιτείται
<p>Παρατηρήσεις</p> <p>2) Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος BUMPER 25 EC</p>						

<p>6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί</p>	<p><u>Διαχείριση ανθεκτικότητας</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Εφαρμόστε το BUMPER 25 EC προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές. • Εφαρμόστε το BUMPER 25 EC σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα.
---	---

<p>7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:</p> <ul style="list-style-type: none"> - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα 	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή</p> </div>
--	---

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής στις συνιστώμενες καλλιέργειες και στις Ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. Στην τριανταφυλλιά δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε υγρά φύλλα καθώς και σε θερμές ώρες της ημέρας.
---	--

9 Σήμανση σκευάσματος:	N- Επικίνδυνο για το περιβάλλον
-------------------------------	--

10 Φράσεις R	R51/53 «Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς». «Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον»
---------------------	--

11 Φράσεις S	<p> S 1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά S 13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές S 20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. S61 «Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένου ασφαλείας». SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του </p> <p style="text-align: center;"> ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ </p>
---------------------	---

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<p> Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Μην προκαλέστε εμετό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αντίδοτα: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 7793777. </p>
--------------------------------------	--

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRL's)

propiconazole

Φυτά ή φυτικά προϊόντα / Ζωικά προϊόντα	Προσωρινό mg/kg bw/day
Έχουν οριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά υπολείμματα οριστεί με τον κανονισμό 396/2005	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ροδακινιά, Βερικοκιά Νεκταρινιά	14
Σιτάρι, Κριθάρι	30
Τριανταφυκιά	---

Η παρακάτω τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή θα συμπληρωθεί όταν χορηγηθεί η χρήση στην καλλιέργεια του αμπελιού

Αμπέλι	14 ημέρες
--------	-----------

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο

15 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο Παράρτημα I (Annex I) του registration report καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

16 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι εταιρεία θα καταθέσει στοιχεία πιστοποίησης για τις μεθόδους ανάλυσης των υπολειμμάτων στα πυρηνόκαρπα φρούτα

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

ΕΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ

Ε. ΧΑΤΖΗ

Δ-7 (GAP)**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ****ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ**

Κοινή ονομασία ή κατά EEC, CIPAC and CCPR No (s): PROPICONAZOLE

Εμπορικό όνομα:

BUMPER 25 EC

Κύριες χρήσεις π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

: ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Ημερομ:

Σελίδα: 1

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιέργεια Και /ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	(A) (Θ) ή (K)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πρίν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρα- τηρήσεις
				Μορφή (δ-στ)	Περιεκ- σε δ.ο. (θ)	Μέθοδος /τρόπος (στ-η)	Στάδιο Ανάπτυξης και εποχή (ι)	Αριθμός Εφαρμο- γών Ελάχ. Μεγ. (κ)	χρονικό μεσο- διάστημα των εφαρμογ- ών (ελάχ.)	γρ δ.ο. / εκατό- λιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελάχ. μεγ.	Γρ. δ.ο./εκτάριο ελάχ. μεγ.		
Ροδακινιά, Βερικοκιά Νεκταρινιά	ΕΛΛΑΔΑ	A	Φαιά σήψη (Monilia laxa)	EC	250 g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	BBCH 51 - 88	1-3	10 - 21	5-7,5	1000-1500	5 – 10	14	3 x 0.6 L/ha
Σιτάρι,,	ΕΛΛΑΔΑ	A	Ωίδιο (Erysiphe graminis) Σκωριάσεις (Puccinia spp) Σεπτορίασεις (Septoria spp)	EC	250 g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	BBCH ≥ 20, Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	1 - 2	10 - 21		200-1000	12.5		
Σίκαλη	ΕΛΛΑΔΑ	A	Ωίδιο (Erysiphe graminis) Σκωριάσεις (Puccinia spp) (Septoria spp.)	EC	250 g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	BBCH ≥ 20, Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	1 - 2	10 - 21		200 - 1000	12.5	30	2 x 0.5 L/ha

Καλλιέργεια Και /ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	(A) (Θ) ή (K)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρα- τηρήσεις
				Μορφή (δ-στ)	Περιεκ σε δ.ο. (θ)	Μέθοδος /τρόπος (στ-η)	Στάδιο Ανάπτυξης και εποχή (ι)	Αριθμός Εφαρμο γών Ελάχ. Μεγ. (κ)	χρονικό μεσο- διάστημα μεταξύ των εφαρμογ ών (ελάχ.)	γρ δ.ο. / εκατό- λιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελάχ. μεγ.	Γρ. δ.ο./εκτάριο ελάχ. μεγ.		
			Ργχοσπορίωση, (<i>Rhynchosporium secalis</i>)				της ασθένειας							
Τριαντα- φυλλιά,	ΕΛΛΑΔΑ	A	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	EC	250 g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.	6	7 - 14	2,5-3.75	1000	3.75	--	6 x 0.4 L/ha

Η χρήση στην καλλιέργεια αμπέλι θα χορηγηθεί όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ

Αμπέλι	ΕΛΛΑΔΑ	A	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>)	EC	250 g/L	Ψεκασμός φυλλώματος	BBCH \geq 20	2 - 4	10 - 21	1,25-5	500-1000	5	14	4 x 0.2 L/ha χαμηλή δόση πριν την άνθηση, μεγαλύ- τερες μετά
--------	--------	---	--	----	------------	------------------------	----------------	-------	---------	--------	----------	---	----	---