



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 13 - 4 - 2009

Αριθ. πρωτ.: 127951

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Τ.Κ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 7228
FAX: 210 92 12 090

ΠΡΟΣ: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73,
15231 Χαλάνδρι
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.:

- 1) Γραφείο Υφυπουργού κ. Κ. Κιλτίδη
- 2) Γραφείο Γεν. Γραμ. κ. Κ. Σκιαδά
- 3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
- 4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
- 5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης
- 6) Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/σής μας
- 7) Γραμματεία της Δ/σής μας

ΘΕΜΑ: "Διεύρυνση της οριστικής
έγκρισης κυκλοφορίας του
ζιζανιοκτόνου AGIL 10 EC"

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για "την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί" και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3) και το άρθρο 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων» Κεφ. Β., παρ. 7.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 90257/29-2-2000 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 7537 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο ίδιο φυτοπροστατευτικό προϊόν AGIL 10 EC.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 149/2008 της Επιτροπής της 29-1-2008 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη

θέσπιση των παραρτημάτων II, III και IV για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα I του κανονισμού».

7. Τη γνωμοδότηση της 4^{ης}/2009 Συνεδρίασης του ΑΣΥΓΓΕΦ στις 30-03-2009.
8. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υπουργού”».
9. Το Π.Δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
10. Τη με αριθ. 147/19-1-2009 (ΦΕΚ 67/Β'/21-1-2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο».
11. Τις από 13-10-2005 και 12-2-2009 αιτήσεις, με το από 12-2-2009 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Χορηγούμε **διεύρυνση** της οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά με αριθμό **7537** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **AGIL 10 EC**, για χρήση και στις καλλιέργειες **πεπονιού, φασολιού και μηδικής**.
Τα στοιχεία της έγκρισης διαμορφώνονται ως εξής:
 1. **Εμπορικό σήμα:** AGIL 10 EC.
 2. **Μορφή:** Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC).
 3. **Εγγραμμένη σύνθεση:** Propaquizafop 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 89,46% β/β
 4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:
Propaquizafop: 92% min.
 5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** QUENA PLANT PROTECTION N.V., - Pos Cabai Office Park, Unit 13, POB 403, Curacao, Netherlands Antilles – Ολλανδικές Αντίλλες.
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD, Nothern Industrial Zone – ASHDOD 77 102 – Ισραήλ.
 6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** QUENA PLANT PROTECTION N.V., - Pos Cabai Office Park, Unit 13, POB 403, Curacao, Netherlands Antilles – Ολλανδικές Αντίλλες.
β. Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι.
 7. **α. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** QUENA PLANT PROTECTION N.V., - - Pos Cabai Office Park, Unit 13, POB 403, Curacao, Netherlands Antilles – Ολλανδικές Αντίλλες.
β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD, Nothern Industrial Zone – ASHDOD 77 102 - Ισραήλ.
 8. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, Οινόφυτα Βοιωτίας.
 9. **Συσκευασία:** **9α. Είδος-Μέγεθος:** Φιαλίδια των εκατό (100), διακοσίων (200), διακοσίων πενήντα (250), πεντακοσίων (500) κ.εκ. και ενός (1) λίτρου.
9β. Υλικό: Πλαστικό πολυαιθυλένιο ενισχυμένο (COEX)
 10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**

Καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών και μερικών πολυετών ζιζανίων, μεταφυτρωτικά. Το proaquizafor απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και μεταφέρεται στις ρίζες, στους στόλωνες και στα ριζώματα.

Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται 1 – 2 ημέρες μετά την εφαρμογή. Τα νεώτερα φύλλα γίνονται κίτρινα και το χαμηλότερο μέρος των βλαστών νεκρώνεται.

Τελικά όλο το ζιζάνιο καταστρέφεται μέσα σε 10 – 20 ημέρες, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.

11. Τρόπος εφαρμογής: Το AGIL 10 EC εφαρμόζεται με ψεκασμό επιφανείας σε φυτρωμένα ζιζάνια νεαρού σταδίου ανάπτυξης, με ψεκαστήρες μέσου όγκου με 20 – 60 λίτρα νερό/στρ με πίεση μέχρι 3 atm και μπεκ τύπου σκούπας.

Δεν απαιτείται επιπλέον ποσότητα διαβρεκτικού παράγοντα σε ψεκαστικό υγρό.

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με το μισό του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ/στρ)	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (λιτρ/στρ)	ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
ΑΜΠΕΛΙ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ΤΟΜΑΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΣ	Ετήσια και μερικά πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια *	α) 75-120	20-60	α) Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: ψεκασμός φυλλώματος μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων. β) Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια: ψεκασμός φυλλώματος μεταφυτρωτικά όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 15-20 εκ. γ) Μόνο για το βέλιουρα (Sorghum halepense): ψεκασμός φυλλώματος μεταφυτρωτικά όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 εκ.	1
ΠΕΠΟΝΙ ΦΑΣΟΛΙ ΜΗΛΙΚΗ		β) 150-200			
		γ) 100-150			

Παρατηρήσεις:

- Η εφαρμογή συνιστάται να γίνεται πριν καλυφθούν τα ζιζάνια από την καλλιέργεια. Η δόση εφαρμογής κυμαίνεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων.
- για την καταπολέμηση της αγριάδας (*Cynodon dactylon*) μπορούν να εφαρμοσθούν εναλλακτικά δυο ψεκασμοί με την δόση 100 κ.εκ/στρ ως εξής: 1) όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10-15 εκ. και 2) μια εβδομάδα αργότερα.

***Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια (ετήσια και πολυετή):**

Alopecurus myosuroides (αλεπονουρά),
Agrostis spp (άγρωστη),
Avena spp (αγριοβρώμη),
Bromus spp (Βρόμος),
Cynodon dactylon (αγριάδα).
Digitaria sanguinalis (αιματόχορτο),
Echinochloa crus-galli (μουχρίτσα),
Eleusine indica (ελευσίνη),
Elymus repens συνώνυμο *Agropyron repens* (έλυμος),
Hordeum spp (αγριοκρίθαρο),
Lolium multiflorum (πολύανθη ήρα),
Lolium rigidum (λεπτή ήρα),
Phalaris spp (φάλαρη),
Poa trivialis (τραχειά λειβαδοπόα),
Poa pratensis (λεία λειβαδοπόα),
Setaria spp (σετάρια),
Sorghum halepense (βέλιουρας),

***Ανθεκτικά ζιζάνια:**

Όλα τα πλατύφυλλα ζιζάνια και τα καλάμια (*Phragmites spp*)

5) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ (SZ φράσεις):

- SZ1** Φυλάξτε το χωριστά από γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
SZ3 Να μην σπέρνονται χειμερινά σιτηρά και αραβόσιτος στο ίδιο χωράφι πριν περάσουν 3 μήνες από την εφαρμογή του AGIL 10 EC.
SZ5 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. Μη αδειάζετε το ψεκαστικό υγρό πιο κοντά από 50 μέτρα από μέρη που έχουν νερό.
SZ6 Αν ρυπανθούν τα νερά άρδευσης , να μη χρησιμοποιηθούν πριν περάσουν 24 ώρες.
SZ7 Μη ψεκάζετε όταν φυσάει.
SZ8 Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μη αυξάνετε τις δόσεις.
SZ11 Μη το χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.
SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό.

14. Φυτοτοξικότητα:

Σε μεγάλες δόσεις εφαρμογής μπορεί να εμφανισθούν συμπτώματα χλώρωσης στα φύλλα της πατάτας, τα οποία όμως είναι παροδικά, και δεν επηρεάζουν τελικώς την ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής. Στις λοιπές καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με προϊόντα που έχουν αλκαλική αντίδραση. Σε περίπτωση εφαρμογής πλατυφυλλοκτόνων ζιζανιοκτόνων που δεν έχει δοκιμασθεί η συνδυαστικότητα τους με το Agil 10 EC, προτείνεται μεσοδιάστημα τριών τουλάχιστον ημερών μεταξύ των ψεκασμών.

16. Σήμανση Τοξικότητας: Xn Επιβλαβές
N Επικίνδυνο για το περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R36 Ερεθίζει τα μάτια
R38 Ερεθίζει το δέρμα
R40 Ύποπτο καρκινογένεσης.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R & RO φράσεις):

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά
S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S36/37 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια.

20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

S62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του.

Σε περίπτωση δηλητηρίασης, καλέστε γιατρό για τη παροχή πρώτων βοηθειών.

Αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: (01) 7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S & SO φράσεις) :

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας
Sp1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.”

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και των κενών μέσων συσκευασίας :

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις: Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία του καταναλωτή (Π φράσεις):

Π1: Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι: 49 ημέρες

Σακχαρότευτλα: 90 ημέρες για τις ρίζες και τη ζωοτροφή.

Τομάτα: 21 ημέρες

Βαμβάκι: 90 ημέρες

Πατάτα: 42 ημέρες

Καπνός: 49 ημέρες

Πεπόνι: 49 ημέρες

Φασόλι: 56 ημέρες

Μηδική: 90 ημέρες

Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Propaquizafop	Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008	

24. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική απαραβίαστη του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από τον ήλιο και την υγρασία και σε θερμοκρασία από -10°C έως 35°C .

Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα μένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2009.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

**Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΧΑΤΖΗ