



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 12 – 5 - 2004

Αριθ. πρωτ.: 103252

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 – ΑΘΗΝΑ
FAX: 36 17 103
Πληροφορίες: Γ.Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 212 44 94

ΠΡΟΣ: 1) SYNGENTA Hellas ΑΕΒΕ
Λεωφ. Ανθούσας
153 49 - Ανθούσα
(με απόδειξη)
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/ΝΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έδρες τους
β) Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Έδρες τους
3) ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά
4) Τμήματα Β', Γ' και Ε'.
ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής
έγκρισης κυκλοφορίας
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(φυτορρυθμιστική ουσία)
BONZI 4 SC.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.2538/97 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-97) άρθρο 1, παρ. 2^α.
2. Την από 3-3-2004 και 5-5-2004 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας SYNGENTA Hellas ΑΕΒΕ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Χορηγούμε προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας διάρκειας 4 (τεσσάρων) ετών με αριθμό **8141** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: **BONZI 4 SC.**
2. Είδος (Μορφή) σκευάσματος: Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC).
3. Εγγραμμένη σύνθεση: raclobutrazol: 0,4 % β/ο
βοηθητικές ουσίες 99,57 % β/β
4. Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται: 90 % β/β
5. Παρασκευαστής: Syngenta Ltd - U.K.
6. Αντιπρόσωπος: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ, Λεωφ. Ανθούσας, Τ.κ. 153 49 Αωθούσα Αττικής.
7. Τυποποιητής: Safarac (Cambridge) Ltd, Cambridge, - UK.
8. Συσκευαστής: Ο Τυποποιητής.

9. Συσκευασία:

α) **Είδος – Μέγεθος:** Φιάλες των πενήντα (50), εκατό (100), διακοσίων (200), διακοσίων πενήντα (250) και πεντακοσίων (500) κ.εκ., και του ενός (1), τριών (3) και πέντε (5) λίτρων.

β) **Υλικό:** PET.

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Το BONZI είναι ρυθμιστής ανάπτυξης, το οποίο περιορίζει την ανάπτυξη των εναέριων οργάνων και φυτών και παράγει ομοιόμορφα, πιο συμπαγή και δυνατά φυτά.

Η δράση του οφείλεται στην παρεμπόδιση παραγωγής γιββερελλίνης.

Το BONZI προορίζεται αποκλειστικά για ανθισμένα φυτά (φυτά σε δοχεία και φυτά σε γλάστρα).

11. Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος ή ριζοπότισμα.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείστε καλά το σκεύασμα πριν το ανοίξετε. Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Υπό συνεχή ανάδευση προσθέστε και το υπόλοιπο νερό. Τα κενά συσκευασίας ξεπλύνετε τα πολλές φορές ρίχνοντας το νερό στο ψεκαστικό.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καλλωπιστικά φυτά	Περιορισμός της ανάπτυξης των εναέριων οργάνων και παραγωγή ομοιόμορφων, πιο συμπαγών και δυνατών φυτών.	1 λτ/στρ. ή 3-5 κ.εκ./λτ νερού	Ψεκασμός φυλλώματος ή ριζοπότισμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Τρόπος εφαρμογής:

- Με ψεκασμό φυλλώματος: όταν το φύλλωμα είναι στεγνό σε καλά ποτισμένα φυτά, με προσοχή να διαβραχούν καλά όλες οι επιφάνειες.
- Με ριζοπότισμα στα δοχεία / γλάστρες: Το χώμα πρέπει να είναι υγρό κατά τη στιγμή της εφαρμογής για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη διανομή. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού στο χώμα θα πρέπει να είναι ανάλογος με το μέγεθος της γλάστρας / δοχείου.

Παρατηρήσεις:

1. Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιηθεί σε φυτό σε πλήρη ανάπτυξη.
2. Δε συνιστάται η χρήση του σε κομμένα λουλούδια.
3. Αποφεύγετε να ποτίσετε 24 ώρες μετά την εφαρμογή.
4. Να αποφεύγονται τα φυτά που είναι σε συνθήκες stress. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε το BONZI με συννεφιασμένο καιρό και όταν η υγρασία στο θερμοκήπιο δεν είναι υψηλή.
5. Η αντίδραση των φυτών μετά την εφαρμογή ποικίλει ανάλογα με την ποικιλία, το στάδιο ανάπτυξης και τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Για αυτό συνιστάται μια δοκιμαστική εφαρμογή μικρής κλίμακας πριν την εκτενή χρήση του σκευάσματος.
6. Το BONZI παραμένει ενεργό στο έδαφος για μερικούς μήνες.

7. Να μην ξαναχρησιμοποιείτε τις γλάστρες με το περιεχόμενό τους (φυτόχωμα, υπόστρωμα) μετά από επέμβαση με BONZI.
 8. Να μην ξαναχρησιμοποιείτε τα εναπομείναντα νερά του ποτίσματος ή της άρδευσης μετά από επέμβαση με BONZI.
 9. Να μην προετοιμάζετε περισσότερο σκεύασμα από όσο είναι απαραίτητο για μια εφαρμογή.
 10. Να προστατεύετε με πλαστικό φύλλο την επιφάνεια στην οποία θα γίνουν οι ψεκασμοί (πάγκοι τοποθέτησης φυτών, χώμα που προορίζεται για άλλες καλλιέργειες).
 11. Να μη χρησιμοποιείται σε βρώσιμες καλλιέργειες. Να αποφεύγεται η επαφή του BONZI με μη εγκεκριμένες καλλιέργειες.
 12. Πλύνετε καλά τον εξοπλισμό πριν τον ξαναχρησιμοποιήσετε.
14. **Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται στη συνιστώμενη καλλιέργεια και τις συνιστώμενες δόσεις.
15. **Συνδυαστικότητα:** Να μη συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα. Να μη συνδυάζεται με διαβρέκτη ή προσκολλητικό
16. **Σημάνσεις:** Δεν απαιτείται, σύμφωνα με την Οδηγία 99/45.
17. **Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):** Δεν απαιτείται, σύμφωνα με την Οδηγία 99/45.
18. **Κίνδυνοι για το οικοσύστημα:** Δεν απαιτείται, σύμφωνα με την Οδηγία 99/45.
18. **Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**
- S1/2: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
 - S13: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
 - S20/21: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. Μην το χρησιμοποιείτε σε βρώσιμες καλλιέργειες.
 - S61: Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Φυλάξτε το μακριά από παγετό
20. **Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:**
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
- **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά για 15 λεπτά τουλάχιστον και καλέστε αμέσως γιατρό.
 - **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και πλύνετε πολύ καλά τα μέρη του σώματος με νερό πρώτα και με σαπούνι και νερό στη συνέχεια. Τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί πρέπει να πλυθούν καλά και να σιδερωθούν πριν ξαναφορεθούν.
 - **Σε περίπτωση αναπνοής:** Απομακρύνετε το άτομο από την επικίνδυνη περιοχή σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστατέψτε το από την υποθερμία. Καλέστε γιατρό εάν το κρίνετε αναγκαίο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό.
- Εφαρμόστε συμπτωματική και υποστηρικτική αγωγή, όπως ενδείκνυται.
- Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777
21. **Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:**
Δεν απαιτούνται, σύμφωνα με την Οδηγία 99/45.
22. **Απαγορεύσεις (A φράσεις):** Δεν απαιτούνται.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): Δεν απαιτούνται.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία, κλεισμένο αεροστεγώς, υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος, μακριά από παγετό, σε ασφαλές σημείο.

Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια.

II. Κείμενο Ετικέτας:

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22 (παρ. 1), του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεση της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **12 – 5 - 2008**.

IV. Η SYNGENTA Hellas AEBE να ενημερώνει την Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη ποσότητα και τη περιοχή όπου θα χρησιμοποιείται το BONZI 4 SC τον πρώτο μήνα μετά την εφαρμογή του κάθε χρόνο, και να αναφέρει κάθε παρατήρηση φαινομένων που έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω έγκριση.

V. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου καθώς και τις τυχόν παρενέργειες του ανήκει στην εταιρεία SYNGENTA Hellas AEBE.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

E. APBANITAKΗΣ