



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα 18 - 12 - 2003**

**Αριθ. Πρωτ.: 117710**

**Ταχ. Διεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5  
Ταχ. Κώδικας: 101 64 ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 36 17 103**

**Πληροφορίες : Γ. Τσιάμπα  
Τηλέφωνο : 212 44 94**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό  
προϊόν (ζιζανιοκτόνο)  
PARAQUAT INAGRO 20 SL.**

**Προς: 1. ΙΝΑΓΚΡΟ Ε.Π.Ε.  
Καπετάν Μητρούση 4  
546 46 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
(με απόδειξη)  
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α) Δ/νσεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
β). Δ/νσεις Εμπορίου  
Έδρες τους  
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά  
4. Τμήματα Β, Γ και Ε της Δ/σής μας  
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 721/77 "Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου γεωργικών φαρμάκων" και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 2 & και το άρθρο 5, παρ. 2 και 8.
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας για την "τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων". Κεφ. Β παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά τον «καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων».
4. Τη με αριθ. 92380/26-3-1999 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7038 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας περιεκτικότητας και μορφής φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) GRAMOXONE 20 SL.
5. Τη με αριθ. 399580/30-10-2001 (ΦΕΚ 1479/Β/31-10-2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας "για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη".
6. Τις από 7-9-2000 και 24-11-2003 αιτήσεις με το πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου της ενδιαφερόμενης εταιρείας ΙΝΑΓΚΡΟ Ε.Π.Ε.

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε**

**Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 7702 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) με τα παρακάτω στοιχεία:  
1.Εμπορικό όνομα : PARAQUAT INAGRO 20 SL.**

2. Μορφή: Πυκνό Διάλυμα (SL)
3. Εγγυημένη σύνθεση : paraquat ion 20% β/ο (ισοδύναμο προς 27.6% β/ο διχλωριούχου άλατος άλατος Paraquat)  
βοηθητικές ουσίες 42,14% β/β  
Περιέχει : εμετικό, μπλέ χρωστική και δύσοσμη ουσία.
4. Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται του Οίκου FULON - Ταϊβάν:  
36.2% β/ο σε ιόν που αντιστοιχεί σε 50% β/ο σε διχλωριούχο άλας.  
Τόσο το technical, όσο και το σκεύασμα θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του FAO.
5. Παρασκευαστής : ΙΝΑΓΚΡΟ Ε.Π.Ε., Καπετάν Μητρούση 4 - Θεσσαλονίκη.
6. Αντιπρόσωπος : -
7. Τυποποιητής : AGROTECHNICA OBEE, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης.
8. Συσκευαστής : AGROTECHNICA OBEE, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης.
9. Συσκευασία: 9α.Είδος -Μέγεθος: Φιάλες των 500 κ.εκ., 1 (ενός) και 5 (πέντε) λίτρων.  
9β.Υλικό: Φιάλες πολυαιθυλενίου σκληρού τύπου και έχουν πάμα ασφαλείας και πλαστικό παρέμβυσμα.
10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:  
Το Paraquat – Inagro 20 SL είναι μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών αγρωστωδών και πλατυφύλλων ζιζανίων σε αμπέλι, δενδρώδεις καλλιέργειες, γραμμικές καλλιέργειες (λαχανικά, βαμβάκι, καλαμπόκι, σακχαρότευτλα, κλπ), μηδική, πατάτα, σιτηρά, καπνό, ακαλλιέργητες εκτάσεις και πριν τη σπορά σε χειμερινές και ανοιξιτιάτικες καλλιέργειες. Αδρανοποιείται στο έδαφος.
11. Τρόπος εφαρμογής :  
Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 60-80 λίτρα νερό στο στρέμμα. Μικρότερος όγκος νερού, αλλά όχι λιγότερο από 20 λίτρα/στρέμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η εφαρμογή γίνεται με χειροκίνητο ψεκαστήρα.  
Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας. Η πίεση κατά τον ψεκασμό να μην ξεπερνάει τη 1 ατμόσφαιρα.  
Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε διάλυμα πυκνότερο από 1 λίτρο Paraquat – Inagro 20 SL σε 100 κιλά νερό, π.χ. με ψεκαστήρες υπέρμικρου όγκου (Herbi, κλπ.).  
Προσοχή: Να μην βρέχονται τα φύλλα και οι τρυφεροί βλαστοί των καλλιεργούμενων φυτών με ψεκασμό.
12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού :  
Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τη μέση με καθαρό νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Υπό συνεχή ανάδευση προσθέστε το υπόλοιπο νερό. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύνετε τα ρίχνοντας το νερό στο ψεκαστικό.

### 13. Φάσμα δράσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ ανά στρέμμα)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιές, Μανταρινιές, Λεμονιές, Γκρέϊπ Φρούτ, Κίτρα)	Καταπολέμηση μονοετών και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. (2), (3)	200-500 (4), (5)	Ψεκασμός των ζιζανίων σε όλη την έκταση ή κατά λωρίδες ή γύρω από τα δένδρα. (8)
ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιές, Φυστικές, Καρυδιές)	Καταπολέμηση μονοετών και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. (2), (3)	200-500 (4), (5)	Ψεκασμός των ζιζανίων σε όλη την έκταση ή κατά λωρίδες ή γύρω από τα δένδρα. (8)
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιές, Αχλαδιές, Κυδωνιές)	Καταπολέμηση μονοετών και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. (2), (3)	200-500 (4), (5)	Ψεκασμός των ζιζανίων σε όλη την έκταση ή κατά λωρίδες ή γύρω από τα δένδρα. (8)
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερυκοκιές, Ροδακινιές, Κερασιές, Δαμασκηνιές, Βυσσινιές)	Καταπολέμηση μονοετών και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. (2), (3)	200-500 (4), (5)	Ψεκασμός των ζιζανίων σε όλη την έκταση ή κατά λωρίδες ή γύρω από τα δένδρα. (8)
ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμα, Επιτραπέζια)	Καταπολέμηση μονοετών και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. (2), (3)	200-500 (4), (5)	Ψεκασμός των ζιζανίων σε όλη την έκταση ή κατά λωρίδες ή γύρω από τα πρέμνα. (8)
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ	Καταπολέμηση μονοετών και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. (2), (3)	200-500 (4), (5)	Ψεκασμός των ζιζανίων σε όλη την έκταση ή κατά λωρίδες ή γύρω από τα δένδρα. (8)
ΕΛΙΑ	Καταπολέμηση	200-500	Ψεκασμός των ζιζανίων

	μονοετών και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. (2), (3)	(4), (5)	σε όλη την έκταση ή κατά λωρίδες ή γύρω από τα δένδρα. (8), (9)
ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σολανώδη (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα)	Καταπολέμηση μονοετών και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων (2), (3)	200-300 (4), (5)	Ψεκασμός μεταξύ των γραμμών νωρίς πριν τα ζιζάνια φθάσουν τα 10 εκ. ύψος, με κατευθυνόμενο ψεκασμό.
ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Μαρούλι, Σπανάκι, Σέσκουλα)	Καταπολέμηση μονοετών και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων (2), (3)	200-300 (4), (5)	Ψεκασμός μεταξύ των γραμμών νωρίς πριν τα ζιζάνια φθάσουν τα 10 εκ. ύψος, με κατευθυνόμενο ψεκασμό.
ΨΥΧΑΝΘΗ (Νωπά) (Φασόλι με και χωρίς λοβό, Μπιζέλι με και χωρίς λοβό)	Καταπολέμηση μονοετών και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων (2), (3)	200-300 (4), (5)	Ψεκασμός μεταξύ των γραμμών νωρίς πριν τα ζιζάνια φθάσουν τα 10 εκ. ύψος, με κατευθυνόμενο ψεκασμό.
ΟΣΠΡΙΑ (Φασόλια, Μπιζέλια)	Καταπολέμηση μονοετών και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων (2), (3)	200 (5)	Ψεκασμός πριν τη σπορά για την καταστροφή των μικρών ζιζανίων.
ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ (Βαμβάκι)	Καταπολέμηση μονοετών και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων (2), (3)	200-300 (4), (5)	Ψεκασμός μεταξύ των γραμμών νωρίς, πριν τα ζιζάνια φθάσουν τα 10 εκ. ύψος, με κατευθυνόμενο ψεκασμό. (11)
ΠΑΤΑΤΑ  φθάσουν	Καταπολέμηση μονοετών και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων (2), (3)	200-300 (4), (5)	Ψεκασμός μεταξύ των γραμμών νωρίς, πριν τα ζιζάνια φθάσουν τα 10 εκ. ύψος, με κατευθυνόμενο ψεκασμό.

ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη)	Καταπολέμηση μονοετών και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων (2), (3)	200 (5)	Ψεκασμός πριν την σπορά για την καταστροφή των μικρών ζιζανίων.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ  φθάσουν	Καταπολέμηση μονοετών και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων (2), (3)	200-300 (4), (5)	Ψεκασμός μεταξύ των γραμμών νωρίς, πριν τα ζιζάνια τα 10 εκ. ύψος, με κατευθυνόμενο ψεκασμό
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ φθάσουν  ψεκασμό	Καταπολέμηση μονοετών και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων (2), (3)	200-300 (4), (5)	Ψεκασμός μεταξύ των γραμμών νωρίς, πριν τα ζιζάνια τα 10 εκ. ύψος, με κατευθυνόμενο
Ζαχαρότευτλα			
ΚΑΠΝΟΣ  φθάσουν	Καταπολέμηση μονοετών και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων (2), (3)	200-300 (4), (5)	Ψεκασμός μεταξύ των γραμμών νωρίς, πριν τα ζιζάνια τα 10 εκ. ύψος, με ψεκασμό ψεκασμό
ΜΗΔΙΚΗ Πολυετή  του ημέρες	Καταπολέμηση μονοετών και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων (2), (3)	200-500 (4), (5)	Ψεκασμός νωρίς πριν τα ζιζάνια φθάσουν τα 10 εκ. ύψος. Ψεκασμός στο τέλος ληθάργου ή μέσα σε 2-3 μετά την κοπή. (10)
Τριφύλλια			
ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	Καταπολέμηση μονοετών και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων (2), (3)	400 (5)	Ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια όταν το μέγεθος των ζιζανίων δεν ξεπερνά τα 10 - 15 εκ.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το Paraquat – Inagro 20 SL δεν έχει υπολειμματική διάρκεια γιατί αδρανοποιείται στο έδαφος.
2. Σχετικά ανθεκτικά ζιζάνια: *Malva spp.* (Μολόχες), *Gallium aparine* (Κολλητσίδα), *Fumaria officinalis* (Καπνόχορτο), *Polygonum spp.* (Πολυκόμμι). Πρέπει να ψεκάζονται πολύ μικρά για να έχουμε αποτέλεσμα.

3. Για τα πολυετή ζιζάνια *Sorghoum halepence* (Βέλιουρας), *Cynodon dactylon* (Αγριάδα), *Cyperus sp.* (Κύπερη) που αναβλαστάνουν, απαιτείται επανάληψη του ψεκασμού.
4. Οι μικρές δόσεις συνιστώνται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά και οι μεγάλες όταν είναι μεγάλα. Το μέγεθος των ζιζανίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10-15εκ.
5. Χρησιμοποιείτε λιγότερο νερό (40 λίτρα / στρέμμα ) για βρεγμένα ή αραιά ζιζάνια και περισσότερο (60-80 λίτρα / στρέμμα) για στεγνά και πυκνά ζιζάνια.
6. Αφήστε να περάσουν 4 ώρες πριν καλλιεργήσετε (ή 7 - 10 ημέρες αν θέλετε να έχουν εν τω μεταξύ καταστραφεί τελείως τα ζιζάνια). Η βροχή μετά τον ψεκασμό δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα.
7. Η σπορά μπορεί να γίνει μια ημέρα μετά τον ψεκασμό. Σε πολύ αμμώδη ή οργανικά εδάφη, η σπορά μπορεί να γίνει 3 ημέρες μετά τον ψεκασμό.
8. Στην αμπελουργία και δενδροκομία : Προσοχή, ο κορμός των δένδρων να είναι πλήρως ξυλοποιημένος.
9. Στις ελιές ψεκάστε για την διευκόλυνση της συγκομιδής (φροντίστε να μην υπάρχουν καρποί στο έδαφος κατά τον ψεκασμό).
10. Μη ψεκάζετε μηδική ηλικίας κάτω των έξι (6) μηνών.
11. Στο βαμβάκι, για μεγαλύτερο άνοιγμα κλειστών καψών μαζί με το αποφυλλωτικό προσθέστε και 50 κ. εκ. Paraquat – Farma-Chem 20 SL ανά στρέμμα.
12. Στις χειμωνιάτικες ή ανοιξιάτικες καλλιέργειες ψεκάστε πριν τη σπορά για την καταστροφή των μικρών ζιζανίων.
13. Στις γραμμικές καλλιέργειες για ζιζανιοκτονία μεταξύ των γραμμών, ψεκάστε μετά τη σπορά με κατευθυνόμενο ψεκασμό (με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα, ειδικό μπεκ).

14. Ειδικές φράσεις για τα ζιζανιοκτόνα (SZ φράσεις) :

- SZ1 "Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους"
- SZ2 "Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για ζιζανιοκτόνα"
- SZ4 "Αποφεύγετε τη χρήση του σε πολύ αμμώδη εδάφη και σε εδάφη πλούσια σε οργανική ουσία σε λιγότερο από 3 ημέρες πριν το φύτευμα της καλλιέργειας"
- SZ5 "Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό. Πάρτε αυστηρές προφυλάξεις για να μη ρυπανθούν γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες"
- SZ7 "Μην ψεκάζετε όταν φυσάει"
- SZ8 "Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις"
- SZ9 "Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 1 ατμόσφαιρες (15 Psi)"
- SZ10 "Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας"
- SZ11 "Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται"
- SZ12 "Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε τα κενά συσκευασίας.. Μην τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Ξεπλύνετε καλά και τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό"

14. Φυτοτοξικότητα: Το Paraquat – Inagro 20 SL δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες δοσολογίες και οδηγίες χρήσεως.

Προσοχή: Να μην βρέχονται τα φύλλα και οι τρυφεροί βλαστοί των καλλιεργούμενων φυτών με ψεκασμό.

15. Συνδυαστικότητα : Δεν πρέπει να συνδυάζεται με άλλα γεωργικά φάρμακα.

16. Σημάνσεις : Για τον άνθρωπο : T+- ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ-. Νεκροκεφαλή με χιαστί οστά.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

- R24/25 : Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης.  
Είναι θανατηφόρο αν καταποθεί.
- R36/38 : Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις) :

- RO3 : Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.  
RO6 : Βλαβερό για τα ψάρια.  
RO10 : Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα  
RO13 : Βλαβερό για τα άγρια ζώα και το κυνήγι.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις) :

- S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
S7/9/49 Διατηρείται ερμητικά κλεισμένο σε ασφαλές μέρος στην αρχική του συσκευασία.  
Μη μεταγγίζετε το σκεύασμα σε άλλα δοχεία.  
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
S20/21 Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.  
S2 Μη αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.  
S24/25 Αποφύγετε επαφή με τα μάτια και το δέρμα.  
S27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί.  
S35 Μην ξαναχρησιμοποιήσετε τα κενά υλικά συσκευασίας αλλά καταστρέψτε τα με πίεση ή τρύπημα αφού τα ξεπλύνετε καλά.  
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια από καουτσούκ και συσκευή προστασίας ματιών και προσώπου (διαφανή καλύπτρα) όταν χειρίζεστε το πυκνό σκεύασμα ή το ψεκαστικό υγρό.  
S45/46 Σε περίπτωση ατυχήματος (κατάποση ή επαφή με το δέρμα) ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).  
SY11 Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του.

20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Σε περίπτωση κατάποσης προκαλέστε εμετό, εάν δεν έχει ήδη προκληθεί και μεταφέρετε τον ασθενή αμέσως στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε πυκνό σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε καλά.

Πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων (210) 7793777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις) :

- SO5 Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη επιφάνεια για 15 ημέρες μετά τον ψεκασμό και τα προοριζόμενα για σφαγή κρεοπαραγωγά 30 ημέρες μετά τον ψεκασμό.  
Απαγορεύεται η βόσκηση γαλακτοπαραγωγών ζώων σε ψεκασμένη περιοχή.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις) :

- A1 Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς

- A2 Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε θερμοκήπια.
- A3 Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.  
Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε ελιές μετά την πτώση του ελαιοκάρπου.  
Απαγορεύεται η εφαρμογή του με ψεκαστήρες υπερμικρού όγκου. (ULV).  
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.
23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις) : -  
Π1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή : --  
Π2 Μην ψεκάζετε καλλιέργειες προοριζόμενες για ανθρώπινη κατανάλωση.
24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- Συνθήκες αποθήκευσης :  
Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης παραμένει σταθερό για δύο (2 ) χρόνια .

## **II. Κείμενο ετικέτας:**

- α. Να είναι σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α.** Η έγκριση αυτή ισχύει μέχρι 31-12-2007.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, να υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

**Ο**  
**ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ**