



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 6 - 9 -2007  
Αριθ. πρωτ.: 121759

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ  
Πληρ.: Χ. Παναγοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 9287250  
FAX: : 210 92 12 090  
E-mail: syg036@minagric.gr

**ΠΡΟΣ:**

1. **SYNGENTA HELLAS AEBE**  
Τομέας φυτοπροστασίας  
Λ. Ανθούσας  
15349 Ανθούσα  
(με απόδειξη)  
Κοιν.:
- 1 Π.Κ. Π.Φ. και Π.Ε.  
Έδρες τους
- 2 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων
- 3 Εσωτερική διανομή  
Τμήματα Β', Γ', Δ' & Ε  
της διεύθυνσης μας
- 4 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
Διευθύνσεις Γεωργίας  
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: «**Τροποποίηση** της με αριθμό **6869** έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **Acylon Gold Combi 45 WP** (μυκητοκτόνο)»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Την Απόφαση του του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων **123185/9-11-2006** με την οποία χορηγήθηκε έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **Acydon Gold Combi 45 WP**
3. Την ΚΥΑ 116077/9-2-2007 (Β 243/26-2-20007) των Υπουργών Οικονομίας και οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα «Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός προϊόντων φυτικής προέλευσης, σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2006/92/ΕΚ της Επιτροπής για την δ.ο. folpet.
4. Τη με αριθ. Υ 132/11-10-2004 (1533/Β/14-10-2004) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό»
5. Τη με αριθ 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού»
6. Την με αριθ. πρωτ 119283/10-5-2007 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας Syngenta Hellas ΑΕΒΕ

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε με αριθ. **6869** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **Acylon Gold Combi 45 WP** που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. **123185/9-11-2006** Αποφάσης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς το φάσμα δράσης

### Συγκεκριμένα

Το σημείο **5.1.** διαμορφώνεται ως εξής:

#### 5.1 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
		γρ./στρέμμα (max)	γρ. σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αμπέλι για οиноποιήσιμα σταφύλια	-Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> )	200	200	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος, χωρίς απορροή, που ξεκινούν κατά την κρίσιμη για την ανάπτυξη περονόσπορου, περίοδο της άνθησης.	Μέχρι 4 εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες
Αμπέλι για επιτραπέζια σταφύλια					Ψεκασμοί φυλλώματος, χωρίς απορροή μέχρι το τέλος της άνθησης	

#### Παρατηρήσεις:

1. Εφαρμόστε τη συνιστώμενη δόση με την κατάλληλη ποσότητα ψεκαστικού υγρού, ώστε να καλυφθεί πλήρως το φύλλωμα του φυτού.
2. Οι εφαρμογές πρέπει να αρχίζουν προληπτικά πριν εκδηλωθεί η ασθένεια κατά τη περίοδο έντονης ανάπτυξης των φυτών.
3. Περίπου 7-10 ημέρες μετά τον τελευταίο ψεκασμό με Acylon Gold combi 45 WP, συνεχίστε τους ψεκασμούς με μυκητοκτόνα επαφής ή με διασυστηματικά με διαφορετικό τρόπο δράσης.
4. **Να μην εφαρμόζεται σε αμμώδη εδάφη με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη ή ίση με 1%.**

Το σημείο 6 διαμορφώνεται ως εξής:

<p><b>6</b> Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ελαφρά αύξηση των ακάρεων.</li></ul> <p><b>Διαχείριση ανθεκτικότητας:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Εφαρμογή μόνο σε προληπτικούς και όχι θεραπευτικούς ψεκασμούς.</li><li>▪ Επεμβάσεις κατά προτίμηση στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου.</li><li>▪ Τα διαστήματα μεταξύ των εφαρμογών να μην ξεπερνούν τις 14 ημέρες και μπορούν να είναι μικρότερα σε περίπτωση υψηλής πίεσης προσβολής.</li><li>▪ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 4, εκ των οποίων οι 2 μπορεί να είναι συνεχόμενες.</li><li>- Μετά τη 2<sup>η</sup> εφαρμογή με Acylon Gold Combi 45 WP, η επόμενη πρέπει να γίνεται με μυκητοκτόνο διαφορετικού τρόπου δράσης από τα φαινυλαμίδια και στη συνέχεια να τηρείται το συνιστώμενο μεσοδιάστημα του άλλου μυκητοκτόνου.</li></ul>
---	---

Το σημείο 13.2 διαμορφώνεται ως εξής:

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	ΡΗΙ(ημέρες)
Αμπέλι για οινοποιήσιμα σταφύλια	42 ημέρες
Αμπέλι για επιτραπέζια σταφύλια	Στο τέλος της άνθησης



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  
ΣΤ. ΣΕΝΗ

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ