



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Λ. Σωτηροπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 244
FAX: 210 92 12 090
e-mail: syg035@minagric.gr**

**Αθήνα, 9 – 11 - 2006
Αριθ. πρωτ.: 123184**

**Προς: BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Αιγιαλείας 48
151 25 Παράδεισος,
Αμαρουσίου
(με απόδειξη)**

Κοιν.:

- 1. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας Έδρες
τους (με e-mail)**
- 2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους**
- 3. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561
Κηφισιά**
- 4. Εσωτερική διανομή
Τμήματα Β', Γ', Δ' & Ε'
της Δ/σης μας**

ΘΕΜΑ: "Οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) SUMI-ALPHA 5 EC"

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. (1) και το Παράρτημα VI αυτού.
2. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».
4. Την ΚΥΑ 91496/29-3-2001 (ΦΕΚ 432/Β/17-4-2001) των Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας για τα «Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων, MRLs, Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/42/ΕΚ της Επιτροπής» για την δ.ο. esfenvalerate.
5. Τη με αριθ. 85538/25-1-2001 (ΦΕΚ 141/Β/13-2-2001) Κοινή Απόφαση των Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, με την οποία καταχωρήθηκε στο Παρ/μα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστική ουσία esfenvalerate.
6. Τη γνωμοδότηση του **Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ** για το 3^ο θέμα της 6^{ης}/2006 Συνεδρίασης του.
7. Τη με αριθ. Υ 132/11-10-2004 (1533/Β/14-10-2004) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
8. Τη με αριθ 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού».
9. Την από 28-7-2004 αίτηση της εταιρείας BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Χορηγούμε στην εταιρεία Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. με υπεύθυνο επικοινωνίας στην χώρα μας την εταιρεία BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο 4 παρ. (1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **SUMI-ALPHA 5 EC** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 **Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

1.1 **Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

1633

9 – 11 - 2006

31 – 7 - 2011

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

SUMI-ALPHA

1.2.β Μορφή:

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία (ες)

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Esfenvalerate

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

83 % (β/β)
min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Sumitomo Chemical Co., Ltd.,
Ιαπωνίας

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Sumitomo Chemical Co., Ltd., Ιαπωνίας
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Esfenvalerate όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 28-7-2004 (Αρ. Πρ. Υ.Γ. 119364) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.
Parc d' Affaires de Crecy
rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d' Or
France
Τηλ.: +33 4 78 64 32 60
Fax: +33 4 78 47 70 05
E-mail: herbert@lyon.sumitomo-chem.de

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

BASF Agro Ελλάς A.B.E.E.
AME: BASGR
Αιγιαλείας 48,
Τ.Κ. 151 25 Παράδεισος, Αμαρουσίου
Τηλ.: 210 68 59 010
Fax: 210 68 50 830
E-mail: maria.tsinou@basf-agro.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
 ΑΜΕ: BASGR
 Αιγιαλείας 48,
 Τ.Κ. 151 25 Παράδεισος, Αμαρουσίου
 Τηλ.: 210 68 59 010
 Fax: 210 68 50 830
 E-mail: maria.tsinou@basf-agro.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., Γαλλία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Compagnie Mediterranee de Produits pour l' Agriculture, Γαλλία
 (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
 BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
 ΒΙ.ΠΕ.ΣΙΝΔΟΥ
 570 22 – Σίνδος – Θεσσαλονίκη

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Esfenvalerate: 5% β/ο
 βοηθητικές ουσίες: 93,3 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 28-7-2004 (Αρ. Πρ. Υ.Γ. 119364) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

2 Συσκευασίες:

2.2 Συσκευασίες: (Σύνολο συσκευασιών: 10)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	100 κ.εκ., 200 κ.εκ., 250 κ.εκ., 300 κ.εκ., 400 κ.εκ., 500 κ.εκ., 800 κ.εκ., 1 λίτρου, 3 και 5 λίτρων.	HDPE/PA

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο

Το SUMI-ALPHA 5 EC είναι πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής **	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκευάσματος /στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Βαμβάκι	Ρόδινο σκουλήκι <i>Pectinophora gossypiella</i>	50	75-100	50-80	Έναρξη εφαρμογών στην έναρξη της εκκόλαψης των προνυμφών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ενήλικων αρσενικών στις παγίδες φερομόνης.	2 εφαρμογές
	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i>	60				

** Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Τοπικών Κέντρων Γεωργικών Προειδοποιήσεων, όπου αυτές εφαρμόζονται.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Εφαρμογή βιολογικών μεθόδων και καλλιεργητικών μέτρων ώστε να συγκρατηθεί ο πληθυσμός των εντόμων και να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των επεμβάσεων.
- Αποφύγετε τη χρήση του SUMI-ALPHA στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου.
- Εφαρμογές μόνο στο μέσον της καλλιεργητικής περιόδου (Ιούλιο-Αύγουστο) και σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που ανήκουν σε άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Μην χρησιμοποιείται το SUMI-ALPHA και τις άλλες πυρεθροειδή περισσότερο από 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.
- Αποφύγετε τη συνεχόμενη χρήση του SUMI-ALPHA αμέσως μετά τη χρήση άλλης πυρεθρίνης και επίσης στην περίπτωση που αυτά τα εντομοκτόνα έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στην εγκεκριμένη καλλιέργεια, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

9 Σήμανση σκευάσματος:

Xn -Επιβλαβές
N -Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10 Φράσεις R

R10 Εύφλεκτο
R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται
R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
R38 Ερεθίζει το δέρμα
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα
R65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

11

Φράσεις S

- S1/2** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
S13 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές
S16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισμα
S20/21 Μην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε
S23 Μην αναπνέετε αέρια
S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή
S37/39 Να φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου
S38 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή
S62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του

S61 Αποφύγετε τη ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **15 μέτρων** μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια του **βαμβακιού**.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

12

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Πρώτες βοήθειες:

Συμπτώματα και συνέπειες: Μπορεί να προκαλέσει παροδικό κνησμό και/ή αίσθηση καψίματος σε εκτεθειμένο ανθρώπινο δέρμα. Τα συνθετικά πυρεθροειδή μπορεί να προκαλέσουν παραισθησία. Τυπικά, τα συμπτώματα εμφανίζονται αρκετές ώρες μετά τη δερματική έκθεση, κορυφώνονται εντός 12 ωρών και υποχωρούν εντός περίπου 24 ωρών.

Γενικά: Σε περίπτωση αμφιβολιών ή αν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, για αρκετά λεπτά κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό σε λιπόθυμα ή αναισθητα άτομα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : (210) 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)¹

Esfenvalerate

Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Βαμβάκι	

Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs με την Οδηγία 2000/42/EC που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 91496/29-3-2001 (ΦΕΚ 432/Β/17-4-2001)

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	PHI (ημέρες)
Βαμβάκι	30

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

15 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο Παράρτημα I (Annex I) του registration report καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

¹ Ορίζονται μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται εθνικά ή κοινοτικά MRLs ή τα υφιστάμενα δεν ικανοποιούν την εγκρινόμενη Ορθή Γεωργική Πρακτική. Στις περιπτώσεις που έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs αναγράφεται η φράση: «Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs».

16 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα προσκομίσει στην Αρμόδια Αρχή:

1) Τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί για τις μεθόδους ανάλυσης υπολειμμάτων του δρόντος συστατικού (Στοιχεία αξιοπιστίας από ανεξάρτητο εργαστήριο (Independent Laboratory Validation, ILV) της πολυ-υπολειμματικής μεθόδου ανάλυσης (SUM-9801V) για τον προσδιορισμό των υπολειμμάτων του esfenvalerate σε ελαιώδη καρπό (κατά προτίμηση σε βαμβάκι) και μέθοδο ανάλυσης για τον προσδιορισμό των υπολειμμάτων του esfenvalerate σε αίμα) εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της παρούσας.

2) Τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης σταθερότητας κατά την αποθήκευση του προϊόντος για τουλάχιστον δυο χρόνια στο υλικό συσκευασίας, για το οποίο ζητείται έγκριση (φιάλες HDPE/PA coex), εντός ενός (1) έτους από την υπογραφή της παρούσας και τα τελικά αποτελέσματα της μελέτης των δυο (2) χρόνων με την ολοκλήρωση αυτής

Η Αρμόδια Αρχή θα αξιολογήσει τα στοιχεία αυτά και θα αποφανθεί εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή τους γνωστοποιώντας το αποτέλεσμα στο ΑΣΥΓΕΦ.

Σε περίπτωση που προκύπτουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον η παρούσα έγκριση ανακαλείται αμέσως.

Επίσης η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B

Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ

Δ – 7 (GAP)**ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ****ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)

: **Esfenvalerate**

Σελίδες

:

EEC No (α)

:

Χώρα

: ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

SUMI-ALPHA 5 EC

Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

Εντομοκτόνο

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
Καλλιέργεια και/ή συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή Χώρα	Εμπορικό Όνομα του σκευάσματος	(A) (Θ) ή (K)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθeneιών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις
					Μορφή	Περιεκτικότητα σε δ.ο	Μέθοδος/ Τρόπος	Στάδιο ανάπτυξης και εποχή	Αριθμός εφαρμογών ελαχ. μεγ.	Χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών (ελαχ)	γρ. δ.ο/ εκατόλιτρο ελαχ. μεγ.	Λίτρα ψεκαστ. Υγρού/ εκτάριο ελαχ.μεγ.	γρ..δ.ο /εκτάριο ελαχ.μεγ		
(α)			(β)	(γ)	(δ-στ)	(θ)	(ζ-η)	(ι)	(κ)					(λ)	(μ)
Βαμβάκι	Ελλάδα	SUMI-ALPHA 5 EC	A	Ρόδινο σκουλήκι <i>Pectinophora gossypiella</i> Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i>	EC	Esfenvalerate 50 g/l	Ψεκασμοί καλύψεως υψηλής πίεσης	Έναρξη εφαρμογών στην έναρξη της εκκόλαψης των προνυμφών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ενήλικων αρσενικών στις παγίδες φερομόνης.	1-2	-	-	500-800	25 30	30	-

Παρατηρήσεις:

(α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκεται εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).

(β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστός χώρος (Κ).

(γ) πχ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια

(δ) πχ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)

(ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.

(στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται

(ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκασμός υψηλού όγκου, σκονισμός.

(η) Τρόπος. Πχ σ' όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά – ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται

(θ) g/kg ή g/lt

(ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκεται εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής

(κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες

(λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή

(μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς στη χρήση