



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 11.12.2012
Αριθ. πρωτ: 12724/125568

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη
Τηλέφωνο: 210 928 7254
e-mail: svg081@minagric.gr

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73,
Τ.Κ.: 15231 Χαλάνδρι
E-mail: technical@alfagro.gr

(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 7527 άδειας
διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(ζιζανιοκτόνο) GALIGAN 24 EC
(oxyfluorfen) ως προς την περιεκτικότητα
της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε
καθαρή δραστική ουσία, τα εργοστάσια
συσκευασίας του σκευάσματος, τον τρόπο
εφαρμογής, και την ημερομηνία λήξης της
άδειας» **Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με **7527** οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **GALIGAN 24 EC**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 58132/27.03.1998 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22.05.2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού»».
5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 798/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Αυγούστου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών oxyfluorfen.

6. Την από 29.12.2011 αίτηση της εταιρείας **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **7527** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **GALIGAN 24 EC** που χορηγήθηκε με την αριθ. **58132/27.03.1998** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος, τον τρόπο εφαρμογής, και την ημερομηνία λήξης της άδειας.

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

7527
27.03.1998
31.12.2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

GALIGAN 24 EC

1.2.β Μορφή:

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Oxyfluorfen
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97% (β/β) min.
Χημική ομάδα	Διφαινυλαιθέρες
Παρασκευαστής	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD Northern Industrial Zone, Ashdod, Ισραήλ Ταχ. Δ/ση: P.O.B. 262, 77 102 - Ashdod, Ισραήλ Τηλ.: +972 73 2321328 E-mail: yardit.danziger@ma-industries.com European address Makhteshim-Agan International Coordination Center (MAICC) c/o Feinchemie Schwebda GmbH Edmund Rumpler Str. 6 51149 Köln, Germany Τηλ. +49 2203 5039-501 E-mail: Wolfgang.Busch@fcs-feinchemie.com
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD

	Northern Industrial Zone, Ashdod, Ισραήλ Ταχ. Δ/ση: P.O.B. 262, 77 102 - Ashdod, Ισραήλ Τηλ.: +972 73 2321328 E-mail: vardit.danziger@ma-industries.com
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας oxyfluorfen όπως προσδιορίζονται στο Annex II - Doc J της αίτησης με ημερομηνία 21.10.2008 (Αρ . Πρ. ΥπΑΑΤ 123304) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ,
Εθνικής Αντιστάσεως 73,
Τ.Κ.: 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: technical@alfagro.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

Ο Κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
Northern Industrial Zone, Ashdod, Ισραήλ
Ταχ. Δ/ση: P.O.B. 262, 77 102 - Ashdod, Ισραήλ
Τηλ.: +972 73 2321328
E-mail: vardit.danziger@ma-industries.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
Northern Industrial Zone, Ashdod, Ισραήλ
Ταχ. Δ/ση: P.O.B. 262, 77 102 - Ashdod, Ισραήλ
Τηλ.: +972 73 2321328
E-mail: vardit.danziger@ma-industries.com

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
Northern Industrial Zone, Ashdod, Ισραήλ
Ταχ. Δ/ση: P.O.B. 262, 77 102 - Ashdod, Ισραήλ
Τηλ.: +972 73 2321328
E-mail: vardit.danziger@ma-industries.com

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ ,
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτία
32 011 –Οινόφυτα ,Βοιωτία
Τηλ. 22620-30821-3
Φαξ. 22620-30820
e-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία Oxyfluorfen 24 % β/ο
 Βοηθητικές ουσίες 75 % β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση με ημερομηνία 21.10.2008 (Αρ . Πρ. ΥπΑΑΤ 123304) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	100, 200, 250, 300, 400, 500 κ.εκ. και 1 & 2 λίτρων	Πλαστικό τύπου COEX , HDPE, SELLAR με πόματα ασφαλείας
2	Δοχεία	1, 2, 3, (3,5), 4, 5, 10, 20 και 25 λίτρων	Πλαστικό τύπου COEX , HDPE, SELLAR με πόματα ασφαλείας

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός του εδάφους σε λωρίδες, με 30 - 60 λίτρα νερό/στρ., από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και πίεση μικρότερη από δύο (2) atm.

Ειδικά για τον καπνό:

α) ψεκασμός του εδάφους σε λωρίδες, πριν τη μεταφύτευση, με 20 - 40 λίτρα νερό/στρ., σε έδαφος ψιλοχωματισμένο και απαλλαγμένο από ζιζάνια ή

β) Κατευθυνόμενο ψεκασμό στο έδαφος σε λωρίδες, κατά το παράχωμα ή «γέμισμα». Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται υπό συνεχή ανάδευση, με μπέκ τύπου σκούπας και με πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 atm, (45 psi).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείτε καλά τη φιάλη ή το δοχείο, πριν τα χρησιμοποιήσετε. Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Υπό συνεχή ανάδευση, συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό.

Συνδυαστικότητα: Να μη συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων

5 5.1 Φάσμα δράσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κυβ. εκατ. /στρ.)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Αριθμός εφαρμογών
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρούτ, Κίτρο)	Ετήσια και πολυετή ζιζάνια (Πλατύφυλλα και αγρωστώδη) (1), (7)	500	30-60	Προφυτρωτικά (2), (3)	1
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	»	500	30-60	Προφυτρωτικά (2), (3)	1
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Νεκταρινιά, Κορομηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά)	»	500	30-60	Προφυτρωτικά (2), (3)	1
Αμπέλι (Σταφίδες, Οινοποιήσιμα, Επιτραπέζια) (4)	»	500	30-60	Προφυτρωτικά (2), (3)	1
Ελιές	»	500	30-60	Προφυτρωτικά (2), (3)	1
Κράμβες (Κουνουπίδι, Λάχανο) (7)	»	250-300	30-60	Πριν τη μεταφύτευση και ακολουθεί κατάκλιση.	1
Μελιτζάνα (7)	»	250-300	30-60	Πριν τη μεταφύτευση και ακολουθεί κατάκλιση.	1
Αγκινάρα	»	300	30-60	Προ της βλαστήσεως του ξηροφύτου.	1
Κρεμμύδι (5), (6)	»	150	30-60	α) Μεταφυτρωτικά ως προς την καλλιέργεια, στο στάδιο των 3-4 φύλλων (στο κρεμμύδι από σπόρο) β) Εντός δύο (2) ημερών από την φύτευση (στο κρεμμύδι από κοκκάρι)	1
Ηλίανθος	»	100	30-60	Μετά την σπορά και πριν το φύτερωμα της καλλιέργειας.	1
Βαμβάκι	»	100-300	30-60	Πριν το φύτερωμα της καλλιέργειας	1
Καπνός	»			Να γίνεται μία εφαρμογή των ίδιο χρόνο, είτε	1
α) Ανατολικά καπνά και Virginia		200-300	20-40	α) Πριν τη μεταφύτευση ψεκάσμος του εδάφους σε λωρίδες	
Καπνά Burley		300-400			
β) Ανατολικά καπνά		100		β) Κατά το παράχωμα ή το «γέμισμα», με κατευθυνόμενο ψεκάσμο του εδάφους σε λωρίδες μεταξύ των γραμμών.	
Καπνά Burley		200-300			

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο του σπόρου μέχρι τα 2-4 φύλλα.
2. Να μη γίνεται δεύτερη εφαρμογή τον ίδιο χρόνο.
3. Η εφαρμογή να γίνεται σε ποτισμένο έδαφος.
4. Το αμπέλι πρέπει να είναι ηλικίας άνω τριών (3) ετών και να είναι υποστλωμένο ή αναρριχόμενο, γιατί αν είναι σε πολύ μικρή απόσταση από το έδαφος υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας.
5. Να χρησιμοποιείται μόνο στο κρεμμύδι που προορίζεται για παραγωγή ξηρών βολβών.
6. Στο κρεμμύδι να μην εφαρμόζεται με κρύο και υγρό καιρό.
7. Για τις κράμβες και τη μελιτζάνα η μεγάλη δοσολογία εφαρμόζεται όταν ο πληθυσμός των ζιζανίων είναι μεγάλος και τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο ανάπτυξης
8. Στον ηλιάνθο δόση μεγαλύτερη από 120 κ.εκ./στρ. δρα φυτοτοξικά.

α) Καταπολεμούμενα ζιζάνια

Αγριομπαμπακιά (*Abutilon theophrasti*)
 Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*)
 Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*)
 Αντράκλα (*Portulaca oleracea*)
 Βερόνικα (*Veronica spp.*)
 Δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*)
 Ελευσίνη (*Eleusine indica*)
 Ζωχοί (*Sonchus spp.*)
 Ήρες (*Lolium spp.*)
 Λουβουδιά (*Chenopodium album*)
 Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*)
 Μεγάλο βλήτο (*Amaranthus retroflexus*)
 Μικρή τσουκνίδα (*Urtica urens*)
 Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*)
 Οξαλίδα (*Oxalis pes-carpae*)
 Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis*)
 Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*)
 Σετάριας (*Setaria spp.*)
 Στύφος (*Solanum nigrum*)
 Τάτουλας (*Datura stramonium*)
 Φυσαλίδα (*Physalis spp.*)
 Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*)
 Τριβόλι (*Tribulus terrestris*)
 Βέλιουρας από σπόρο (*Sorghum halepense*)
 Αγριάδα (*Cynodon dactylon*)
 Κύπερη (*Cyperus spp.*)

β) Ανθεκτικά ζιζάνια

Καλεντούλα (*Calendula arvensis*)
 Λάπαθα (*Rumex spp.*)

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί.

Αποφεύγετε τη χρήση του σε οργανικά εδάφη.
 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
 Αν ρυπανθούν τα νερά αρδεύσεως, να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση.
 Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
 Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.

7.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν δέκα (10) μήνες από την εφαρμογή του.

8

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Στις καλλιέργειες που δεν συνιστάται μπορεί να προκαλέσουν φυτοτοξικότητα ακόμα και τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού. Στον ηλίανθο προκαλείται φυτοτοξικότητα όταν γίνεται υπέρβαση της δόσης. Στο κρεμμύδι συνήθως παρατηρείται και νέκρωση των άκρων των φύλλων, που όμως δεν έχει επιπτώσεις στην παραγωγή, γιατί είναι παροδική. Η φυτοτοξικότητα αυτή είναι πιο έντονη όταν ο καιρός είναι κρύος και υγρός.

9

Σήμανση σκευάσματος:

Xn - Επιβλαβές
N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10

Φράσεις R

R10 Εύφλεκτο.
R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται
R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και πουλιά
Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες

11

Φράσεις S

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.
S25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου
S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
Sp1 Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του

Μην ψεκάσετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
 Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
 Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
 Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
 Σε περίπτωση επαφή με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε
 Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
 Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	MRL's σε mg/kg
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα II του κανονισμού 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008.	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Κρεμμύδι, Καπνός	60 ημέρες
Λοιπές καλλιέργειες	21 ημέρες

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε μέρος δροσερό και ξηρό, σε θερμοκρασίες άνω των 0°C, μακριά από άμεση έκθεσή του στο φως, παραμένει σταθερό για 5 (πέντε) χρόνια.

15 Α. Ανάκληση της άδειας-παράταση της άδειας

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η άδεια θα ανακληθεί στις **31.12.2013** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της άδειας αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο που πληρεί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 545/2011 για την αξιολόγηση των στοιχείων σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ