



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 4 - 1 - 2010
Αριθ. πρωτ: 180256

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 7228

Προς: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου
Τ.Κ. 152 32 Χαλάνδρι-Αθήνα
(με απόδειξη)

e-mail: syg064@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.
7650/28-11-2001 έγκρισης στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
QUANTUM 50 TB (ζιζανιοκτόνο)
ως προς το φάσμα δράσης, τις
ειδικές γεωργικές συνθήκες και το
χρονικό διάστημα ασφαλείας.»

- Κοιν.:
1. Γραφείο Υπουργού κ. Αικ.
Μπατζελή
 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μ.
Καρχιμάκη
 3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας - Έδρες τους
 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γ. Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. - Έδρες τους
 6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
 7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
 8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Τη με αριθ. 116179/21-2-2006 (ΦΕΚ 303/Β/14-3-2006) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «καταχώριση της δραστικής ουσίας Tribenuron στο παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος υπ' αριθ. 115/1997 Προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως

έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/54/ΕΚ της Επιτροπής της 19^{ης} Σεπτεμβρίου 2005".

3. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214 Α').
4. Τη με αριθ. 316049/24-11-2009 (ΦΕΚ 2401/Β'/1-12-2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη».
5. Τη με αριθ. πρωτ. 133197/13-10-2009 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας **NTY PONT ELLAS A.E.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. **Τροποποιούμε** την με αριθ. **7650** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **QUANTUM 50 TB** που χορηγήθηκε με την αριθ. 109349/28-11-2001 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις αριθ. 103267/13-5-2004 και 124308/4-11-2008 Αποφάσεις, ως προς **το φάσμα δράσης, τις ειδικές γεωργικές συνθήκες και το χρονικό διάστημα ασφαλείας.**» (σημεία 5, 6 και 7) και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Σιτάρι (μαλακό και σκληρό)	Πλατύφυλλα ζιζάνια	2-3	-	20-40	Συστήνεται ψεκάσμος μεταφωτοτοξικά, μετά τα 3 φύλλα της καλλιέργειας και μέχρι την πλήρη έκπτυξη του «φύλλου σημαία»	1
Κριθάρι	(ετήσια και πολυετή)	ή (4 δισκία στα 10 στρέμματα)				

Παρατηρήσεις :

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

μπιφόρα (*Bifora radians*), καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), αγριομαργαρίτα (*Chrysanthemum segetum*), κίρσιο (*Cirsium arvense*), κολλητσίδα (*Galium spurium*), χαμομήλι (*Chamomilla recutita*), παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*), αγριοσίναπο (*Sinapis arvensis*), στελλάρια (*Stellaria media*).

Για τα ζιζάνια *μπιφόρα*, *κολλητσίδα* και *κίρσιο* να χρησιμοποιείται μαζί με 0.1% (κατ' όγκο) μη ιονιζόμενο επιφανειοδραστικό. Στα ζιζάνια αυτά, καθώς και στο *πολυκόμπι*, να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη συνιστώμενη δόση.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί

Με στόχο την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται η εναλλαγή ή ανάμειξη σκευασμάτων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.
Η συνεχής χρήση στον ίδιο αγρό ζιζανιοκτόνων που έχουν παρόμοιο τρόπο δράσης οδηγεί συχνά στην επιλογή ανθεκτικών βιοτύπων ζιζανίων στα χρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνα. Τέτοιοι βιότυποι αν δεν

να χρησιμοποιηθεί
ή να αποκλειστεί

καταπολεμηθούν πολλαπλασιάζονται γρήγορα και επικρατούν έναντι των ευαίσθητων βιοτύπων. Ένας βιότυπος ενός ευαίσθητου ζιζανίου θεωρείται ανθεκτικός σε κάποιο ζιζανιοκτόνο όταν επιβιώνει μετά από ορθή εφαρμογή της συνιστώμενης δόσης του.

Η ανάπτυξη ανθεκτικών βιοτύπων ενός είδους ζιζανίου μπορεί να αποφευχθεί ή να επιβραδυνθεί με την εναλλαγή (ή ανάμιξη) αποτελεσματικών ζιζανιοκτόνων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα (SZ φράσεις):

SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

SZ3 Μη σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από σιτάρι ή κριθάρι πριν περάσουν 90 μέρες από την εφαρμογή του.

SZ5 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

SZ7 Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

SZ8 Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.

SZ9 Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 40 psi (ή 2.7 ατμ.).

SZ10 Χρησιμοποιείτε μπέκ τύπου σκούπας

SZ11 Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-
τατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα

Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την
ψεκασμένη περιοχή μέχρι τη συγκομιδή. Ξηραμένος
σανός μπορεί να χορηγηθεί στα ζώα.

II. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 124308/4-11-2008 απόφασή μας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ