



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Επανάληψη στο ορθό (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 15 - 5 - 2014
Αριθ. πρωτ: 3551/38914

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87161
e-mail: sygo36@minagric.gr

Προς: ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΔΡΑΣ 18
ΚΑΒΑΛΑ
e-mail: efodia2005@yahoo.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας
διάθεσης στην αγορά 120 ημερών
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(ζιζανιοκτόνο) **CORUM SL** (δ.ο
bentazone 48 % β/ο, imazamox
2,24% β/ο).

Κοιν.: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε
Λ. Μεσογείων 449,
153 43 Αγία Παρασκευή
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη;

1. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
3. Την έγκριση του από την Ιταλία.
4. Την από 29/4 /2014 εισήγηση της Υπηρεσίας.
5. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»»
6. Την από 24-03-2014 αίτηση από την **ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ**.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **CORUM SL** (δ.ο bentazone 48 % β/ο, imazamox 2,24% β/ο) για χρήση από την **ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70084
15-5-2015
15-9-2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

CORUM SL

1.2.β Μορφή:

Υδατικό διάλυμα (SL)**1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)**

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Bentazone
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	96% (β/β) min
Χημική ομάδα	Βενζοθειαδιαζινονες
Παρασκευαστής	BASF SE Crop Protection Division P.O. Box 1 20 67114 Limburgerhof, Γερμανία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: BASF SE Carl-Bosch Strasse 38 D-67056 Ludwigshafen Germany
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας bentazone όπως προσδιορίζονται στο τμήμα J της αίτησης που έχει κατατεθεί για το σκεύασμα BASAGRAN (αρ. πρωτ. 119363/28-07-2004) και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.

Δραστική ουσία 2	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσιών/ών κατά ISO	imazamox
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	95% (β/β) min
Χημική ομάδα	ιμιδαζολινόνες
Παρασκευαστής	BASF SE Crop Protection Division P.O. Box 1 20 67114 Limburgerhof, Γερμανία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: BASF Corporation Agricultural Products 14385 West Port Arthur Road Beaumont, TX USA 77705
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας imazamox όπως προσδιορίζονται στο τμήμα J αίτησης του σκευάσματος PULSAR με αρ. πρωτ. 98372/15-06-2000 και τροποποιήθηκε με την αίτηση μας με αρ. πρωτ. 125564/12-07-2005.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή
ΑΜΕ: BASGR
Τηλ.: 2106860120
Fax: 2106860200
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.gr

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ο Κάτοχος της έγκρισης

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή
ΑΜΕ: BASGR
Τηλ.: 2106860120
Fax: 2106860200
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

BASF SE
Crop Protection Division
P.O. Box 1 20
67114 Limburgerhof,
Γερμανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

1. BASF Agri-Production S.A.S.
Route du Vieux Chemin de Loon
Site Industriel Leurette
F-59820 Gravelines
France

2. Schirm GmbH Standort Schönebeck
Geschwister-Scholl-Strasse 127
D-39218 Schoenebeck (Elbe)
Germany

3. BASF SE
Carl-Bosch Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen
Germany

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. BASF Agri-Production S.A.S.
Route du Vieux Chemin de Loon
Site Industriel Leurette
F-59820 Gravelines
France

2. Schirm GmbH Standort Schönebeck
Geschwister-Scholl-Strasse 127
D-39218 Schoenebeck (Elbe)
Germany

3. BASF SE
Carl-Bosch Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen
Germany

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία bentazone 48 % β/ο,
Δραστική ουσία imazamox 2,24% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 41,7% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. XXXX έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Δοχείο	950 κ.εκ., 1 λίτρο, 5 λίτρα, 9.5 λίτρα, 10 λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό βυτίο με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας. Προσθέστε επίσης την απαιτούμενη ποσότητα DASH CH αναδεύοντας συνεχώς. Συμπληρώνουμε το βυτίο με το υπόλοιπο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το CORUM είναι μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τη σόγια. Απορροφάται τόσο από το φύλλωμα όσο και από το ριζικό σύστημα των φυτών και από εκεί μεταφέρεται διασυστηματικά στα σημεία ανάπτυξης των ευαίσθητων ζιζανίων. Με αυτόν τον τρόπο, προκαλεί αρχικά ανάσχεση της ανάπτυξής τους, κιτρίνισμα και νέκρωση του φυλλώματος και τελικά νέκρωση των φυτών που πραγματοποιείται εντός 1-2 εβδομάδων περίπου.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	κ.εκ./ 100 λιτρα ψεκ. Υγρού		
Σόγια	Αγριοβαμβακιά (<i>Abutilon theophrasti</i>), Βλήτα (<i>Amaranthus spp.</i>), Ασπροκέφαλος (<i>Ammi majus</i>), Μαύρο Σινάπι Καψέλλα	190 ⁽¹⁾	20-30	-	Εφαρμόστε σε μεταφυτρωτικό στάδιο, όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο έκπτυξης του 1 ^{ου} τριπλού φύλλου και τα πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Μην εφαρμόζετε πέραν του σταδίου	1

	<p>(<i>Brassica nigra</i>), <i>Capsella bursa-pastoris</i>, Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>, <i>C. Ficifolium</i>), Τάτουλας (<i>Datura stramonium</i>), Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Καπνόχορτο (<i>Fumaria spp.</i>), Κολλητσίδα (<i>Galium aparine</i>) Καλινσόγκα, (<i>Galinsoga parviflora</i>), Αγριουβίσκος (<i>Hibiscus trionum</i>), Χαμομήλι (<i>Matricaria spp.</i>), Παπαρούνα (<i>Paraver rhoeas</i>), Αγριοπιπεριά (<i>Polygonum persicaria</i>), Λαπάτσα (<i>P. Lathifolium</i>), Αναρριχώμενο πολύγωνο (<i>P. Convolvulus</i>) Πολυκόμπι, (<i>P. Aviculare</i>), Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i>), Σινάπι (<i>Sinapis arvensis</i>, <i>S. Alba</i>), Αγριοντοματιά (<i>Solanum nigrum</i>), Ζωχός (<i>Sonchus spp.</i>), Σισύμπριο (<i>Sisymbrium spp.</i>), Βερονίκη (<i>Veronica spp.</i>)</p>				<p>ανάπτυξης των πλευρικών βλαστών της καλλιέργειας. Η προσθήκη του DASH HC, στη δόση των 250-300 κ.εκ. ανά 100 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος βελτιώνει τη δράση του CORUM στα ζιζάνια-στόχους, ιδιαίτερα σε συνθήκες δύσκολες για την εφαρμογή. Σε περίπτωση έντονης προσβολής, σε συνθήκες στρες των ζιζανίων ή όταν αυτά βρίσκονται σε στάδια ανάπτυξης που είναι οριακά για την ευαισθησία τους στο σκεύασμα, χρησιμοποιήστε 500 κ.εκ. DASH HC ανά 100 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η συνιστώμενη δόση εφαρμογής μπορεί να διαιρεθεί εξίσου σε 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 1-2 εβδομάδες, ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε

αυτή την περίπτωση, συνιστάται η πρώτη εφαρμογή να γίνεται στο στάδιο του πρώτου πραγματικού φύλλου των φυτών της σόγιας.

2. Για να επιτευχθεί η μέγιστη ζιζανιοκτόνος δράση, το CORUM πρέπει να εφαρμόζεται σε ζιζάνια υπό έντονη ανάπτυξη και μάλιστα στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους. Επίσης, δεν πρέπει να βρέξει για τουλάχιστον 5-6 ώρες μετά την εφαρμογή του, προκειμένου το προϊόν να απορροφηθεί από τα ευαίσθητα ζιζάνια σε ικανή ποσότητα.
3. Για να εξασφαλίσετε τη σταθερή αποτελεσματικότητα εναντίον των ζιζανίων, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το CORUM σε συνδυασμό με το επιφανειοδραστικό σκεύασμα DASH HC, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες οδηγίες.
4. Όταν παρατηρείται υψηλή προσβολή από αγρωστώδη ζιζάνια, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το CORUM σε συνδυασμό με ένα αγρωστωδοκτόνο.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- Μην υπερβαίνετε τη δόση 100 γραμ./στρέμμα/έτος bentazone.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Σε περίπτωση αντικατάστασης της προστατευόμενης καλλιέργειας, μπορεί να γίνει σπορά φασολιών, αρακά, μηδικής, ρεβυθιών, τριφυλλιού, μαρουλιού και ραντίτιο.

Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες για τη σπορά λάχανου, κριθαριού, πατάτας, τομάτας και ποικιλιών/υβριδίων αραβοσίτου ή ηλίανθου που δεν είναι αποδεδειγμένα ανθεκτικά στα ιμιδαζολινονικά ζιζανιοκτόνα.

Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 6 μήνες και κάνετε άροση του εδάφους πριν τη σπορά ζαχαρότευτλων ή

ελαιοκράμβης.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Είναι δυνατόν να παρατηρηθούν ορισμένα παροδικά, ήπια συμπτώματα φυτοτοξικότητας σε συγκεκριμένες φυσιολογικές ή/και κλιματικές συνθήκες.

9 Σήμανση σκευάσματος:

N - επικίνδυνο για το περιβάλλον

10 Φράσεις R

R22 – Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
R52/53– Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

11 Φράσεις S

S1/2 – Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13- Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21- Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
S29 - Μην αδειάζετε το περιεχόμενο του στην αποχέτευση.
S 36/37 – Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
S46 – Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
S61 – Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

- Αφήνετε μια απέκαστη ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
- Για την προστασία των οργανισμών μη στόχων, αφήστε μια ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων από γειτονική αυτοφυή βλάστηση.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Γενικά: αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Απομακρύνετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Σε περίπτωση που ο παθόν χάσει τις αισθήσεις του, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και τοποθετήστε τον σε πλάγια θέση (ανάννηψη). Καλέστε γιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα, με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά. Ζητείστε συμβουλή οφθαλμιάτρου εάν ο ερεθισμός επιμένει.

Σε περίπτωση κατάποσης: Πλύνετε το στόμα αμέσως και στη συνέχεια πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό, παρά μόνο εάν σας το συστήσει το κέντρο δηλητηριάσεων. Μην προκαλείτε ποτέ εμετό ή δίνεται κάτι από στόματος ένα το θύμα δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

Συμβουλές για το Γιατρό:

Το σκεύασμα αποτελεί μίγμα των δυο δραστικών ουσιών bentazone και imazamox, τα οποία προκαλούν αντίστοιχα τα ακόλουθα συμπτώματα:

Imazamox: Θεραπεία συμπτωματική

Bentazone: απορροφάται γρήγορα και γρήγορα αποβάλλεται αμετάβλητη μέσω των ούρων. Ερεθιστική για το δέρμα, τους βλεννογόνους των ματιών και το γαστρεντερικό και το αναπνευστικό σύστημα. Μετά από κατάποση αναμένεται εμφάνιση ναυτίας, έμετου, διάρροιας, δύσπνοιας, τρέμουλου, αδυναμίας. Εφαρμόστε θεραπεία συμπτωματική. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Για τις καλλιέργειες έχουν καθοριστεί προς το παρόν από την Επιτροπή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με τον κανονισμό 396/2005.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Σόγια	60

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

B

Γενικές υποχρεώσεις

I. Η παρούσα έγκριση χορηγείται μετά από αίτησή της ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή του σκευάσματος και η οποία υποχρεούται να ενημερώνει την οικεία Περιφερειακή Ενότητα μετά από την εφαρμογή του σκευάσματος και να αναφέρει οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση περιέλθει σε γνώση τους από τη χρήση του προαναφερθέντος φυτοπροστατευτικού προϊόντος. **Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.**

II. Η ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ οφείλει να συγκεντρώσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία μας **το αργότερο μέχρι 15-11-2014** τα ακόλουθα στοιχεία:

- ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.
- έκταση σε στρέμματα στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ