

1. **Εμπορικό όνομα:** CHLORPYRIFOS – ΦΑΡΜΑ ΧΗΜ 5 GR
 2. **Μορφή:** Κοκκώδες (GR)
 3. **Εγγραμμένη σύνθεση:** chlorpyrifos 5% β/β
βοηθητικές ουσίες: 94,68% β/β
 4. **Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** 94% min.
 5. **Παρασκευαστής:** ΦΑΡΜΑ ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε., Δωδεκανήσου 21, 546 26 – Θεσσαλονίκη.
 6. **Αντιπρόσωπος:** -
 7. **Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής.
 8. **Συσκευαστής:** Ο παρασκευαστής.
 9. **Συσκευασία: 9α. Είδος - Μέγεθος: i)** Σακούλες τυπωμένες των **500** γρ. και **1, 2** και **5** κιλών, ή σακούλες ατύπωτες (των ίδιων μεγεθών) εντός χαρτοκυτίου
 - 9β. Υλικό: i)** Σακούλες LAMINATED (πολυαιθυλενίου/πολυεστέρα (PE/PET) ή πολυαιθυλενίου / αλουμινίου (PET/AL)), αεροστεγώς κλεισμένες με εκτυπωμένη την ετικέτα..
 - ii)** Σακούλες LAMINATED ατύπωτες, αεροστεγώς κλεισμένες μέσα σε κουτιά (με τυπωμένο σε αυτά το κείμενο της ετικέτας), σε χαρτοκυβώτια.
 - iii)** Κατάλληλα κουτιά (χάρτης κουσέ) με εσωτερικό σάκο από πολυαιθυλένιο, πάχους 80-100 μ., αεροστεγώς κλεισμένο. Τα κουτιά συσκευάζονται σε χαρτοκυβώτια KSK 500 ή 550.
- Οι συσκευασίες θα είναι ασφαλείς στη μεταφορά και αποθήκευση.
- 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**
Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και αναπνοής εφαρμοζόμενο πριν ή κατά τη σπορά για την καταπολέμηση εντόμων εδάφους.
- 11. Τρόπος εφαρμογής:** Ομοιόμορφος διασκορπισμός με διανομέα κοκκωδών που προσαρμόζεται στην σπαρτική ή φυτευτική μηχανή, ή με το χέρι, και ενσωμάτωση.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ---

13. Φάσμα δράσης.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
13.1 ΨΕΚΑΣΜΟΣ	ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ	(κιλά/στρ.)	
ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Παντζάρι, καρότο, κρεμμύδι, τομάτα, πεπόνι, καρπούζι, (1) κουνουπίδι, λάχανο, μαρούλι, φασόλι, μπιζέλι, μπρόκολο, σέλινο, σπαράγγι, αγγινάρα, πράσσο)	Έντομα εδάφους: -Αγροτίδα (Agrotis spp.) -Πρασάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa) -Ζάβρος (Zabrus tenebrioides) -Μηλολόνη (Melolontha melolontha) -Χλωρόπας (Carabidae) -Μυριάποδα	2-2,5 ή 1	α) Πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή β) Κατά τη σπορά ή φύτεμα σε γραμμές, αυλακίες ή λάκκους φυτέματος.
	-Σιδηροσκούληκας (Agriotes spp.) -Υλέμνια (Hylemya antiqua)	5-6	Πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας.
BAMBAKI	Έντομα εδάφους: -Αγροτίδα (Agrotis spp.) -Πρασάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa) -Ζάβρος (Zabrus tenebrioides)	2-2,5 ή 1,5	α) Πριν τη σπορά με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή β) Κατά τη σπορά σε γραμμές, αυλακίες ή λάκκους φυτέματος.

Παρατηρήσεις:

1. Στο καρπούζι εφαρμόζεται και με δοσολογία 1γρ/λάκκο φύτευσης.
2. Η εφαρμογή γίνεται με διανομέα κοκκωδών που εφαρμόζεται στην σπαρτική ή φυτευτική μηχανή ή με το χέρι.
3. Μετά την εφαρμογή του πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για τη πλήρη ενσωμάτωση των κόκκων που έπεσαν στα άκρα του χωραφιού.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

15. Συνδυαστικότητα:

Δε συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα ή με λιπάσματα.

16. Σημάνσεις Τοξικότητας: Xn – Επικίνδυνο.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R20 -Βλαβερό σε επαφή με το δέρμα.

R22 -Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO & R φράσεις):

RO4 Πολύ τοξικό για τα ψάρια.

RO12/RO14 Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και για τα πουλιά.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

S22 Μην εισπνέετε την υπάρχουσα σκόνη πάνω από τα κουτιά της μηχανής (σπαρτική κλπ) όταν αδειάζετε το σκεύασμα.

S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

S36/37/38 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια γυαλιά και μάσκα ή αναπνευστική συσκευή.

S27/SY7 Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν μολυνθεί. Πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε.

SY11 Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

S35 Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με θάψιμο ή κάψιμο.

" ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων, καθώς και για το περιβάλλον."

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης ή ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε του την ετικέτα.

Αντίδοτο: θεϊκή ατροπίνη με τις οδηγίες γιατρού.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO3 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

SO5 Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα τουλάχιστον 21 ημέρες μακριά από την περιοχή όπου έγινε η εφαρμογή.

Απαγορεύεται η βόσκηση μετά τη συγκομιδή του βαμβακιού.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):

Απαγορεύεται η χρήση του σε περιοχές που έχουν άμεση γειτνίαση με επίγεια (λίμνες, ποτάμια), ή υπόγεια (άντλησης) αβαθή νερά.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: -----(προφυτρωτική εφαρμογή).

Πατάτα: 60 ημέρες (αν χρησιμοποιηθεί κατά το παράγωμα).

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρήστε το στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Ημερομηνία λήξης: Δύο (2) χρόνια από την ημερ/νία παρασκευής του.

II. Κείμενο Ετικέτας:

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2003**.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ