



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 27 – 4 - 2005

Αριθ. Πρωτ.: 122911

**Ταχ. Δ/ση : . Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας : 176 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Σωτηροπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 14 677
FAX: 210 92 12 090**

**ΠΡΟΣ: 1) ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΑΓΚΡΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου
152 32 Χαλάνδρι
(Με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.:1) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά**

**ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν, (ζιζανιοκτόνο),
GRANSTAR EXTRA 16,7/33,3 TB**

**2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
3) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/σεις Εμπορίου
Έδρες τους
4) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής μας
5) Γραμματεία της Δ/σής μας**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3).
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων » Κεφ Β.παρ.1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ..
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».

5. Τη με αριθ. 116046/20-11-2003 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7549 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο ζιζανιοκτόνο μίγμα με τον ίδιο συνδυασμό δρώντων συστατικών αλλά με περιεκτικότητα σε δραστική ουσία μικρότερη και μορφή διαφορετική, GRANSTAR EXTRA WG.
6. Τη με αριθ. Υ 132/11-10-2004 (Β'1533/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
7. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (Β'1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υφυπουργού”».
8. Τις από 19-8-2004 και 11-3-2005 αιτήσεις με το πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου της ενδιαφερόμενης εταιρείας NTY PONT ΑΓΚΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Αποφασίζουμε

Χορηγούμε Οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **7746** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: GRANSTAR EXTRA

2. Μορφή: Δισκία TB

3. Εγγυημένη σύνθεση: tribenuron-methyl 16,7% β/β (Χημική ομάδα σουλφονουλουρίες)
thifensulfuron-methyl 33,3 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 47,74% β/β

4. Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:

tribenuron – methyl 95% min του οίκου DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd., Highway 686, Km. 2.3, Manati, Puerto Rico 00674-3000 που παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd.

thifensulfuron – methyl 96% min του οίκου DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd., Highway 686, Km. 2.3, Manati, Puerto Rico 00674-3000 που παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd.

5. Παρασκευαστής: E.I Du Pont de Nemours & Co Inc H.Π.Α., Market Street 1007 Wilmington, Delaware 19898, U.S.A.

6. Αντιπρόσωπος: NTY PONT ΑΓΚΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου, 152 32 Χαλάνδρι

7. Τυποποιητής: DU PONT DE NEMOURS (FRANCE), S.A.S., 82, rue de Wittelsheim, F-68701 Cernay, Γαλλία

8. Συσκευαστής: DU PONT DE NEMOURS (FRANCE), S.A.S., 82, rue de Wittelsheim, F-68701 Cernay, Γαλλία

9. Συσκευασία 9α. Είδος – Μέγεθος: Σωληνάριο που περιέχει δισκία (10X7,5 γραμ.)

9β. Υλικό: Σωληνάριο και πάμα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) που περιέχεται μέσα σε κουτί.

Σύνολο συσκευασιών: 1

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:

Το GRANSTAR EXTRA TB, μίγμα tribenuron-methyl & thifensulfuron-methyl είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονουλουριών για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι (μαλακό, σκληρό). Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από την ρίζα των ζιζανίων. Μετακινείται στα ακραία μεριστώματα βλαστού και ρίζας. Αμέσως μετά την απορρόφηση το GRANSTAR EXTRA TB σταματά την ανάπτυξη των ευαίσθητων ζιζανίων με ορατά συμπτώματα (κιτρίνισμα, νέκρωση και κατόπιν θάνατος) που μπορούν να εκδηλωθούν από 1-2 βδομάδες μετά την εφαρμογή. Μηχανισμός δράσης: Τα ζιζανιοκτόνα της ομάδας των σουλφονουλουριών δρουν στο ένζυμο συνθετάση του οξειγαλακτικού (ALS) με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης των αμινοξέων.

11. Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός ζιζανίων με πίεση μικρότερη από 3 ατμόσφαιρες (40 p.s.i) με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Τα δισκία του σκευάσματος πρέπει να προστίθενται κατ' ευθείαν στο νερό ψεκασμού και να αφήνονται να διαλυθούν πλήρως πριν την ανάδευση ή προσθήκη άλλων σκευασμάτων.

Η διάλυση μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά εάν το νερό είναι κρύο.

1. Μισογεμίζεται πρώτα το βυτίο με νερό.
2. Αφαιρείται ο απαιτούμενος αριθμός ταμπλετών (δισκίων) από τη συσκευασία και προστίθενται κατ' ευθείαν στο νερό του βυτίου.
(Μπορεί να χρειασθεί να αφαιρεθεί το φίλτρο για να επιτραπεί η κατ' ευθείαν πρόσβαση του νερού).
3. Αφήστε τα δισκία να διαλυθούν στο νερό (περίπου 10 λεπτά)
4. Απογεμίστε το βυτίο με νερό και αρχίστε την ανάδευση.
5. Συνεχίστε την ανάδευση κατά την διάρκεια του ψεκασμού μέχρις ότου αδειάσει το βυτίο.

Τα δισκία του σκευάσματος πρέπει να παραμένουν στην συσκευασία τους μέχρι την εφαρμογή γιατί εάν μείνουν εκτεθειμένα υπάρχει κίνδυνος να απορροφήσουν υγρασία με συνέπεια μείωση της αποτελεσματικότητας.

Το ψεκαστικό διάλυμα να χρησιμοποιείται την ίδια μέρα της παρασκευής του. Σε περίπτωση ανάμιξης με άλλα σκευάσματα να διαλύονται πρώτα πλήρως τα δισκία του GRANSTAR EXTRA TB και μετά να προστίθεται το άλλο σκεύασμα.

Ξεπλύντε 3 φορές, ή καλύτερα με νερό υπό πίεση τα κενά υλικά συσκευασίας. Ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό.

13.Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής/ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γραμμάρια./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	
Σιτάρι (μαλακό και σκληρό)	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια	6-7,5 (1 δισκίο στο στρέμμα) +0,1% κατ' όγκο μη ιονιζόμενο επιφανειοδραστικό	20-40	Μεταφυτρωτικά, καθολικός ψεκασμός από το στάδιο των 3 φύλλων της καλλιέργειας μέχρι την έναρξη διόγκωσης του στάχυ. Η δόση είναι ανάλογη του είδους, του σταδίου ανάπτυξης και της πυκνότητας των ζιζανίων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Πλατύφυλλα ζιζάνια: Ανθεμίδα (*Anthemis* spp.), μπιφόρα (*Bifora radians*), καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), αγριομαργαρίτα (*Chrysanthemum segetum*), κίρσιο (*Cirsium arvense*), καπνόχορτο (*Fumaria* spp.), κολλητσίδα (*Galium spurium*), χαμομήλι (*Chamomilla recutita*), παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*), ρανούγκουλος (*Ranunculus* spp.), αγριοσίναπο (*Sinapis arvensis*), στελλάρια (*Stellaria media*), λουβουδιά (*Chenopodium album*)

1. Για τα ζιζάνια *μπιφόρα*, *αγριομαργαρίτα*, *καπνόχορτο*, *κολλητσίδα*, *πολυκόμπι* και *ρανούγκουλος* να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη συνιστώμενη δόση και η εφαρμογή να γίνεται πριν τα ζιζάνια αυτά ξεπεράσουν το στάδιο των 2-3 φύλλων.
2. Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασμός γίνεται όταν τα περισσότερα ζιζάνια έχουν φυτρώσει και βρίσκονται σε μικρό στάδιο ζωικής ανάπτυξης (2-4 φύλλα).
3. Υγρασία του εδάφους και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν την δράση του ενώ μεγάλη ξηρασία και πολύ κρύο την επιβραδύνουν.
4. Δεν χρειάζεται επανάληψη του ψεκασμού αν βρέξει αφού περάσουν 2 ώρες από τον ψεκασμό.
5. Μετά από μία εφαρμογή με GRANSTAR EXTRA TB δεν συνιστάται η συγκαλλιέργεια ανάμεσα σε άλλα φυτά κτηνοτροφικών ή ψυχανθών (που χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή).
6. Με στόχο την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται η εναλλαγή ή ανάμειξη σκευασμάτων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.
7. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Η συνεχής χρήση στον ίδιο αγρό ζιζανιοκτόνων που έχουν παρόμοιο τρόπο δράσης οδηγεί συχνά στην επιλογή ανθεκτικών βιοτύπων ζιζανίων στα χρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνα. Τέτοιοι βιότυποι αν δεν καταπολεμηθούν πολλαπλασιάζονται γρήγορα και επικρατούν έναντι των ευαίσθητων βιοτύπων. Ένας βιότυπος ενός ευαίσθητου ζιζανίου θεωρείται ανθεκτικός σε κάποιο ζιζανιοκτόνο όταν επιβιώνει μετά από ορθή εφαρμογή της συνιστώμενης δόσης του. Η ανάπτυξη ανθεκτικών βιοτύπων ενός είδους ζιζανίου μπορεί να αποφευχθεί ή να επιβραδυνθεί με την εναλλαγή (ή ανάμειξη) αποτελεσματικών ζιζανιοκτόνων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

Για ταυτόχρονη καταπολέμηση και αγρωστωδών ζιζανίων, συνιστάται να συνδυάζεται το GRANSTAR EXTRA TB με τη συνιστώμενη δόση ενός από τα αγρωστωδοκτόνα Topic 8 EC, Puma S EW, Illoxan 28 EC, Dagger 20 SC ή Assert 250 SC.

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα (SZ φράσεις): -

SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

SZ3 Μη σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από σιτάρι, κριθάρι ή καλαμπόκι πριν περάσουν 90 μέρες από την εφαρμογή του.

SZ5 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

SZ7 Μη ψεκάσετε όταν φυσάει.

SZ8 Μη διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.

SZ9 Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm (40 PSI).

SZ10 Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας.

SZ11 Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.

SZ12 Αμέσως μετά την εφαρμογή: Είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα ως εξής:

Μετά τον ψεκασμό: Αδειάστε το βυτίο τελείως και γεμίστε το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό. Αδειάστε το ξανά.

Μισογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, προσθέστε 1 λίτρο οικιακή αμμωνία (περιεκτικότητας 3%) για κάθε 100 λίτρα νερό και απογεμίστε καθαρό νερό.

Γεμίστε όλα τα μέρη του ψεκαστικού, αφήστε να κυκλοφορήσει το διάλυμα μέσω των σωληνώσεων για τουλάχιστον 15 λεπτά με συνεχή ανάδευση και αδειάστε τελείως.

Για να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη του διαλύματος, ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με άφθονο καθαρό νερό.

Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά σε διάλυμα αμμωνίας ίδιας συγκέντρωσης τα μπεκ και τα φίλτρα.

Το ψεκαστικό να μην στραγγίζεται ή ξεπλένεται σε έδαφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα σε κανονικές συνθήκες, εφ' όσον χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες καλλιέργειες και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας του.

- Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, από τροφοπενίες, από προσβολές παρασίτων, από ασφυξία ριζών κλπ.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με ορμονικά ζιζανιοκτόνα που περιέχουν 2,4-D, με σκευάσματα του tralkoxydim και με ιχνοστοιχεία.

16. Σημάνσεις:

Xi – Ερεθιστικό

N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα: (R φράσεις):

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

- S37** Να φοράτε κατάλληλα γάντια.
S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
S61 Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων.

“Περιέχει tribenuron methyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση”

Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε αμέσως 1-2 ποτήρια νερό. Μην προκαλέσετε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. (Δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση εισπνοής: Να μεταφερθεί ο άρρωστος στον καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί να χορηγηθεί οξυγόνο ή να γίνει τεχνητή αναπνοή.

Συμβουλευτείτε γιατρό μετά από σημαντική έκθεση.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά. Αν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευτείτε γιατρό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77.93.777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO4 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα και τη συσκευασία του

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Αχρησιμοποίητο προϊόν: Σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές οδηγίες. Πρέπει να καεί σε μία κατάλληλη εγκατάσταση καύσης η οποία διαθέτει τις απαραίτητες άδειες των υπεύθυνων αρχών. Μην επιτρέπετε στο υλικό να ρυπάνει το εδαφικό υδατικό σύστημα. Μην ρυπαίνετε επιφανειακά νερά.

Κενές συσκευασίες: Μην ξαναχρησιμοποιείτε άδεια δοχεία. Μην ρυπαίνετε στάσιμα ή τρεχούμενα νερά με το χημικό υλικό ή με χρησιμοποιούμενα δοχεία.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: --

Μέγιστα Όρια

Υπολειμμάτων

(MRLs)

Έχουν οριστεί προσωρινά MRLs

Περιορισμός της εισόδου των ζώων για βοσκή στην ψεκασμένη περιοχή: 30 μέρες.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σε χώρο δροσερό, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2009.

- β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

**Ε. Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Θ. ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ