



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Τ.Κ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα  
Τηλέφωνο: 210 928 7228  
FAX: 210 92 12 090**

**ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της έγκρισης  
της οριστικής έγκρισης του  
φυτοπροστατευτικού προϊόντος,  
(ζιζανιοκτόνο) YPSILON FLORIN  
12,5 EC, ως προς το φάσμα δράσης.**

**Αθήνα 21 - 4 - 2008**

**Αριθ. Πρωτ: 118288**

**ΠΡΟΣ: ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.,  
Δ. Γληνού 32,  
542 49 - Θεσσαλονίκη  
(με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού  
2) Γραφείο Γεν. Γρ. κ. Κ. Σκιαδά  
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά  
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης  
6) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής μας  
7) Γραμματεία της Δ/σής μας**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων » Κεφ Β.παρ.1, 7.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθμό 117757/10-4-2007 και 116117/14-2-2007 αποφάσεις μας με τις οποίες διευρύνθηκε το Φάσμα Δράσης της με αριθμ. 7324 οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος FUSILADE 12,5 EC.
6. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α').
7. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα,

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Εντολή Υπουργού”».

8. Το από 21-3-2008 Υπηρεσιακό Σημείωμα της ομάδας αξιολόγησης της υπηρεσίας μας για θέματα υπολειμμάτων.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. **7848**, οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) YPSILON FLORIN 12,5 EC, (δ.ο. fluazifop-P-butyl 12,5% β/ο), η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε., με την αριθ. 115647/28-1-2008 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης και συγκεκριμένα οι παράγραφοι 13 και 23 διαμορφώνονται ως ακολούθως:

#### 13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ		ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. / στρέμμα	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (λίτρα/στρέμ.)		
Ζαχαρότευτλα	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια : Αγριοβρώμη ( <i>Avena spp.</i> ), Μουχρίτσα ( <i>Echinochloa spp.</i> ), Σετάρια ( <i>Setaria spp.</i> )	100-200 (1)	30-60	Όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα.	<b>1</b>
Αμπέλι (για οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια)	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια : α) Βέλιουρας ( <i>Sorghum spp.</i> )	600	30-60	Όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης (15-50 εκ. ύψος)	<b>1</b>
	β) Αγριάδα ( <i>Cynodon dactylon</i> )	800-1000			
Εσπεριδοειδή: Γκρέιπ φρούτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά	Αγρωστώδη ζιζάνια α) Ετήσια β) Πολυετή (3)	60-120 (2)	30-60	α) Όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα β) Όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης (15-50 εκ. ύψος)	<b>1</b>
Βαμβάκι, Τριφύλλι για σπόρο, Καπνός, Σόγια,	Αγρωστώδη ζιζάνια α) Ετήσια β) Πολυετή (3)	100-250 (2) (απαιτείται προσθήκη ελαίου ή	30-60	α) Όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα β) Όταν τα πολυετή ζιζάνια	<b>1</b>

Ηλιάνθος, Πατάτα, Φακή		διαβρεκτικού)		βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης (15-50 εκ. ύψος)	
Μαρούλι	Ετήσια αγρωστώδη	125-150	30-60	Όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα .	<b>1</b>
	Πολυετή αγρωστώδη	150-200	30-60	Όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης	
Τομάτα Υπαίθρου (Βιομηχανική)	Ετήσια αγρωστώδη *	125-150	30-60	Όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα.	<b>1</b>
	Βέλιουρας	150-200		Όταν ο βέλιουρας βρίσκεται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης	

#### Παρατηρήσεις :

1. Στα ζαχαρότευτλα για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια και ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους, η χαμηλή δόση εφαρμόζεται στα μικρά ζιζάνια και η υψηλή στα μεγάλα.
2. Οι χαμηλές εφαρμόζονται στα ετήσια ζιζάνια και οι υψηλές στα πολυετή.
3. Δεν καταπολεμά την κοινή πόα (*Poa annua*).
4. Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια είναι : α) Ετήσια : αγριοβρώμη (*Avena spp.*), ήρα (*Lolium spp.*), σετάρια (*Setaria spp.*), μουχρίτσα (*Echinochloa spp.*), βρώμος (*Bromus spp.*), αλεπονουρά (*Alopecurus spp.*), αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), β) Πολυετή : βέλιουρας (*Sorghum spp.*).
5. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε ζιζάνια που βρίσκονται υπό stress (ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, βοσκή). Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος μπορεί να ελαττωθεί όταν το έδαφος είναι στεγνό και η σχετική υγρασία μικρότερη του 60%.
6. Δεν επιτρέπεται η χρήση για τομάτες βιομηχανικές βιολογικού κύκλου μικρότερου των 90 ημερών.

#### **23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

**Π1** - Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή :

Σακχαρότευτλα: 90 ημέρες

Αμπέλι : 120 ημέρες

Εσπεριδοειδή-βαμβάκι: 30 ημέρες

Πατάτα: 50 ημέρες

Σόγια –ηλιάνθος-τριφύλλι-καπνός:60 ημέρες

Φακή: 45 ημέρες

Μαρούλι: 42 ημέρες

Υπαίθρου(Βιομηχανική): 90 ημέρες

**Π.** Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η αριθ. 115647/28-1-2008 απόφασή μας.



**Ε.Υ.  
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ**