



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 4 - 11 - 2008
Αριθ. πρωτ: 124307**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Η. Κιούλος
Τηλέφωνο: 210 92 87 209
e-mail: syg040@minagric.gr**

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 7721
οριστικής έγκρισης του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος
GRANSTAR 50 SG (ζιζανιοκτόνο)
ως προς τον παρασκευαστή της δ. ο.,
το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.,
τον κάτοχο της έγκρισης, τη
σήμανση και την ημερομηνία
λήξης»**

**Προς: NTY PONT ELLAS A.E.
Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου
Τ.Κ.: 152 32 – ΧΑΛΑΝΔΡΙ
(με απόδειξη)**

- Κοιν.:**
- 1. Γραφείο κ. Υπουργού**
 - 2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά**
 - 3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους**
 - 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά**
 - 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους**
 - 6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα**
 - 7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/νσής μας
-Γραμματεία της Δ/νσής μας**
 - 8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα**

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Την Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας 105269/4.6.2004 με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **7721 οριστική** έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **GRANSTAR 50 SG**.
3. Την υπ' αριθμ. 116179/21.2.06 Κ.Υ.Α., (ΦΕΚ Β'303/14.3.2006) με την οποία η δραστική ουσία tribenuron καταχωρίστηκε στο Παράρτημα Ι του Π.Δ. 115/97.
4. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α').
5. Τη με αριθμό 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47Β'/18.1.2008) απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υπουργού”».
6. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. 116311/20.2.2006 & 120558/3.7.2008 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Αποφασίζουμε

A Τροποποιούμε ως προς τον παρασκευαστή της δ.ο., το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο., τον κάτοχο της έγκρισης, τη σήμανση και την ημερομηνία λήξης, την με αριθ. **7721** έγκριση διάθεσης στην αγορά, του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **GRANSTAR 50 SG**, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. 105269/4.6.2004 Απόφασή μας.

Τα στοιχεία της έγκρισης διαμορφώνονται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

7721
4-6-2004
28-02-2010

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή:

GRANSTAR 50
ΔΙΑΛΥΤΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (SG)

1.3 Δραστική ουσία (ες)

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας/ών κατά ISO

Tribenuron (υπό μορφή Tribenuron methyl) Ομάδα: σουλφονυλουρίες
--

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Tribenuron methyl: 95 % (β/β) min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

DuPont International Operations Sarl, 2, chemin du Pavillon P.O. Box 50, CH-1218 Le Grand-Saconnex Geneva Switzerland
--

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 1. DuPont Agrichemical Caribe Industries, Ltd., Puerto Rico (primary manufacturing site) 2. DuPont Agricultural Chemicals Ltd., China (alternative site) (οι δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και προσδιορίζονται στο Τμήμα J της υπ' αριθ. πρωτ. 116307/20.2.2006 αίτησης της εταιρείας και βρίσκονται στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο. Tribenuron προσδιορίζονται στο Τμήμα J της υπ' αριθ. πρωτ. 116311/20.2.2006 αίτησης της εταιρείας και βρίσκονται στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

NTY PONT EΛΛAΣ A.E.
Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου
ΑΜΕ:
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα
Τηλ.: 210 688 9700
Fax: 210 688 9799
E-mail: Costas.Anagnostou@grc.dupont.com

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

DuPont de Nemours (FRANCE) S.A.S.
137 rue de l' Universite
F-75334 Paris cedex 07, FRANCE

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
DuPont de Nemours (FRANCE) S.A.S., Γαλλία
(η δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και προσδιορίζεται στο Τμήμα J της υπ' αριθ. πρωτ. 116307/20.2.2006 αίτησης της εταιρείας και βρίσκεται στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής)

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: DuPont de Nemours (FRANCE) S.A.S.,
82 Rue de Wittelsheim, F-68701, Cernay, Γαλλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Tribenuron
υπό μορφή tribenuron methyl 50% (β/β)
Βοηθητικές ουσίες 47.4% (β/β)
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Έντυπο II της υπ' αριθ. πρωτ. 95245/10.02.2004 αίτησης και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Σακούλα	8, 12 & 15 γραμμάρια	Σακούλα από υδατοδιαλυτό φιλμ (PVAL) μέσα σε φάκελο από σύμμικτο υλικό
	Βάζο	50, 75 & 100 γραμμάρια	Βάζο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) μέσα σε διαφανές πλαστικό κουτί (PET)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός με πίεση μικρότερη από 2,7 ατμόσφαιρες (40psi) και συνεχή ανάδευση με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού στο στρέμμα.

Συνδυαστικότητα: συνδυάζεται καλά με τα ζιζανιοκτόνα που καταπολεμούν την αγριόβρωμη και άλλα αγρωστώδη ζιζάνια (π.χ. diclofor-methyl, fenoxarprop-p-ethyl κ.α.). Επίσης συνδυάζεται και με τα συνήθη μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται στα σιτηρά. Σε περίπτωση ανάμειξης με άλλα ζιζανιοκτόνα μπαίνει πρώτα το σκεύασμα στο βυτίο και μετά το άλλο ζιζανιοκτόνο. Σε περίπτωση συνδυασμού με υγρό λίπασμα ανακατεύεται το σκεύασμα σε λίγο νερό και το μίγμα προστίθεται στο υγρό λίπασμα. Να μην προστίθεται προσκολλητικό στην τελευταία περίπτωση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Να χρησιμοποιείται πάντα καθαρός ψεκαστήρας. Μισογεμίζεται πρώτα το βυτίο με νερό, προστίθεται η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος με συνεχή ανάδευση και απογεμίζεται το βυτίο ψεκασμού. Ξεπλύντε 3 φορές ή καλύτερα με νερό υπό πίεση τα κενά υλικά συσκευασίας και ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη χρήση

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αμέσως μετά την εφαρμογή, καθαρίστε σχολαστικά το ψεκαστικό μηχάνημα.

1. Ξεπλύντε σχολαστικά με νερό (χρησιμοποιώντας τουλάχιστον το 10% της χωρητικότητας του βυτίου), όλες τις εσωτερικές επιφάνειες του βυτίου (περιλαμβανομένου και του πάματος), προσέχοντας να αφαιρεθούν όλα τα ορατά υπολείμματα. Ξεπλύντε την αντλία, τα μπέκ και τα φίλτρα (τα οποία αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά. Στραγγίστε το υπόλοιπο του νερού ξεπλύματος από το βυτίο μακριά από επιφάνεια που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί.

2. Επαναλάβετε το ξέπλυμα και το στράγγισμα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συμβουλευτείτε τις οδηγίες καθαρισμού των άλλων σκευασμάτων που θα εφαρμόσετε στο μίγμα βυτίου και σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε την πιο αυστηρή διαδικασία καθαρισμού

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Ξεπλύντε 3 φορές ή καλύτερα με νερό υπό πίεση τα κενά υλικά συσκευασίας και ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Τρυπήστε ή κάψτε τα καθαρά κενά υλικά συσκευασίας ή απομακρύνετε τα σε κατάλληλο χώρο, ή με άλλο τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το **GRANSTAR 50 SG** είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονουλουριών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι. Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τη ρίζα των ζιζανίων, μετακινείται στα ακραία μεριστώματα, βλαστού και ρίζας και εμποδίζει την ανάπτυξή τους. Η ανάπτυξη σταματά λίγες ώρες μετά την εφαρμογή.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Σιτάρι (μαλακό και σκληρό) Κριθάρι	Πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	2-3	-	20-40	Συστήνεται ψεκάσμος μεταφουτρωτικά, μετά τα 3 φύλλα της καλλιέργειας και μέχρι την πλήρη έκπτυξη του «φύλλου σημαία»	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ: *Bifora radians* (μπιφόρα), *Capsella bursa-pastoris* (καψέλλα), *Chrysanthemum segetum* (αγριομαργαρίτα), *Cirsium arvense* (κίρσιο), *Gallium spurium* (κολλητσίδα), *Papaver rhoeas* (παπαρούνα), *Chamomilla recutita* (χαμομήλι), *Polygonum aviculare* (πολυκόμπι), *Sinapis arvensis* (αγριοσίναπο) & *Stellaria media* (στελλάρια).

- Η δόση είναι ανάλογη του σταδίου ανάπτυξης των ζιζανίων.
- Υγρασία του εδάφους και ζεστός καιρός επιταχύνουν τη δράση του, ενώ μεγάλη ξηρασία και πολύ κρύο την επιβραδύνουν.
- Δεν χρειάζεται επανάληψη του ψεκάσμου αν ακολουθήσει βροχόπτωση μετά από 2 ώρες από το πέρας του ψεκάσμου.
- Η μεγαλύτερη συνιστώμενη δόση να εφαρμόζεται για τα ζιζάνια: μπιφόρα, κολλητσίδα, πολυκόμπι και κίρσιο
- Για τα ζιζάνια: μπιφόρα, κολλητσίδα και κίρσιο να χρησιμοποιείται μαζί με 0,1% (κατ' όγκο) μη ιονιζόμενο επιφανειοδραστικό.
- Η προσθήκη προσκολλητικού φαίνεται ότι συμβάλλει σε καλύτερη αποτελεσματικότητα όταν επικρατούν συνθήκες ξηρασίας.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Με στόχο την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται η εναλλαγή ή ανάμειξη σκευασμάτων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

Η συνεχής χρήση στον ίδιο αγρό ζιζανιοκτόνων που έχουν παρόμοιο τρόπο δράσης οδηγεί συχνά στην επιλογή ανθεκτικών βιότυπων ζιζανίων στα χρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνα. Τέτοιοι βιότυποι αν δεν καταπολεμηθούν πολλαπλασιάζονται γρήγορα και επικρατούν έναντι των ευαίσθητων βιότυπων. Ένας βιότυπος ενός ευαίσθητου ζιζανίου θεωρείται ανθεκτικός σε κάποιο ζιζανιοκτόνο όταν επιβιώνει μετά από ορθή εφαρμογή της συνιστώμενης δόσης του.

Η ανάπτυξη ανθεκτικών βιότυπων ενός είδους ζιζανίου μπορεί να αποφευχθεί ή να επιβραδυνθεί με την εναλλαγή (ή ανάμειξη) αποτελεσματικών ζιζανιοκτόνων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης

Μην αυξάνετε τις δόσεις

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

90 ημέρες

30 ημέρες

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το σκεύασμα δεν είναι τοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Να μην ψεκάζονται σιτηρά που είναι σοκαρισμένα από παγετό, νεροκρατήματα, ασθένειες κ.λ.π..

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

Xi-ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ
N-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- 10** Φράσεις R

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

- 11** Φράσεις S

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε
S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα
S35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο
S37 Φοράτε κατάλληλα γάντια
S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
S61 Αποφύγετε τη ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Προσοχή: περιέχει tribenuron methyl, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Σε περίπτωση ατυχήματος ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναισθητο άτομο.

Σε περίπτωση εισπνοής: μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Εάν τα συμπτώματα ερεθισμού του δέρματος επιμένουν, καλέστε γιατρό.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα. Εάν τα συμπτώματα ερεθισμού των ματιών επιμένουν, συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε 1–2 ποτήρια νερό. Μη προκαλέστε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Συμβουλευτείτε γιατρό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77.93.777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Tribenuron methyl

Φυτικά προϊόντα

Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 396/2005

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα

Ημέρες

-

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιαδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με τη συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ