



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 17-5-2005

Αριθ. πρωτ.: 122992

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 92 14 688

ΠΡΟΣ: 1. ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γληνού 32
542 49 - Θεσσαλονίκη
(με απόδειξη)
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Διευθύνσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστα-
τευτικό προϊόν (εντομοκτόνο)
YPSILON-PRIVILEGE 75 WP”

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ Α'/104/30.5.97) «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ Β'/674/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β' (παρ. 1).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ Β'/599/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3.9.02 (ΦΕΚ Β'/1214/19.9.02) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 120804/25.1.2005 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 14084 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης εντομοκτόνο σκεύασμα CYROMAZINE-ΦΑΡΜΑ ΧΗΜ 75 WP.
5. Τη αριθμ. Υ132/11.10.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (1533 ΤΒ/14.10.2004)
6. Τη αριθμ. 301509/19.11.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν “με εντολή Υφυπουργού” (1762 ΤΒ/30.11.2004)».
7. Τις από 14-5-2004 και 30-3-2005 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 30-3-2005 πρωτόκολλο πληρότητας φακέλου.

Αποφάσιζομε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **14091** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** YPSILON-PRIVILEGE
2. **Μορφή:** βρέξιμη σκόνη (WP)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** cyromazine 75% β/β
βοηθητικές ουσίες: 23,47% β/β
4. **Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** 98% min.
Οίκος παρασκευής δραστικής ουσίας: Wenzhou Pesticide Factory, 61 Huigiao road, Wenzhou, Zip code 325003, Κίνα.
5. **Παρασκευαστής:** ΥΨΙΛΟΝ ΑΕ, Δ. Γληνού 32, 542 49 – Θεσσαλονίκη.
6. **Αντιπρόσωπος:** ----
7. **Τυποποιητής:** ZHEJIANG HEYI PESTICIDE & CHEMICALS CO. LTD, Huangui Industrial Zone, Shangtang, Yongjia, Zhejiang 325101, Κίνα.
8. **Συσκευαστής:** ZHEJIANG HEYI PESTICIDE & CHEMICALS CO. LTD, Huangui Industrial Zone, Shangtang, Yongjia, Zhejiang 325101, Κίνα.
9. **Συσκευασία: 9α. Είδος-Μέγεθος: i)** Σακούλες ή βάζα των 100, 150, 200 και 250 γραμμαρίων.
9β. Υλικό: Λαμιναρισμένα σακουλάκια ή πλαστικά βαζάκια εντός χαρτοκυτίων.
9γ. Σύνολο συσκευασιών: οκτώ (8).
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:** Διασυστηματικό εντομοκτόνο απορροφούμενο από τα φύλλα και τις ρίζες. Δρα ως ρυθμιστής ανάπτυξης των εντόμων.
11. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος ή ριζοπότισμα.
12. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**
-Αναμιγνύουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος με μία μικρή ποσότητα νερού.
-Προσθέτουμε την “κρέμα” μέσα σε καθαρό νερό στον ψεκαστήρα.
-Συμπληρώνουμε με την υπόλοιπη ποσότητα νερού, ανακατεύουμε καλά το ψεκαστικό διάλυμα και εφαρμόζουμε μέσα σε λίγες ώρες.
13. **Φάσμα δράσης:**

| ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΟΣΕΙΣ | | | ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
|---|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | (γραμ. σκ./100 lt νερό) | Λίτρα ψεκ. υγρ./στρ. | (γραμ. σκ. / στρέμμα) | |
| Καρποφόρα Λαχανικά: -Τομάτα, -Μελιτζάνα Τομάτα, Μελιτζάνα (θερμοκηπίου) | -Λιριόμυζα (Liriomyza spp.) | 18,5 | 50-100 | 9,25-18,5 | Με ψεκασμό φυλλώματος προληπτικό ή στα αρχικά στάδια προσβολής κάθε 7 ημέρες. |
| | | 30 | | 15-30 | Σε εκδηλωμένη έντονη προσβολή και μέχρι την καταστολή της, κάθε 7 ημέρες. |
| | | ---- | | 20-100 | Από το έδαφος εφαρμογή είτε με το σύστημα ποτίσματος είτε με ριζοπότισμα φυτό-φυτό. Η δόση είναι ανάλογη με τη διάρκεια δράσης που θέλουμε να επιτύχουμε και αντιστοιχεί σε 1-3 μήνες. |

| ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΣΤΟΧΟΙ | (γραμ. σκ./100 lt νερό) | Λίτρα ψεκ. υγρ./στρ. | (γραμ. σκ. / στρέμμα) | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
|---|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό (Αγγούρια, Κολοκύθια) Αγγούρια, Κολοκύθια (θερμοκηπίου) | -Λιριόμυζα (Liriomyza spp.) | 18,5 | 50-80 | 9,25-14,8 | Με ψεκάσμο φυλλώματος προληπτικό ή στα αρχικά στάδια προσβολής κάθε 7 ημέρες. |
| | | 30 | | 15-24 | Με εκδηλωμένη έντονη προσβολή και μέχρι την καταστολή της, κάθε 7 ημέρες. |
| | | --- | | 20-100 | Από το έδαφος εφαρμογή είτε με το σύστημα ποτίσματος είτε με ριζοπότισμα φυτό-φυτό. Η δόση είναι ανάλογη με τη διάρκεια δράσης που θέλουμε να επιτύχουμε και αντιστοιχεί σε 1-3 μήνες. |
| Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: -Πεπόνι -Πεπόνι θερμοκηπίου | -Λιριόμυζα (Liriomyza spp.) | 18,5 | 50-100 | 9,25-18,5 | Με ψεκάσμο φυλλώματος προληπτικό ή στα αρχικά στάδια προσβολής κάθε 7 ημέρες. |
| | | 30 | | 15-30 | Σε εκδηλωμένη έντονη προσβολή και μέχρι την καταστολή της, κάθε 7 ημέρες. |
| | | --- | | 20-100 | Από το έδαφος εφαρμογή είτε με το σύστημα ποτίσματος είτε με ριζοπότισμα φυτό-φυτό. Η δόση είναι ανάλογη με τη διάρκεια δράσης που θέλουμε να επιτύχουμε και αντιστοιχεί σε 1-3 μήνες. |
| Φυλλώδη λαχανικά και νωπά αρωματικά φυτά Σέλινο | -Λιριόμυζα (Liriomyza spp.) | 18,5 | 50-80 | 9,25-14,8 | Με ψεκάσμο φυλλώματος προληπτικό ή στα αρχικά στάδια προσβολής κάθε 7 ημέρες. |
| | | 30 | | 15-24 | Σε εκδηλωμένη έντονη προσβολή και μέχρι την καταστολή της, κάθε 7 ημέρες. |
| Στελεχώδη λαχανικά Αγκινάρα (μόνο αγρού) | -Λιριόμυζα (Liriomyza spp.) | 18,5 | 100 | 18,5 | Με ψεκάσμο φυλλώματος προληπτικό ή στα αρχικά στάδια προσβολής κάθε 7 ημέρες. |
| | | 30 | | 30 | Σε εκδηλωμένη έντονη προσβολή και μέχρι την καταστολή της, κάθε 7 ημέρες. |
| Ανθοκομικά | -Λιριόμυζα (Liriomyza spp.) | 18,5 | 50-100 | 9,25-18,5 | Με ψεκάσμο φυλλώματος προληπτικό ή στα αρχικά στάδια προσβολής κάθε 7 ημέρες. |
| | | 30 | | 15-30 | Σε εκδηλωμένη έντονη προσβολή και μέχρι την καταστολή της, κάθε 7 ημέρες. |
| | | --- | | 18,5-130 | Από το έδαφος εφαρμογή είτε με το σύστημα ποτίσματος είτε με ριζοπότισμα φυτό-φυτό. Η δόση είναι ανάλογη με τη διάρκεια δράσης που θέλουμε να επιτύχουμε και αντιστοιχεί σε 1-3 μήνες. |

Παρατηρήσεις:

1. **(SZ3)** Δεν πρέπει να σπέρνεται ή να φυτεύεται άλλη καλλιέργεια πλην του γλυκού Καλαμποκιού πριν περάσουν 3 μήνες από την εφαρμογή.
2. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:
Τομάτα, Μελιτζάνα (αγρού-θερμοκηπίου), Πεπόνι, Αγγούρια, Κολοκύθι (αγρού-θερμοκηπίου) για την εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος, Αγκινάρα μόνο αγρού, Σέλινο: **3**.
Τομάτα και Μελιτζάνα (αγρού-θερμοκηπίου), Αγγούρια, Κολοκύθια και Πεπόνια θερμοκηπίου για την εφαρμογή από εδάφους: **1**.
14. **Φυτοτοξικότητα:**
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
15. **Συνδυαστικότητα:** -----
16. **Σημάνσεις:** Xn – Επιβλαβές, N – επικίνδυνο για το περιβάλλον.
17. **Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**
(R20) Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
(R38) Ερεθίζει το δέρμα.
18. **Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις και R φράσεις):**
(R51/53) Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
(RO3) Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.
(RO15) Βλαβερό για τα πουλιά.
19. **Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**
(S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
(S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
(S23) Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
(S36/37) Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
(S46) Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
(SY12) Κρατήστε μακριά από την ψεκασμένη περιοχή άσχετα πρόσωπα για 7 ημέρες. Να μην εισέρχονται στην περιοχή δίχως προστατευτική ενδυμασία πριν περάσουν 7 ημέρες από την εφαρμογή. Να μην εκτίθενται στο σκεύασμα οι έγκυες.
20. **Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:**
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
Σε περίπτωση κατάποσης πιείτε 1-2 ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό ενεργώντας με μηχανικό τρόπο στο φάρυγγα.
Χορηγήστε ενεργό άνθρακα με την προϋπόθεση ότι ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του.
Αν υπάρξει ερεθισμός του δέρματος ή των οφθαλμών ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Αν εισπνευσθεί μεταφερθείτε σε καθαρό αέρα.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.
21. **Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO και S φράσεις):**
(SO6) Κρατήστε τα κοτόπουλα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 7 ημέρες.

- (S60) Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
(S61) Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. **Απαγορεύσεις (Α φράσεις):** Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες καλλιεργητές.

23. **Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

- (Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Καλλιέργειες θερμοκηπίου: 7 ημέρες
Καλλιέργειες υπαίθρου: 14 ημέρες

24. **Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Το σκεύασμα αποθηκευμένο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

II. Ετικέτα:

- α) Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/97, την Οδηγία 1999/45 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με την παρούσα Απόφαση.
β) Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2009**.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, να υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ