



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 3 - 6 - 2009
Αριθ. πρωτ: 129362

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ.
Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: svg036@minagric.gr

Προς: AlzChem Trostberg GmbH
CHEMIEPARK TROSTBERG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Germany

(δια της
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
Φλέμινγκ 15
Μαρούσι 15123
(με απόδειξη)

- Κοιν.: 1. Γραφείο κ. Υφυπουργού
κ. .Κ. Κιλτίδη
2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 8181
οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθμιστική
ουσία) SITOFEEX 1 EC ως προς το φάσμα
δράσης»

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ.6 αυτού.
2. Την με αριθμό 8181 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SITOFEK 1 EC που χορηγήθηκε με την με αριθμό πρωτ, 119415/30-5-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3. Τη γνωμοδότηση του **Α.Σ.Υ.Γ.Ε.Φ.** για το **6^ο** θέμα της **7^{ης}/15-5-2009** Συνεδρίασης του.
4. Το Π.Δ. 206/2007, Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών, (ΦΕΚ 232^Α/19.9.2007).
5. Τη με αριθ.263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47Β'/18.1.2008) απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υπουργού”».
6. Την από 1-6-2004 αίτηση της εταιρείας AlzChem Trostberg GmbH Γερμανίας.

Αποφασίζουμε

A Τροποποιούμε την με αριθμό 8181 οριστική έγκρισης του SITOFEEX 1 EC που χορηγήθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 119415/30-5-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς το φάσμα δράσης (προσθήκη της καλλιέργειας αμπέλι ,επιτραπέζια ποικιλία σουλτανίνα)

Συγκεκριμένα

Τα σημεία 4, 5.1, 8 & 13.2 διαμορφώνονται ως εξής:

<p>4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:</p>	<p>Φυτορρυθμιστικό σκεύασμα που αυξάνει το μέγεθος των καρπών του ακτινιδίου και του αμπελιού (επιτραπέζια ποικιλία σουλτανίνα)</p> <p>Το δρων συστατικό του σκευάσματος, forchlorfenuron (CPPU), είναι παράγωγο της φαινυλουρίας και έχει δράση παρόμοια της κυτοκινίνης..</p> <p>Όπως και οι φυσικές κυτοκινίνες το forchlorfenuron προάγει τη διαίρεση και την αύξηση των κυττάρων φυτικών ιστών. Δεν μετακινείται μέσα στα φυτά ούτε μεταφέρεται από τα ψεκασμένα φύλλα στους καρπούς και από τον ένα καρπό στον άλλον.</p>
--	---

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Ακτινίδιο	αύξηση του βάρους και του μεγέθους των καρπών	50-100	Για ψεκασμούς κάλυψης φυλλώματος: 100 λίτρα /στρ. Για κατευθυνόμενους ψεκασμούς στους καρπούς: 50 λίτρα /στρ.	Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης του φυλλώματος ή κατευθυνόμενοι ψεκασμοί στους καρπούς. Χρόνος εφαρμογής: 3 εβδομάδες μετά την πλήρη άνθηση *	1
Αμπέλι (επιτραπέζια ποικιλία σουλτανίνα)	Αύξηση του βάρους και του μεγέθους των καρπών	50-100	Για ψεκασμούς κάλυψης φυλλώματος: 100 λίτρα/στρ. Για κατευθυνόμενους ψεκασμούς στους καρπούς: 50 λίτρα/στρ	Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης του φυλλώματος ή κατευθυνόμενοι ψεκασμοί στους βότρες όταν η ράγα έχει διάμετρο 4-6 χιλιοστά. **	1
<ul style="list-style-type: none"> *Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται νωρίτερα από 3 εβδομάδες από την πλήρη άνθηση, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει παραμορφώσεις στην άκρη των ψεκασθέντων καρπών **Κατά το χρόνο εφαρμογής του SITOFEK 1 EC εφαρμόζεται ο συνήθης ψεκασμός γιββερελλινών. Το SITOFEK 1 EC μπορεί να συνδυαστεί με τα συνήθη σκευάσματα γιββερελλινών. 					

8

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό για τις εγκεκριμένες χρήσεις εφόσον πληρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ακτινίδιο	Δεν ορίζεται
Αμπέλι (επιτραπέζια ποικιλία Σουλτανίνα)	Δεν ορίζεται

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ, 119415/30-5-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 8181 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SITOFEK 1 EC

ΕΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ

Δ-7 (GAP)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κοινή ονομασία ή κατά EEC, CIPAC and CCPR No (s): forchlorfenuron (CPPU)

Εμπορικό όνομα: **SITOFEX EC**

Κύριες χρήσεις π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο: Φυτορρυθμιστική ουσία

Ημερομηνία:

Σελίδα: 1

Χώρα: Ελλάδα

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
					Μορφή	Περιεκ σε δ.ο.	Μέθοδος/ τρόπος	Στάδιο Ανάπτυξης και εποχή (ι)	Αριθμός Εφαρμογών Ελάχ. Μεγ.	Χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	γρ δ.ο. / εκατόλιτρο	λίτρα ψεκαστ. /εκτάριο ελαχ. μεγ.	Γρ. δ.ο. /εκτάριο ελάχ. μεγ.		
(α)			(β)	(γ)	(δ-στ)	(θ)	(στ-η)	(κ)					(λ)	(μ)	
Καλλιέργεια Καυή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσματος	(Α) (Θ) (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκευάσμα		Εφαρμογή					Δοσολογία ανά επέμβαση			
Ακτινίδιο	Ελλάδα	SITOFEX EC	A	Αύξηση του μεγέθους των καρπών	EC Συμπυκνωμένο εναιώρημα	10 g/l	1. Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης 2. κατευθυνόμενος ψεκασμός στους καρπούς	3 βδομάδες μετά την πλήρη άνθηση	1	Μη εφαρμοσίμο	0.5-1.0	1. καθολικός ψεκασμός: 1000 2. κατευθυνόμενος ψεκασμός: 500	1. καθολικός ψεκασμός: 5-10 2. κατευθυνόμενος ψεκασμός: 2.5-5	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής	-
Αμπέλι (επιτραπέζια ποικιλία σουλτανίνα)	Ελλάδα	SITOFEX EC	A	Αύξηση του μεγέθους των καρπών	EC Συμπυκνωμένο εναιώρημα	10 g/l	1. Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης 2. κατευθυνόμενος ψεκασμός στους καρπούς	όταν η ράγα έχει διάμετρο 4-6 χιλιοστά.	1	Μη εφαρμοσίμο	0.5-1.0	1. καθολικός ψεκασμός: 1000 2. κατευθυνόμενος ψεκασμός: 500	1. καθολικός ψεκασμός: 5-10 2. κατευθυνόμενος ψεκασμός: 2.5-5	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής	

Παρατηρήσεις:

(α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex(και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκει εφαρμογή, οι συνθήκες

(η) Τρόπος, πχ σε όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά-ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται