



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 3 - 6 - 2009
Αριθ. πρωτ: 129357

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Λ. Σωτηροπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 244
e-mail: svg035@minagric.gr

Προς: Σ.Ε.Γ.Ε. ΑΒΕΕ
Εθν. Αντιστάσεως 84
152 31 – Χαλάνδρι, Αθήνα
(με απόδειξη)

- Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού
κ. Σ. Χατζηγάκη
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
κ. Κ. Κιλτίδη
3. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
4. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
5. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
6. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
7. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
Εσωτερική διανομή:
8. -Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
9. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 125752/17-2-2009 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. 14170/12-2-2007 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CAMCIS 50 WP ως προς το φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Την με αριθ. **125752/17-2-2009** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. **14170/12-2-2007** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **CAMCIS 50 WP**.
3. Το από 9-3-2009 Υπηρεσιακό σημείωμα της ομάδας αξιολόγησης υπολειμμάτων της Υπηρεσίας μας.
4. Την με αριθ. 127623/1-4-2009 επιστολή της εταιρείας Gowan Comercio Internacional e Servicos Limitada, Πορτογαλίας (διά της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.) με την οποία συναινεί στην χρήση των στοιχείων υπολειμμάτων.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 206/19-9-2007 (ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την με αριθμό 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής διεύθυνσης Προϊσταμένους Διεύθυνσης και προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υπουργού”».
7. Την με αριθ. πρωτ. 128768/7-5-2009 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Τροποποιούμε την με αριθ. **125752/17-2-2009** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. **14170/12-2-2007** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **CAMCIS 50 WP** ως προς το φάσμα δράσης (στα μηλοειδή).

Συγκεκριμένα το σημείο **5 φάσμα δράσης** {στα μηλοειδή (μηλιά και αχλαδιά)} διαμορφώνεται ως εξής:

5		Φάσμα δράσης			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος				
		γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	γρ./ στρέμμα	όγκος ψεκ. υγρού, λίτρα / στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΑΟΕΙΑΗ: - Γκρέϊπ-φρουτ, - Λεμονιά, - Μανταρινιά, - Πορτοκαλιά	-Μύγα Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>)	120	240-480	200-400	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες.	3
	-Κόκκινη Ψώρα (<i>Aonidiella aurantii</i>)	140	280-560			
	-Ψευδόκοκκος (<i>Pseudococcus citri</i>)	140	280-560			
ΜΗΛΟΕΙΑΗ: - Μηλιά, - Αχλαδιά	-Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i>) -Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>) -Οπλοκάμπη (<i>Hoplocampa brevis</i>) -Φυλλοδέτες (<i>Adoxophyes orana</i>) -Φυλλορύκτες (<i>Phyllonorycter blancardella</i> , <i>P. corylifoliella</i>) -Ψύλλα (<i>Psylla pyri</i>) -Βαμβακάδα (<i>Diaspis pentagona</i>) -Αιματόψειρα (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	120-140	120-140	100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών.	2

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ: - Κερασιά	-Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>) -Καρπόκαψα (<i>Cydia molesta</i>) -Ανθονόμους (<i>Anthonomus ornatus</i>) -Ρυγχίτης (<i>Rhynchites bacchus</i>)	120	180-300	150-250	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες.	2
	-Βαμβακάδα (<i>Diaspis spp.</i>)	140	210-350			
Αραβόσιτος	-Σεζάμια (<i>Sesamia nonagrioides</i>), -Πυραλίδα (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	120	60-120	50-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες.	2
Τεύτλα	-Κλεονός (<i>Bothynoderes punctiventris</i>)	120	72-96	60-80	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες.	2
Τριφύλλι	Κάμπιες τριφυλλιού	120	36-60	30-50	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες.	2

Παρατηρήσεις:

1. Για την καταπολέμηση των κοκκοειδών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με θερινό πολτό.
2. Για την καταπολέμηση των κοκκοειδών στα εσπεριδοειδή επαναλαμβάνεται η εφαρμογή, εάν χρειασθεί ανάλογα με την προσβολή των κοκκοειδών μέχρι τρεις (3) εφαρμογές ανά περίοδο.
3. Να μην επαναχρησιμοποιείται πριν περάσουν 30 ημέρες από την προηγούμενη εφαρμογή.
4. Η δόση των 140 γρ. αναφέρεται στην καταπολέμηση των κοκκοειδών.
5. Στα κοκκοειδή εφαρμόζεται όταν έχουμε το μέγιστο των κινητών προνυμφών, που συμπίπτει με το 60-65% της εκκόλαψης των αυγών.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. **125752/17-2-2009** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. **14170/12-2-2007** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **CAMCIS 50 WP**.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Handwritten signature]

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ