



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 7-5-2007
Αριθ. Πρωτ.: 118701

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Τ.Κ.: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Φονταρά
Τηλέφωνο: 210 92 87 228
FAX: 210 92 12 090

ΠΡΟΣ: 1) Εταιρείες παρασκευής
εισαγωγής και αντιπροσώπους
φυτοπροστατευτικών προϊόντων
ως Π.Δ.

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των εγκρίσεων των
σκευασμάτων που περιέχουν folpet,
σε εφαρμογή της με αριθ.
2006/92/ΕΚ οδηγίας»**

Σας γνωρίζουμε ότι με την οδηγία **2006/92/ΕΚ** της Επιτροπής της 09.11.2006 (L.311/10.11.2006), ορίστηκαν νέα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs), για τη δ. ο. folpet, τα οποία θα ισχύουν από τις 11 Μαΐου 2007.

Οι κάτοχοι εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν **folpet**, παρακαλούνται:

- 1) Να ενημερώσουν τους πελάτες τους για την αποφυγή χρήσης στις καλλιέργειες : **Αμυγδαλιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Αμπέλι για επιτραπέζια σταφύλια μετά το τέλος της άνθησης, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι, Λάχανο, Καρότο**, επειδή από τη μέχρι σήμερα εγκεκριμένη χρήση αναμένονται υπολείμματα ανώτερα των MRLs.
- 2) Να υποβάλουν άμεσα, και όχι αργότερα από τις 10 Μαΐου 2007, αίτηση για τροποποίηση της έγκρισης, έτσι ώστε από τη χρήση τους να μην παράγονται προϊόντα με υπολείμματα ανώτερα από τα θεσπισθέντα.

Σε περίπτωση μη υποβολής σχετικής αίτησης, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει σε ανάκληση της αντίστοιχης έγκρισης, μετά το τέλος Μαΐου 2007.

Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε τις καλλιέργειες και τις δόσεις με τις οποίες, με την ορθή γεωργική πρακτική, δεν αναμένονται υπολείμματα ανώτερα από τα οριζόμενα στην οδηγία. Το φάσμα δράσης, καθώς και ο μέγιστος αριθμός επεμβάσεων, οι παρατηρήσεις, οι περιορισμοί και η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ (Μέγιστες)			Μέγ. Αριθμός Εφαρμογών / καλ. περίοδο	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
		Κιλά δ.ο./100 λίτρα ψεκ. υγρό	Λίτρα νερού /στρέμμα	Κιλά δ.ο./στρέμμα		
<p>Αμπέλι για οينوποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια</p> <p>για οينوποιήσιμα σταφύλια</p> <p>για επιτραπέζια σταφύλια</p>	<p>Φώμοψη (<i>Phomopsis viticola</i>)</p> <p>Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)</p> <p>Τεφρά σήψη (<i>Botrytis cinerea</i>)</p> <p>»</p>	0,120	50-150	0,180	4	<p>1-3 ανοιξιάτικες εφαρμογές:</p> <ul style="list-style-type: none"> -έκπτυξη ματιών -αμέσως μετά το σχηματισμό του 1^{ου} φύλλου -στάδιο 2-3 φύλλων. <p>-Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 8-10 εκ.</p> <ul style="list-style-type: none"> -μετά από 10 ημέρες -λίγο πριν την άνθηση -λίγο μετά τη γονιμοποίηση. <p>-Τέλος άνθησης</p> <ul style="list-style-type: none"> -αρχή καρπόδεσης -πριν από το κλείσιμο των σταφυλιών -αρχή ωρίμανσης <p>-Τέλος άνθησης</p>
Κρεμμύδι	<p>Περονόσπορος (<i>Phytophthora destructor</i>)</p> <p>Αλτερναρίωση (<i>Alternaria spp.</i>)</p>	0,120	40-50	0,060	3	Οι επεμβάσεις αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα.
Τομάτα υπαίθρου	<p>Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)</p> <p>Αλτερναρίωση (<i>Alternaria spp.</i>)</p>	0,120	50-100	0,120	3	Οι επεμβάσεις αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα.
Πεπόνι υπαίθρου, Καρπούζι υπαίθρου	<p>Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)</p> <p>Ανθράκνωση (<i>Colletotrichum sp.</i>)</p>	0,120	50-100	0,120	3	Οι επεμβάσεις αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα.
Πατάτα	<p>Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)</p> <p>Αλτερναρίωση (<i>Alternaria spp.</i>)</p>	0,120	50-100	0,120	3	Οι επεμβάσεις αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα.
Γαριφαλιά	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria sp.</i>)	0,120	50-100	0,120	3	Οι επεμβάσεις αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα.

Παρατηρήσεις :

1. Έχει μέτρια δράση στην καταπολέμηση του Περονόσπορου, Ανθράκνωσης, Σκληρωτινίασης και Κλαδοσπορίωσης της τομάτας και του πεπονιού.
2. Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ελαφρά αύξηση ακάρεων.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Αμπέλι: για οινοποιήσιμα σταφύλια: 42 ημέρες

για επιτραπέζια σταφύλια: στο τέλος της άνθησης.

Κρεμμύδι: 21 ημέρες

Τομάτα (υπαίθρου): Στο τέλος της πρώτης ανθοφορίας.

Πεπόνι (υπαίθρου): 21 ημέρες

Καρπούζι υπαίθρου): 21 ημέρες

Πατάτα: 21 ημέρες



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α.α.

Θ. ΝΟΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

- 1) ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
- 2) ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.
- 3) BASF Agro Ελλάς ΑΒΕΕ
- 4) BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
- 5) SYNGENTA Hellas ΑΕΒΕ
- 6) VECTOR AGRO S.A.
- 7) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
- 8) Ν. Αυτοδιοικήσεις- Δ/νσεις Γεωργίας, Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, με e-mail
- 9) ΕΣΥΦ, Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
- 10) ΠΟΣΕ Γεωπόνων, Διδότου 26, Αθήνα