



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 14 - 05 - 2003

Αριθ. πρωτ.: 100488

Ταχ. Διεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5

ΠΡΟΣ: 1. ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.

Ταχ. Κώδικας : 101 64 – ΑΘΗΝΑ

Δ. Γληνού 32

TELEFAX : 210 36 17 103

Τ.Κ. 542 49

Πληροφορίες : Ηλ. Νασιόπουλος

Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο : 210 212 45 08

(με απόδειξη)

2. Διευθύνσεις Γεωργίας

Έδρες τους

3. Διευθύνσεις Εμπορίου

Έδρες τους

4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό

Ινστιτούτο

Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών

Φαρμάκων

Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστα-
τευτικό προϊόν (εντομοκτόνο)
PHOSALONE-ΥΨΙΛΟΝ 35 EC"

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 (ΦΕΚ 298/Α/1977) «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2 (παρ. 2) και το άρθρο 5 (παρ. 2 και 8).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» Κεφ.Β., παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83346/28.7.86 (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά τον «καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97) Προεδρικό Διάταγμα.
4. Τη με αριθ. 88121/3.2.99 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 1785/3.2.99 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) FOXY 35 EC.
5. Τη με αριθ. 399580/30.10.2001 (ΦΕΚ 1479/Β/31.10.2001) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη".
6. Τις από 10-5-2002, 17-3-2003, 4-4-2003, 8-4-2003 και 14-4-2003 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 4-4-2003 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **1984** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** PHOSALONE-ΥΨΙΛΟΝ 35 EC
2. **Μορφή:** υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** phosalone 35% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 64,58% β/β
4. **Καθαρότητα technical από τα οποία παρασκευάζεται:** 95% min.
5. **Παρασκευαστής:** ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε., Δ. Γληνού 32, 542 49 – Θεσσαλονίκη.
6. **Αντιπρόσωπος:** -----
7. **Τυποποιητής:** CHIMAC AGRIPHAR, Βέλγιο.
8. **Συσκευαστής:** CHIMAC AGRIPHAR, Βέλγιο.
9. **Συσκευασία:** 9α. **Είδος και Μέγεθος:** Φιάλες των 100, 150, 200, 250, 500 κ.εκ. και 1 λίτρου.
9β: **Υλικό:** Φιάλες τύπου COEX εντός χαρτοκυτίων.
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**
Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου. Καταπολεμά μυζητικά και μασητικά έντομα καθώς και ακάρεα.
11. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.
12. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε την απαιτούμενη ποσότητα φαρμάκου σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
13. **Φάσμα δράσης:**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./100 λίτρα νερό)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΗΛΟΕΙΔΗ -ΜΗΛΙΑ -ΑΧΛΑΔΙΑ	Καρπόκαψα (<i>Carposcapa pomonella</i>)	150	Συνιστώνται δύο ψεκασμοί: στην έκπτυξη των οφθαλμών και μετά την πτώση των πετάλων.
	Κοκκοειδή (<i>Coccoidea</i> , <i>Diaspididae</i>) Ζευζέρα (<i>Zeuzera pyrina</i>) Φυλλοφάγες κάμπιες λεπιδοπτέρων (<i>Lyonetia</i> sp., <i>Leucoptera</i> sp., <i>Lithocolletis</i> sp., <i>Phyllonorycter</i> sp.) Αφίδες (<i>Myzus</i> spp.) Ανθονόμος (<i>Anthonomus pomorum</i>) Οπλοκάμπη (<i>Homlocampa</i> sp.) Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>) Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus</i> sp.) (2)* Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidotus perniciosus</i>)	200	

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ	Καρπόκαψα (<i>Carpocapsa pomonella</i>) Κερασιά (<i>Carpocapsa molesta</i>) Κοκκοειδή (Coccoidea, Diaspididae) Ζευζέρα (<i>Zeuzera pyrina</i>) Φυλλοφάγες κάμπιες λεπιδοπτέρων (<i>Lyonetia</i> sp., <i>Leucoptera</i> sp., <i>Lithocolletis</i> sp., <i>Phyllonorycter</i> sp.) Αφίδες (<i>Myzus</i> spp.) Ανθονόμος (<i>Anthonomus pomorum</i> , <i>Anthonomus amygdali</i> , <i>Anthonomus ornatus</i>) Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>) Τετράνυχοι (<i>Tetranychus</i> sp.) (2)* Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i>)	150	Συνιστώνται δύο ψεκασμοί: στην έκπτυξη των οφθαλμών και μετά την πτώση των πετάλων.
ΑΜΠΕΛΙ	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>)	200	Γενικά πρέπει να προβλέπονται δύο ψεκασμοί: όταν οι ανθοφόροι οφθαλμοί είναι πλήρως διαχωρισμένοι και πριν το κλείσιμο του σταφυλιού.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ	Φυλλοφάγες κάμπιες Αλτες (<i>Chetocnema</i> sp., <i>Longitarsus</i> sp.) Θρίπες (<i>Thrips</i> sp.) Αφίδες (<i>Aphis</i> sp., <i>Myzus</i> sp.) Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i>) Πιερίδα (<i>Pieris</i> sp.) Δίπτερα (<i>Liriomyza</i> sp., <i>Hylemyia</i> sp.) Κολεόπτερα (<i>Epilachna chrysomelina</i> , <i>Bruchus pisorum</i> , <i>Phyllotreta memorum</i>)	120-175 (1)*	Με την εμφάνιση των προσβολών. Εφ' όσον υπάρχει πρόβλημα επανάληψη εφαρμογής μετά 14 ημέρες.

ΠΑΤΑΤΑ	Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) Φθοριμαία (<i>Phthorimaea operculella</i>)	150-200 (1)* κ.εκ./στρέμμα	Ψεκασμός όταν οι προνύμφες μέγεθος κόκκων σταριού.
ΤΕΥΤΛΑ	Πεγκόμυγα (<i>Pegomyia betae</i>) Κλεονός (<i>Botryodes ructiventris</i>) Αφίδες (<i>Aphis</i> sp.) Λύξος (<i>Lixus</i> sp.) Φθοριμαία (<i>Phthorimaea operculella</i>)	120 κ.εκ./στρέμμα	Με την εμφάνιση των προσβολών. Εφ' όσον υπάρχει πρόβλημα επανάληψη εφαρμογής μετά 14 ημέρες.
ΜΗΔΙΚΗ Τριφύλλια	Κηκιδόμυγα των ανθέων (<i>Contarinia medicaginis</i>) Αφίδες (<i>Aphis</i> sp.) Θρίπες (<i>Thrips</i> sp.) Σιτόνα (<i>Sitona</i> sp.) Φυτονόμος (<i>Phytonomus</i> sp.)	200 κ.εκ./στρέμμα	Με την εμφάνιση των προσβολών. Εφ' όσον υπάρχει πρόβλημα επανάληψη εφαρμογής μετά 14 ημέρες.
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ	Φυλλοφάγες κάμπιες Αλτες (<i>Chetocnema</i> sp.) <i>Longitarsus</i> sp.) Θρίπες (<i>Thrips</i> sp.) Αφίδες (<i>Aphis</i> sp.) <i>Myzus</i> sp)	120-175 (1)*	Με την εμφάνιση των προσβολών. Εφ' όσον υπάρχει πρόβλημα επανάληψη εφαρμογής μετά 14 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

1. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:

Μηλοειδή:	100-200 λίτρα.
Πυρηνόκαρπα:	150-250 λίτρα.
Αμπέλι:	50-150 λίτρα
Λαχανικά:	50-100 λίτρα
Πατάτα:	50-100 λίτρα
Τεύτλα:	40 λίτρα
Καλλωπιστικά:	50-100 λίτρα

2. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Μηλοειδή:	2 εφαρμογές
Πυρηνόκαρπα:	2 >>

Αμπέλι:	2	>>
Λαχανικά:	2	>>
Πατάτα:	1	εφαρμογή
Τεύτλα:	2	εφαρμογές
Μηδική:	2	>>
Τριφύλλι:	2	>>
Καλλωπιστικά:	2	>>

3. Οι μεγάλες δόσεις χρησιμοποιούνται όταν έχουμε έντονη προσβολή και όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται στο μέγιστο της ανάπτυξής τους.

4. Μπορεί να προκαλέσει ανθεκτικότητα στα ακάρεα. Αν παρατηρηθεί μην αυξάνετε τις δόσεις, αλλά χρησιμοποιήστε σκεύασμα με άλλη δραστική ουσία (συμβουλευτείτε γεωπόνο).

14. **Φυτοτοξικότητα:** Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Μην χρησιμοποιείτε μεγαλύτερες από τις συνιστώμενες δόσεις σε Golden delicious ή άλλες κίτρινες ποικιλίες μηλιάς γιατί μπορεί να προκληθεί φυτοτοξικότητα.

15. **Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

16. **Σήμανση τοξικότητας:** Xn – επικίνδυνο, Xi – ερεθιστικό.

17. **Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

R21	ΒΛΑΒΕΡΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
R22	ΒΛΑΒΕΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
R36	ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
R10	ΕΥΦΛΕΚΤΟ

18. **Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):**

RO2	-Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες.
RO5	-Τοξικό για τα ψάρια
RO11	-Βλαβερό για τα παραγωγικά ζώα.

19. **Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):**

S1/2	Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από τα παιδιά
S13	Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα και ποτά και ζωοτροφές
S20/S21	Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε
S23	Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
S24/25	Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα
S26/S28	Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S35	Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας, αφού τα πλύνετε καλά με νερό, με τρύπημα ή σύνθλιψη. Η χρήση τους για οποιοδήποτε σκοπό είναι επικίνδυνη
S36/37-SY2	Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια από νεοπρένιο ή PVC
SY8	Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό
SY10	Μην αυξάνετε τις δόσεις

20. **Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:**

S26	Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S28	Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
S44	Αν αισθανθείτε αδιαθεσία (πονοκέφαλο, ίλιγγους, ναυτία), ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Το σκεύασμα είναι παρεμποδιστής χοληνεστεράσης. Χορηγείστε ατροπίνη ή 2-PAM.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

- (SO2) - Μη ψεκάσετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες.
- (SO4) - Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
- (SO5) - Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για τέσσερις (4) εβδομάδες.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

- (Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 21 ημέρες.

24. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόμενο σε θερμοκρασίες κάτω των 25° C, προστατευόμενο από το απ' ευθείας ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Κείμενο ετικέτας:

- α.** Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην υπηρεσία εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2007.

- β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ