

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **1737** στο γεωργικό φάρμακο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** YPSILON - PALLAS 5 DP
2. **Μορφή:** Σκόνη επίπασης (DP)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** malathion 5%
βοηθητικές ουσίες: 94,74 %
4. **Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** 95% min
5. **Παρασκευαστής:** ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε., Τσιμισκή 42, 546 23 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6. **Αντιπρόσωπος:** -
7. **Τυποποιητής:** CHIMAC-AGRIPHAR S.A., Βέλγιο
8. **Συσκευαστής:** CHIMAC-AGRIPHAR S.A., Βέλγιο
9. **Συσκευασία: 9.1. Είδος-Μέγεθος:** α. Βαζάκια των **200** και **250** γραμμαρίων.
β. Σακούλες των **50** γρ., **100** γρ., **500** γρ., **1** κιλού, **2** κιλών, **5** κιλών, **10** κιλών και **25** κιλών.
γ. Σακούλες των **500** γρ., **1** κιλού, **2** κιλών, **5** κιλών, **10** κιλών και **25** κιλών εντός χαρτοκυτίου.
9.2. Υλικό: α. Πλαστικά βαζάκια.
β. Σακούλες πολυαιθυλενίου.
γ. Σακούλες πολυαιθυλενίου εντός χαρτοκυτίου.
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:**
Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και αναπνοής. Δρα σε μυζητικά και μασητικά έντομα.
11. **Τρόπος εφαρμογής:** Σκονίσματα.
12. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** ---- (εφαρμόζεται ως έχει).
13. **Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κιλά ανά στρέμμα)	ποσότητα δ.ο. ανά εκτάριο	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθ. εφαρμ. ανά καλλιεργ. περίοδο
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, γκρέϊπ-φρούτ)	-Κοκκοειδή: (Chrysomphallus dictyospermi, Lepidosaphes beckii)	2	1 κιλό	Με την εμφάνιση των εντόμων	3
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, αχλαδιά)	-Αφίδες (Myzus spp., Aphis spp.) -Σκαθάρια (Coleoptera) -Θρίπες (Thrips spp.) -Διάφορες φυλλοφάγες κάμπιες (Saturni pyri, Rhabdopalpa spp.)	2	1 κιλό	Με την εμφάνιση των εντόμων	3

	-Ρυγχίτης (<i>Rhynchites</i> spp.)				
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, κερασιά, ροδακινιά βυσσινιά)	-Αφίδες (<i>Myzus</i> spp., <i>Aphis</i> spp.) -Σκαθάρια (<i>Coleoptera</i>) -Διάφορες φυλλοφάγες κάμπιες (<i>Saturni pygi</i> , <i>Rhaphidopalpa</i> spp.) Ρυγχίτης (<i>Rhynchites</i> spp.)	2	1 κιλό	Με την εμφάνιση των εντόμων	3
ΑΜΠΕΛΙ	-Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>)	2	1 κιλό	Με την εμφάνιση των εντόμων	3
ΦΡΑΟΥΛΑ	-Αφίδες (<i>Myzus</i> spp., <i>Aphis</i> spp.) -Σκαθάρια (<i>Coleoptera</i>) -Διάφορες φυλλοφάγες κάμπιες (<i>Saturni pygi</i> , <i>Rhaphidopalpa</i> spp.) -Βρωμούσες (<i>Rhaphigaster nebulosa</i> , <i>Nerata viridula</i>) -Θρίπας (<i>Thrips</i> spp.)	2	1 κιλό	Με την εμφάνιση των εντόμων	3
ΣΥΚΙΑ	-Λογχαία (<i>Lonchaea aristella</i>)	2	1 κιλό	Με την εμφάνιση των εντόμων	3
ΕΛΙΑ	-Πυρηνοτρήτης (<i>Prays oleae</i>)	2	1 κιλό	Με την εμφάνιση των εντόμων	2
ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, πεπόνι, κολοκύθι, καρπούζι)	-Αφίδες (<i>Myzus</i> spp., <i>Aphis</i> spp.) -Σκαθάρια (<i>Coleoptera</i>) -Διάφορες φυλλοφάγες κάμπιες (<i>Saturni pygi</i> , <i>Rhaphidopalpa</i> spp.) -Βρωμούσες (<i>Rhaphigaster nebulosa</i> , <i>Nerata viridula</i>) -Θρίπας (<i>Thrips</i> spp.)	2	1 κιλό	Με την εμφάνιση των εντόμων	3
ΜΗΔΙΚΗ	-Αφίδες (<i>Myzus</i> spp., <i>Aphis</i> spp.) -Σκαθάρια (<i>Coleoptera</i>) -Διάφορες φυλλοφάγες κάμπιες (<i>Saturni pygi</i> , <i>Rhaphidopalpa</i> spp.)	2	1 κιλό	Με την εμφάνιση των εντόμων	3
ΑΡΑΧΙΔΑ	-Αφίδες (<i>Myzus</i> spp., <i>Aphis</i> spp.) -Σκαθάρια (<i>Coleoptera</i>) -Διάφορες φυλλοφάγες κάμπιες (<i>Saturni pygi</i> , <i>Rhaphidopalpa</i> spp.)	2	1 κιλό	Με την εμφάνιση των εντόμων	3
ΒΑΜΒΑΚΙ	-Αφίδες (<i>Myzus</i> spp., <i>Aphis</i> spp.)	2	1 κιλό	Με την εμφάνιση των εντόμων	3

	-Σκαθάρια (Coleoptera) -Διάφορες φυλλοφάγες κάμπιες (Saturni pygi, Rhabdopalpa spp.)				
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ	-Αφίδες (Myzus spp., Aphis spp.) -Σκαθάρια (Coleoptera) -Διάφορες φυλλοφάγες κάμπιες (Saturni pygi, Rhabdopalpa spp.)	2	1 κιλό	Με την εμφάνιση των εντόμων	3
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (εκτός από τα είδη που αναφέρονται στη φυτοτοξικότητα)	-Αφίδες (Myzus persicae) -Θρίπας (Thrips spp.) -Κάμπιες φυλλώματος (Rhabdopalpa spp.)	2	1 κιλό	Με την εμφάνιση των εντόμων	3

Παρατηρήσεις:

Μην σκονίζετε άνθη αν δεν πρόκειται για άοσμο malathion και γενικά όπου υπάρχουν προβλήματα από τη δυσάρεστη οσμή του malathion να χρησιμοποιούνται σκευάσματα που περιέχουν δρων συστατικό πρώτης καθαρότητας (PREMIUM GRADE).

14. Φυτοτοξικότητα:

- Κολοκυνθοειδή και φασόλια θερμοκηπίου, μερικά καλλωπιστικά και μερικές ποικιλίες μηλιάς, αχλαδιάς και αμπελιού μπορεί να πάθουν ζημιές.
- Να μην χρησιμοποιείται το σκευάσμα σε αγγούρια, αναριχώμενα φασόλια, μαϊντανό και σέλινο.
- Επίσης δε συνιστάται στα καλλωπιστικά: ορχεοειδή, πετούνια, φούξια, αντίρρινο, ζίνια, φτέρη.
- Συνιστάται δοκιμή μικρής έκτασης πριν τη χρήση του.

15. Συνδυαστικότητα:

Δε συνδυάζεται με χαλκούχα σκευάσματα, θειάφι, ασβέστιο και άλλα αλκαλικά σκευάσματα.

16. Σημάνσεις: ---- (Δεν εμπίπτει σε κατηγορία τοξικότητας).

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): ----

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

- (R01) Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.
- (R05) Τοξικό για τα ψάρια.
- (R016) Επικίνδυνο για τα ωφέλιμα αρθρόποδα.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- (S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
- (S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- (S22) Μην αναπνέετε τη σκόνη.
- (S26) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό.
- (S35) Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας αφού τα πλύνετε καλά με νερό.
- (S37/SY4) Φοράτε πλαστικά γάντια και γυαλιά.
- (SY8) Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πειείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

(S45) Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δειξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατό).

Αντίδοτο: Θεϊκή ατροπίνη.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

(SO1) Μη σκονίζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια..

(SO4) Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): ----

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

-Ελιά: 20 ημέρες

-Κολοκυνθοειδή: 4 ημέρες.

-Λοιπές καλλιέργειες: 7 ημέρες.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες κάτω των 25° C, προστατευόμενο από το απ' ευθείας ηλιακό φως.

Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Το τελικό κείμενο ετικέτας θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2002**.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ. ΣΩΤΗΡΛΗΣ