

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 10 - 7 - 1998

Αριθ. πρωτ.: 67994

**Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Ν. Ξενούλης
Τηλέφωνο: 52 91 413
TELEFAX: 3617103**

**ΠΡΟΣ: 1) ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ
Λεωφ. ΝΑΤΟ
Θέση Πηλιχό
19300-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
(Με απόδειξη)
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής
έγκρισης κυκλοφορίας
στο γεωργικό φάρμακο
(κοχλιολεϊμακοκτόνο)
METALDEHYDE-
- SIPCAM 5 GB.**

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ. 8.
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση έγκρισης κυκλοφορίας μετά την 29-12-87», Κεφ. Β παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-1988 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων».
4. Τη με αριθ. 79862/27-7-95 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **5009** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης γεωργικό φάρμακο **LIMASON 5 GB**.
5. Τη με αριθ. 358731/14.10.96 (ΦΕΚ 939/Β'/15.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Δημήτριο Σωτηρλή και Βασίλειο Γερανίδη».
6. Τις από 14-6-95, 9-7-97 και 11-11-97 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και το από 11-11-97 πρωτόκολλο πληρότητας.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **5010** στο γεωργικό φάρμακο (κοχλιολειματοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** METALDEHYDE - SIPCAM 5 GB
2. **Μορφή:** GB (Κοκκώδες δόλωμα)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** metaldehyde 5% β/β
βοηθητικές ουσίες: 94,9 % β/β
4. **Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** 98 % min
5. **Παρασκευαστής:** SIPCAM SA, Via Sempione, 195 - 20016 Pero (Mi), Ιταλίας
6. **Αντιπρόσωπος:** ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ, Λεωφ. ΝΑΤΟ, θέση Πηλιχό, 19300-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
7. **Τυποποιητής:** Ο Παρασκευαστής
8. **Συσκευαστής:** ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ
9. **Συσκευασία:** **9α. Είδος-Μέγεθος:** i) Σακίδια των 100, 150, 500 και 1000 γραμ.
ii) Σάκοι των 5 και 20 κιλών.
9β. Υλικό: Πολυαιθυλένιο (HDPE ή HDPE/LDPE).

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:

Κοχλιολειματοκτόνο για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων. Δρα δια στομάχου.

11. Τρόπος εφαρμογής:

Σκορπίζεται με μηχανικούς διανομείς ή πεταχτά με το χέρι γύρω από τα φυτά και τα δένδρα. Εφαρμόζεται και στη γραμμική σποράς σε πλάτος 20 εκ. ή σε λωρίδες γύρω από τις καλλιέργειες για να εμποδίσει τη μετανάστευση των σαλιγκαριών από άλλες περιοχές.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: -----

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
-Σπορεία -Φυτόρια -Λαχανόκηποι -Ανθοκομικές καλλιέργειες	Κοχλίες (Σαλιγκάρια): -Ελιξ ή κοχλίας ο ποματίας (Helix pomatias) -Ελιξ των δασών (Helix Incorum)	200-300 γρ. /100 τετρ. μέτρα	Μόλις εμφανιστούν οι κοχλίες και οι λείμακες κατά προτίμηση σε υγρό έδαφος μετά από βροχή ή πότισμα το απόγευμα.
-Δενδρόνες -Αμπελώνες -Αγροί καλλιεργούμενοι	Λείμακες (Γυμνοσαλιαγκες): -Λείμαξ ο αγροδιαίτος (Limax agrestis) -Λείμαξ ο κηπαίος (Limax cellarius) Αρίονες: -Αρίων ο ερυθρός	1,5-3 κιλά/στρ. ή 60 γραμ./δένδρο	Σε έντονες προσβολές ή μετά από ισχυρές βρο-χές επαναλαμβάνουμε τη δόλωση. Για ευαίσθητες καλλιέρ-γειες συνιστώνται προ-ληπτικές επεμβάσεις κατά τη σπορά ή μετά τη σπορά.

ή μεγάλος
κόκκινος
γυμνοσάλιαγκας
(Arion rufus)
-Αρίων ο κηπαίος
(Arion hortensis)

Παρατηρήσεις

1. Οι μεγαλύτερες δόσεις συνιστώνται όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός σαλιγκαριών και σοβαρή προσβολή.
2. Η εφαρμογή του φαρμάκου γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο όταν τα σαλιγκάρια είναι σε δραστηριότητα.
3. Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή.
4. Σε συνθήκες θερμοκηπίου να αποφεύγεται το πότισμα για λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή του δολώματος.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και τρόπο εφαρμογής.

15. Συνδυαστικότητα:

Εφαρμόζεται μόνο του.

16. Σήμανση τοξικότητας: Χn-Επικίνδυνο.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): ----

(R22) Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

(RO6) Βλαβερό για τα ψάρια.

(RO10) Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα.

(RO12/13)Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και πουλιά.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

(S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

(S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.

(S37) Φοράτε γάντια από νεοπρένιο.

(SY8) Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε μετά την εφαρμογή.

(SY11) Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά της συσκευασίας του.

(S35) Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας με τρύπημα και θάψιμο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

(S45) Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατό).

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

- (SO4) Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
- (SO5) Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την περιοχή εφαρμογής του δολώματος για τουλάχιστο 14 ημέρες.
- (SO6) Κρατείστε τα κοτόπουλα μακριά από την περιοχή εφαρμογής του δολώματος για τουλάχιστο 7 ημέρες.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): ----

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

1. Κατά την εφαρμογή το δόλωμα να μην έρχεται σε επαφή με τα εδώδιμα μέρη των φυτών που είναι έτοιμα προς κατανάλωση.
2. Μπορούν να γίνουν μέχρι τρεις (3) εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Αποθηκεύεται στην αρχική του (κλειστή) συσκευασία σε μέρος ξηρό δροσερό.
Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Κείμενο Ετικέτας:

- α.** Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12.2002.

- β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου προ της λήξεως της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ. ΣΩΤΗΡΑΗΣ