

Αθήνα, 12-10-1998

Αριθ. Πρωτ.: 75501

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 ΑΘΗΝΑ

TELEFAX: 3617103

Πληροφορίες: Α.Φονταρά
Τηλέφωνο: 5291411

ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο γεωργικό
φάρμακο (μυκητοκτόνο)
VECTRA 10 SC.

ΠΡΟΣ: 1) ΡΟΝ ΠΟΥΛΕΝΚ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ
ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Μεσογείων 304 & Λοχ. Δεδούση 1,
155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
(Με απόδειξη)
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2 και το άρθρο 5 παρ.2 και 8.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας για «την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ Β., παρ.6.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη γνωμοδότηση για το 5ο θέμα της 1ης/19-6-98 Συνεδρίασης του ΑΣΥΓΕΦ.
5. Τη με αριθ.358731/14-10-96 (ΦΕΚ939/Β/15-10-96) απόφαση του κ.Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Δ. Σωτηρλή και Β. Γερανίδη».
6. Τις σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 6710 στο γεωργικό φάρμακο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** VECTRA 10 SC
2. **Μορφή:** Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** bromuconazole 10% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 90,70% β/β

4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται : 96% min
5. **Παρασκευαστής:** RHONE-POULENC AGROCHIMIE S.A., Γαλλία.
6. **Αντιπρόσωπος:** ΡΟΝ ΠΟΥΛΕΝΚ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Μεσογείων 304, και Λοχ. Δεδούση 1, Χολαργός
7. **Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής
8. **Συσκευαστής:** Ο παρασκευαστής
9. **Συσκευασία: 9α.Είδος-Μέγεθος: 1.** Φιάλες 50 κ.εκ. και 100 κ.εκ. μέσα σε κουτί
2. Φιάλες 250 κ.εκ.,300 κ.εκ., 500 κ.εκ. και 1 λίτρον
- 9β. Υλικό:** Φιάλες από υψημοριακό πολυαιθυλένιο, κουτί χάρτινο.

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των τριαζολών με προληπτική και θεραπευτική δράση σε διάφορους μύκητες (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες).

11. Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός καλύψεως.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

-Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.

-Ανακινήστε το σκεύασμα καλά και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./100 λίτρα νερό	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ λίτρα/στρέμμα	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά	Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis)	20-30	150-250	Περιορισμός των επεμβάσεων σε 4 και εναλλαγή τους με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι τη φυσιολογική πτώση των καρπών (φυσικό αραίωμα). Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10-14 ημέρες.

Αγγούρι	Ωΐδιο (Sphaerotheca fuliginea)	30-50	100-200	Εφαρμογή πριν ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες. Συνιστάται να γίνεται εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων (όχι τριαζόλες) για λόγους αποφυγής ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10-14 ημέρες.
----------------	--	-------	---------	--

Παρατήρηση:

Η μικρή δόση πρέπει να εφαρμόζεται σε χαμηλή και η μεγάλη σε υψηλή πίεση προσβολής.

14. Φυτοτοξικότητα:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες και δόσεις που συστήνεται η εφαρμογή του.

15. Συνδυαστικότητα: -

16. Σημάνσεις: -

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): ----

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO & R φράσεις):

RO5: Τοξικό για τα ψάρια.

R50: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

R53: Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.

S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

S37 Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση/ψεκασμό.

SY8 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

S35 Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με τρύπημα ή σύνθλιψη.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

-**Σε περίπτωση κατάποσης:** Προκαλέστε εμετό μόνο αν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του και δεν κάνει ακανόνιστες κινήσεις. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

-**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά και ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν εμφανισθεί ερεθισμός.

-**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύντε αμέσως το δέρμα με άφθονο σαπούνι και νερό και παράλληλα βγάλτε τα τυχόν μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύντε τα ρούχα ξεχωριστά πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

-**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Εάν ο ασθενής δεν αναπνέει, προκαλέστε τεχνητή αναπνοή. Χορηγήστε οξυγόνο εάν χρειασθεί. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα για υπερέκθεση σε άλλα υλικά, διαφορετικά από το εν λόγω προϊόν.

Εάν καταποθεί μεγάλη ποσότητα του προϊόντος (μεγαλύτερη από 1 ml/kg ζώντος βάρους), πρέπει να γίνει πλύση στομάχου.

Αποφύγετε ελαιώδη καθαρτικά.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO3 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): ----

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μηλιά: 30 ημέρες

Αγγούρι: 4 ημέρες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Φυλάξτε το στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό καλά αεριζόμενο και σε θερμοκρασία 20-25° C. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

- α.** Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία μας εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12. 2002.

- β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ. ΣΩΤΗΡΑΗΣ