

Αθήνα, 21 – 9 - 1998

Αριθ. πρωτ.: 74318

Ταχ. Διεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 36 17 103
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 36 42 974
52 91 412

ΠΡΟΣ: 1. VETERIN A.B.E.E.
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
(με απόδειξη)

2. Δ/ΝΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έδρες τους
3. Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Έδρες τους
4. ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟ-
ΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο γεωργικό
φάρμακο (ακαρεοκτόνο)
DICO 42 EC "

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 5.
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση έγκρισης κυκλοφορίας μετά την 29-12-87, Κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-1988 (ΦΕΚ 599/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθμ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 155058/1008/26.1.80 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **2008** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης γεωργικό φάρμακο **DIFOL 42 EC**.
5. Τη με αριθ. 358731/14-10-96 (ΦΕΚ 939/Β/15-10-96) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Δ. Σωτηρλή και Β. Γερανίδα».
6. Τις από 12-7-93, 8-9-93, 16-1-98 και 27-8-98 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, το από 8-9-93 πρωτόκολλο πληρότητας καθώς και το από 11-9-98 συμπληρωματικό πρωτόκολλο πληρότητας.

Αποφασίζομε

- I.** Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **2083** στο γεωργικό φάρμακο (ακαρεοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** DICO
2. **Μορφή:** Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα (EC)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** dicofol 42 % β/ο
βοηθ. ουσίες: 62,42 % β/β
διαλύτης: methyl oleate
4. **Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** dicofol 98.9 % min
Το ανωτέρω technical θα πληρεί υποχρεωτικά τις προδιαγραφές του FAO.
5. **Παρασκευαστής:** VETERIN ABEE, 193 00 - Ασπρόπυργος Αττικής.
6. **Αντιπρόσωπος:** -----
7. **Τυποποιητής:** ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής.
8. **Συσκευαστής:** ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής.
9. **Συσκευασία:** **9α.Είδος-Μέγεθος:** Φιάλες των 500 κ.εκ. και 1 λίτρου.
9β. Υλικό: Αλουμίνιο ή επενδεδυμένος λευκοσίδηρος ή PET.

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:

Ακαρεοκτόνο επαφής με δράση σε όλες τις κινητές μορφές των ακάρεων. Επίσης νεκρώνει σε μεγάλο ποσοστό και τα καλοκαιρινά αυγά.

11. Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως, με ψεκαστικά μέσα υψηλής πίεσεως.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

- Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
- Ρίχνουμε τη δόση του φαρμάκου σε μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και το πυκνό γαλάκτωμα στη συνέχεια στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.
- Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης:

| ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΕΧΘΡΟΙ | ΔΟΣΕΙΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | κ.εκ./100 λίτρα νερό | |
| ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Κιτριά, γκρέπ-φρουτ | Τετράνυχτοι (Tetranychus urticae, Panonychus citri) Παραμορφωτικό άκαρι (Aceria sheldoni) Σκωριόχρωμη κηλίδωση καρπών (Aculus pelekassi) Άλλα ακάρεα (Tetranychidae, Eriophyidae, Tarsonemidae) | 100-125 | Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. |
| ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά | Κόκκινος τετράνυχτος (Panonychus ulmi) Κίτρινος τετράνυχτος (Tetranychus urticae) Άλλα ακάρεα | 100-125 | Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| | (Tetranychidae, Eriophyidae, Tarsonemidae, Tenuipalpidae) | | |
| ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά | Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi) Κίτρινος τετράνυχος (Tetranychus urticae) Καστανός τετράνυχος (Bryobia rubrioculus) Φυτόπτης Αχλαδιάς (Eriophyes piri) | 100-125 | Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. |
| ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, ροδακινιά κερασιά, δαμασκηνιά, νεκταρινιά | Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi) Κίτρινος τετράνυχος (Tetranychus urticae) Φυτόπτες (Aculus spp.) Άλλα ακάρεα (Tetranychidae, Eriophyidae, Tarsonemidae, Tenuipalpidae) | 100-125 | Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. |
| ΑΜΠΕΛΙ Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα | Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi) Κοινός τετράνυχος (Tetranychus urticae) Κίτρινος τετράνυχος (Eutetranychus caprini) Φυλλοκόπτης (Phyllocoptes vitis) Ερίωση (Eriophyes vitis) | 100-125 | Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. |
| ΦΡΑΟΥΛΑ | Κόκκινος και κίτρινος τετράνυχος (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, T.turkestani) Άλλα ακάρεα (Tarsonemidae, Tetranychidae) | 100-125 | Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Τομάτα, πιπεριά, αγγούρι, κολοκύθι, πεπόνι καρπούζι | Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus cinnabarinus</i> , <i>Tetranychus turkestanii</i>) Μπρούτζινη ακαρίωση τομάτας (<i>Aculops lycopersici</i> , <i>Polyphagotarsonemus latus</i>) | 100-125 | Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. |
| ΒΑΜΒΑΚΙ | Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>T. cinnabarinus</i> , <i>T. turkestanii</i>) | 100-125 | Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. |
| ΠΑΤΑΤΑ | Τετράνυχοι (<i>Tetranychus spp.</i>) | 100-125 | Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. |
| ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ | Τετράνυχοι (<i>Tetranychus spp.</i>) | 100-125 | Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. |
| ΨΥΧΑΝΘΗ (για σπόρο) ΤΡΙΦΥΛΛΙ | Τετράνυχοι (<i>Tetranychus spp.</i>) | 100-125 | Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. |
| ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ | Τετράνυχοι (<i>Tetranychus spp.</i>) | 100-125 | Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. |

Παρατηρήσεις:

- Μπορεί να προκαλέσει ανθεκτικότητα στα ακάρεα. Αν παρατηρηθεί μην αυξάνετε τις δόσεις αλλά χρησιμοποιείτε σκεύασμα με άλλη δραστική ουσία. (συμβουλευτείτε γεωπόνο).
- Οι μεγάλες δόσεις χρησιμοποιούνται όταν έχουμε έντονη προσβολή και όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται στο μέγιστο της ανάπτυξής τους.
- Απαγορεύεται η εφαρμογή του πλησίον χερσαίων επιφανειακών υδάτων (ποταμών ή λιμνών).
- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: **δύο (2)** εφαρμογές.

14. Φυτοτοξικότητα:

- Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.
- Είναι φυτοτοξικό στη μελιτζάνα.
- Χρειάζεται προσοχή στα φυτά νεαρής ηλικίας γενικά και ιδιαίτερα στα κολοκυνθοειδή.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα (βορδιγάλαιο πολτό κ.α.).

16. Σημάνσεις Τοξικότητας:

Xn Επικίνδυνο, Xi Ερεθιστικό

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

- (R20) Βλαβερό όταν εισπνέεται.
- (R22) Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.
- (R36) Ερεθίζει τα μάτια.
- (R38) Ερεθίζει το δέρμα.
- (R43) Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
Μπορεί να προκαλέσει χρόνιες βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

- (RO3) Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.
- (RO5) Τοξικό για τα ψάρια.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- (S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
- (S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- (S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.
- (S23) Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
- (S24/25) Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.
- (S26) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- (S28) Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
- (S35) Πάρτε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να απορρίψετε το προϊόν ή τη συσκευασία του. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με κάψιμο ή θάψιμο.
- (S36/37/SY1/2) Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, φόρμα, μπότες και γάντια από πλαστικό όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.
- (S39) Φοράτε κατάλληλη συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
- (SY7) Πλύντε τα ρούχα της δουλειάς μετά το ψεκασμό.
- (SY8) Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- (SY10) Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- (SY11) Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

" ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον "

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

- (S44) Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν).
Σε περίπτωση κατάποσης και εάν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, προκαλέστε εμετό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόζεται συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

- (SO4) Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):

Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:

-**Αμυγδαλιά:** μέχρι την έναρξη της αποκόλλησης του φλοιού του καρπού.

-**Λοιπές καλλιέργειες:** 15 ημέρες.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρήστε το σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Κείμενο ετικέτας:

α. Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην υπηρεσία εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2002**.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ. ΣΩΤΗΡΛΗΣ