

Αθήνα, 22/10/1998

Αριθ. Πρωτ.: 76511

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5  
Ταχ. Κώδικας: 101 64 ΑΘΗΝΑ

TELEFAX: 3617103

Πληροφορίες: Α.Φονταρά  
Τηλέφωνο: 5291411

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
Κυκλοφορίας στο γεωργικό  
Φάρμακο (μυκητοκτόνο)  
CAMCIS 40 SC.

ΠΡΟΣ: 1) ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ  
Εθνικής Αντιστάσεως 84  
15231 Χαλάνδρι  
(Με απόδειξη)  
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α) Δ/νσεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
β) Δ/νσεις Εμπορίου  
Έδρες τους  
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο  
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2 και το άρθρο 5 παρ.8.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας για «την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ Β., παρ.1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ.60124/8-1-88 απόφασή μας με την οποία ανανεώθηκε η με αριθ. 6069 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιο με το αιτούμενο σκεύασμα QUINOLATE 40 FL.
5. Τη με αριθ.358731/14-10-96 (ΦΕΚ939/Β/15-10-96) απόφαση του κ.Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Δ. Σωτηρλή και Β. Γερανίδη».
6. Τις από 27-10-94, 14-9-95, 27-6-96 και 16-9-98 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, το από 14-9-95 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου, καθώς και το από 23-9-98 συμπληρωματικό πρωτόκολλο πληρότητας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 6716 στο γεωργικό φάρμακο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** CAMCIS 40 SC
2. **Μορφή:** Συμπυκνωμένο εναιώρημα SC

3. **Εγγυημένη σύνθεση:** oxine copper 40% β/ο  
βοηθητικές ουσίες 64,63 % β/β
4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται: 97 % min
5. **Παρασκευαστής:** SINON CORPORATION, Ταϊβάν
6. **Αντιπρόσωπος:** ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ, Εθν. Αντιστάσεως 84, 15231 Χαλάνδρι
7. **Τυποποιητής:** : Ο παρασκευαστής
8. **Συσκευαστής:** ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ, Οινόφυτα Βοιωτίας
9. **Συσκευασία: 9α.Είδος-Μέγεθος: α.** Φιάλες 100, 200, 250, 460, 500, 920 κ.εκ. και 1 λίτρου.  
**β.** Δοχεία 2, 5 και 10 λίτρων.  
**9β.Υλικό: α.** Φιάλες πολυαιθυλενίου (HDPE) ή SELAR  
**β.** Δοχεία πολυαιθυλενίου (HDPE) ή SELAR
- 10.**Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:**  
Οργανικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση.

- 11.**Τρόπος εφαρμογής: α.** Ψεκασμοί φυλλώματος μέχρι απορροής.  
**β.** Ριζοπότισμα

**12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.  
Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**13.Φάσμα δράσης:**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./100 λίτρα νερό	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
<b>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</b> (Γκρέϊπ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Κιτριά)	Κορυφοξήρα (Phoma tracheiphila) Βακτηρίωση (Pseudomonas syringae)	125-150	Εφαρμογές κατά τη διάρκεια Φθινοπώρου-Χειμώνα-Άνοιξης και μετά από παγετό ή χαλάζι.
<b>ΜΗΛΟΕΙΔΗ</b> Μηλιά, Αχλαδιά	Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis, Venturia pirina) Φαιά σήψη (Sclerotinia laxa, Sclerotinia fructigena)	150	α. Πριν την άνθηση με 1-2 εφαρμογές β. κατά τη διάρκεια της βλάστησης μόλις εμφανιστούν οι πρώτες κηλίδες και επανάληψη μετά 5-6 ημέρες.
<b>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</b> (Βερικοκιά Κερασιά Ροδακινιά Νεκταρινιά Δαμασκηνιά Βυσσινιά)	Εξώασκος (Taphrina deformans, Taphrina armeniaca, Taphrina pruni) Κορύνιο (Stigmina carpophila) Φαιά σήψη (Sclerotinia laxa) Κλαδοσπορίωση (Cladosporium carophilum)	150	Εφαρμογές στο τέλος του χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάτια, στην αύξηση των καρπών και όταν έχει πέσει το 1/3 των φύλλων.

## ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Τομάτα	Περονόσπορος ( <i>Phytophthora infestans</i> ) Αλτερναρίωση ( <i>Alternaria solani</i> )	150-175	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα γίνονται 2 εφαρμογές εντός 5-6 ημερών.
Κολοκύθι Μαρούλι Σέλινο Αντίδι Ραδίκι Μαϊντανό Σπανάκι Μπιζέλι	Σεπτορίωση ( <i>Septoria spp.</i> )	150-175	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα γίνονται 2 εφαρμογές εντός 5-6 ημερών.
Καλλωπιστικά	Περονόσπορος ( <i>Peronospora spp.</i> ) Φυτόφθορα ( <i>Phytophthora spp.</i> ) Σεπτορίωση ( <i>Septoria spp.</i> )	125-150	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα γίνονται 2 εφαρμογές εντός 5-6 ημερών.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ Καλλωπιστικά	Ασθένειες λαιμού και ριζών ( <i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> )	100	Ριζοπότισμα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών.

### 14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται στις συνιστώμενες καλλιέργειες, χρήσεις και δόσεις.

### 15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα όπως θειασβέστιο και βορδιγάλειο πολτό.

### 16. Σημάνσεις :-----

### 17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο ( R φράσεις):-----

### 18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

- RO3** Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.  
**RO5** Τοξικό για τα ψάρια.

**19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.  
**S35** Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας.  
**SY8** Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.  
**SY10** Μην αυξάνετε τις δόσεις.

**20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :**

Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε γάλα ή νερό και προκαλέστε εμετό ή κάνετε πλύση στομάχου. Ο εμετός προκαλείται με μηχανικό ερεθισμό του φάρυγγα με μη αιχμηρό αντικείμενο ή με σιρόπι ιπεκακουάνας.

Δεν προκαλείται εμετός και δεν γίνεται πλύση εάν το άτομο δεν έχει τις αισθήσεις του. Μετά τον εμετό ή την πλύση χορηγήστε άνθρακα σε αρκετή ποσότητα.

**Αντίδοτο:** Πενικιλλαμίνη.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777**

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**

- SO4** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):---**

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Λαχανικά: 7 ημέρες

Λοιπές καλλιέργειες: 15 ημέρες

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

**24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.

Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα μένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**II. Ετικέτα:**

**α.** Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία μας εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης.

**III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12. 2002.**

**β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Δ. ΣΩΤΗΡΑΗΣ**