

Αθήνα, 10-7-1998

Αριθ. Πρωτ.: 67992

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 ΑΘΗΝΑ

TELEFAX: 3617103

Πληροφορίες: Α.Φονταρά
Τηλέφωνο: 52 91 411

ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο γεωργικό
φάρμακο (μυκητοκτόνο)
SANAZIL 20 EC.

ΠΡΟΣ: 1) ΒΙΟΣΑΝ
ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΩΡΑΚΟΣ
Τυμφρηστού 53
152 34 Χαλάνδρι
(Με απόδειξη)

2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

α) Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους

β) Δ/σεις Εμπορίου
Έδρες τους

3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5 παρ. 8.
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων » Κεφ. Β. , παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας «όσον αφορά τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 75694/11-7-95 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6624 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιο με το αιτούμενο γεωργικό φάρμακο MAGNATE 20 EC.
5. Τη με αριθ.358731/14-10-1996 (ΦΕΚ939/Β/15-10-96) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Δ. Σωτηρλή και Β. Γερανίδη».
6. Τις από 22-10-95 και 20-2-97 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 20-2-97 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **6697** στο γεωργικό φάρμακο (μυκητοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία :

1. **Εμπορικό όνομα:** SANAZIL 20 EC

2. **Μορφή :** Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

3. **Εγγυημένη σύνθεση :** imazalil 20 % β/ο

βοηθητικές ουσίες : 79,9 % β/β

4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται: 99 % min

5. **Παρασκευαστής:** SANACHEM LTD, SOUTH AFRICA

6. **Αντιπρόσωπος:** BIOUSAN, Σπύρος Φλωράκος, Τυμφορηστού 53 15234 Χαλάνδρι

7. **Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής

8. **Συσκευαστής:** Ο παρασκευαστής

9. **Συσκευασία: 9α.: Είδος-Μέγεθος:** Φιάλες 200, 400, 500, 800 κ.εκ.

και 1 και 5 λίτρων

9β.:Υλικό: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).

10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:**

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

11. **Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμοί καλύψεως μέχρις απορροής.

12. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

Η συνιστώμενη δόση του σκευάσματος προστίθεται σε επαρκή ποσότητα νερού, ανακατεύεται καλά και συμπληρώνεται με το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.

13. **Φάσμα δράσης:**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σ		κ.εκ./100 λίτρα νερό/στρ.	
Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι)	Ωίδιο (Sphaerotheca spp, Oidium spp, Erysiphe spp.)	25-50	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη κάθε 7-10 ημέρες ανάλογα με την σοβαρότητα της προσβολής.
Τριανταφυλλιά	Ωίδιο (Sphaerotheca pannosa)	100-150 καλλιέργεια θερμοκηπίου 150 καλλιέργεια υπαίθρου	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη κάθε 7-10 ημέρες ανάλογα με την σοβαρότητα της προσβολής.

Μπεγκόνια Χρυσάνθεμα Ευώνυμα	Ωίδιο (Oidium spp., Microsphaera spp.)	50 καλλιέργεια θερμοκηπίου	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη κάθε 7-10 ημέρες ανάλογα με την σοβαρότητα της προσβολής.
		150 καλλιέργεια υπαίθρου	

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Κολοκυνθοειδή 3, Καλλωπιστικά 2.

Παρατηρήσεις-Περιορισμοί κατά τη χρήση:

-Στα κολοκυνθοειδή και στην τριανταφυλλιά θερμοκηπίου η μικρή δόση εφαρμόζεται σε μικρή προσβολή και η μεγάλη δόση σε μεγάλη προσβολή.

-Να αποφεύγεται η εφαρμογή του με ηλιόλουστο καιρό.

-Οι εφαρμογές συνιστάται να γίνονται ενωρίς το πρωί. Εάν γίνουν απόγευμα πρέπει τα φυτά να στεγνώσουν πριν νυχτώσει.

-Στα κολοκυνθοειδή να μη γίνονται περισσότερες από 3 συνεχείς εφαρμογές και με μεσοδιαστήματα μικρότερα των 7 ημερών.

14. Φυτοτοξικότητα:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες και στις δόσεις που συνιστάται, εκτός από τις ποικιλίες τριανταφυλλιάς Dr. Verhage, Jack Frost και Mercedes.

15. Συνδυαστικότητα:

Εφαρμόζεται μόνο του.

16. Σημάνσειςτοξικότητας: Χn, Επικίνδυνο Xi, Ερεθιστικό

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R10 Εύφλεκτο

R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):

R05 Τοξικό για τα ψάρια.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- S23** Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
- S24/25** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
- S26** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- S27/SY6A** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί. Πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε.
- S35** Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας με τρύπημα. Η χρήση τους για οποιοδήποτε σκοπό είναι επικίνδυνη.
- S36/37/39** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών, προσώπου.
- S45** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
- S46** Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- SY8** Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

20. Πρώτες Βοήθειες- Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης δώστε 1 ή 2 ποτήρια νερό. Προσθήκη ενεργοποιημένου άνθρακα στο νερό θα μειώσει την πρόοδο της δηλητηρίασης.

Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 7793777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

- SO4** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Π1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Κολοκυνθοειδή: 3 ημέρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική καλά κλεισμένη συσκευασία του σε θερμοκρασίες 18-28°C και μακριά από πηγές ανάφλεξης. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία εντός εξαμήνου από της υπογραφής της απόφασης.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2002.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ. ΣΩΤΗΡΑΗΣ