



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 10-6-2003

Αριθ. Πρωτ.: 102885

**Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας : 101 64 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Φονταρά
Τηλέφωνο: 212 44 98
FAX: 3617103**

**ΠΡΟΣ:1) VECTOR AGRO S.A.
ΒΙ.ΠΕ.Θ.**

**570 22 Σίνδος
(Με απόδειξη)**

2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

**α) Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους**

**β) Δ/σεις Εμπορίου
Έδρες τους**

**3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο**

**Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων**

Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

4) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής μας

**ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (μυκητοκτόνο)
VEFLOSAT 80 WP**

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2.και το άρθρο 5 παρ. 8.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων » Κεφ Β.παρ.1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ..
4. Τη με αριθ.110240/2-11-99 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ.6782 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιο με το αιτούμενο σκεύασμα FOSETAL 80 WP.
5. Τη με αριθ. 399580/30-10-2001 (Β'1479/31-10-2001) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη».
6. Τις από 9-9-02 και 13-3-03 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 13-3-03 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

- Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **6904** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
 - Εμπορικό όνομα: VEFLOSAT 80 WP
 - Μορφή: Βρέξιμη σκόνη (WP)
 - Εγγυημένη σύνθεση: fosetyl AL 80% β/β
βοηθητικές ουσίες :16,67% β/β.
 - Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται :96% min του οίκου SINOCEM NINGBO IMP. & EXP. CO., LTD, Κίνα.
 - Παρασκευαστής: VECTOR AGRO S.A., ΒΙ.ΠΕ.Θ., 570 22 Σίνδος
 - Αντιπρόσωπος: -
 - Τυποποιητής: K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος
 - Συσκευαστής: Ο τυποποιητής
 - Συσκευασία: 9α. Είδος -Μέγεθος: Σακούλα μέσα σε κουτί 400 γρ., 500 γρ., 600 γρ., 800 γρ. και 1 κιλού
9β. Υλικό: Σακούλα από πολυεστέρα/πολυαιθυλένιο, κουτί χάρτινο.
- Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.
- Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμοι φυλλώματος, εμβάπτιση ριζώματος, ριζοπότισμα, ενσωμάτωση στο μίγμα χώματος.
- Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.
Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.
Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ γρ./100 λίτρα νερό	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Γκρέιπ -φρουτ)	Φυτόφθορα (Phytophthora parasitica, Phytophthora citrophthora)	250-300	Ένας ψεκάσμος το μήνα, αρχίζοντας την περίοδο της ενεργού βλάστησης, όταν ο καιρός είναι υγρός ή ένα ψεκάσμο στους 2-4 μήνες όταν έχουμε ξηρασία. Συνολικά κάνουμε 3-4 ψεκασμούς το χρόνο (τέλος Απρίλη-Μάη, Ιούνιο και Σεπτέμβρη). Για τη φυτόφθορα των καρπών ψεκάζουμε το φύλλωμα μία φορά το μήνα αρχίζοντας μόλις αλλάξει το χρώμα (1-2 ψεκασμοί).
Μηλιές	Φυτόφθορα λαιμού και ριζών (Phytophthora cactorum)	250	3-4 ψεκασμοί στην περίοδο της ενεργού βλάστησης (άνοιξη-αρχές καλοκαιριού).
Αμπέλι	Περονόσπορος (Plasmopara viticola)	250-300	Ψεκασμοί στα παρακάτω στάδια: Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες,

Φράουλα	Σήψεις λαιμού (Phytophthora cactorum)	200-250 400	λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. Εμβάπτιση του ριζώματος για 15 λεπτά πριν τη φύτευση ή ένας φυλλοψεκασμός αμέσως μετά τη φύτευση.
Κρεμμύδια	Περονόσπορος (Peronospora destructor)	300 γρ./στρέμμα	Ψεκασμοί που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται δύο φορές το μήνα.
Τομάτα υπαίθρου	Περονόσπορος (Phytophthora infestans)	200-300	Ψεκασμοί που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται δύο φορές το μήνα.
Τομάτα θερμοκηπίου	Περονόσπορος (Phytophthora infestans)	300-400	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας ψεκασμοί ανά 8-10 ημέρες.
Αγγούρια, Κολοκυθάκια, Πεπόνια, Καρπούζια, Κολοκύθες	Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis)	200-300	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της ασθένειας, δύο ψεκασμοί το μήνα με καλό λούσιμο των φυτών. Σε περίπτωση έντονης προσβολής συνιστάται ο ψεκασμός ανά 10ήμερο, με τη μεγαλύτερη δόση.
Κουνουπίδι, Λάχανο	Περονόσπορος (Peronospora parasitica)	60 γρ./τετρ. μέτρο	Δύο ριζοποτίσματα: Ένα κατά την σπορά και ένα πριν τη μεταφύτευση.
Μαρούλι	Περονόσπορος (Bremia lactucae)	60 γρ./τετρ. μέτρο	Δύο ριζοποτίσματα: Ένα κατά τη σπορά και ένα πριν τη μεταφύτευση.
Πράσα	Περονόσπορος (Phytophthora capsici)	300 γρ./στρέμμα	Ψεκασμοί που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται δύο φορές το μήνα.
Πατάτα	Περονόσπορος (Phytophthora infestans)	250-300	Ψεκασμοί που αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επαναλαμβάνονται 2 φορές το μήνα.
Λυκίσκος	Περονόσπορος (Pseudoperonospora humuli)	250-300	Ψεκασμοί: 1ος όταν η βλάστηση έχει μήκος 5-10 εκ., και 2ος όταν φθάσει 20-30 εκ.

Καπνός	Περονόσπορος (Peronospora tabacina)	250-300	Προληπτικοί ψεκασμοί που αρχίζουν μία εβδομάδα μετά το σταύρωμα των φυτών στο σπορείο και ψεκασμοί στο χωράφι κάθε 14 ημέρες στην περίοδο που υπάρχει κίνδυνος προσβολής.
Κωνοφόρα	Προσβολή από Phytophthora cactorum	250	Ψεκασμός μία φορά το μήνα στη διάρκεια της ανάπτυξης (συνολικά 3 ψεκασμοί).
Καλλωπιστικά (Φυτώρια-Σπορεία)	Φυτόφθορα (Phytophthora spp)	400 γρ./ κυβ.μέτρο χώματος. 10 γρ. / τετρ.μέτρο	Εφαρμόζεται με ενσωμάτωση στο μίγμα χώματος. Ριζοπότισμα αμέσως μετά τη φύτευση ή μεταφύτευση. Επανάληψη μία φορά το μήνα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Εσπεριδοειδή 4, Μηλιές 4, Αμπέλι 4, Φράουλα 2, Κρεμμύδια 4, Τομάτα (υπαίθρου-θερμοκηπίου) 4, Κολοκυνθοειδή 4, Κουνουπίδι 2, Λάχανο 2, Μαρούλι 2, Πράσα 4, Πατάτα 4, Λυκίσκος 2, Καπνός 4, Κωνοφόρα 2, Καλλωπιστικά 4.

Παρατηρήσεις:

Στις καλλιέργειες αμπέλι, μηλιά, πατάτα και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν χαλκό, με ελαιώδη σκευάσματα με σκευάσματα που περιέχουν dicofol, με σκευάσματα θείου υγρής μορφής, καθώς και με διαφυλλικά λιπάσματα με βάση το άζωτο.

16. Σημάνσεις:

Xi ,Ερεθιστικό.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

(R36/38) Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

(RO3) Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

(S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

(S13) Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε.

(S24/25) Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

(S26) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

(S28) Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

(S36/37) Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια

(SY4) Φοράτε γυαλιά.

20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε στον παθόντα εάν έχει τις αισθήσεις του 2-3 ποτήρια νερό ή γάλα και μία κουταλιά σιρόπι IPECAC για να προκληθεί εμετός. Εάν δεν έχει προκληθεί εμετός σε 20 λεπτά ,επαναλάβετε ακόμη μία φορά τη χορήγηση σιροπιού. Διαφορετικά προκαλέστε τον εμετό με το δάκτυλο σας.

Μην προκαλείτε εμετό σε αναίσθητο άτομο.

Εάν πέσει στο δέρμα πλυθείτε με νερό και σαπούνι. Σε όλες τις περιπτώσεις ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο .Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:(210) 7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

-Αμπέλι,μαρούλι,λάχανο,φράουλα:14 ημέρες

-Αγγούρι:1 ημέρα

-Λοιπές καλλιέργειες:3 ημέρες

24.Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 , παρ.1 του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2007.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ