

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **1828** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα : SECARIL 10 DP
2. Μορφή : Σκόνη επίπασης (DP)
3. Εγγυημένη σύνθεση: carbaryl 10% β/β.
βοηθητικές ουσίες: 89,9% β/β.
4. Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται: 99% min.
5. Παρασκευαστής: ΣΕΓΕ ABEE, Εθνικής Αντιστάσεως 84, 15231 Χαλάνδρι.
6. Αντιπρόσωπος: -----
7. Τυποποιητής : ΣΕΓΕ ABEE, Οινόφυτα Βοιωτίας.
8. Συσκευαστής : ΣΕΓΕ ABEE, Οινόφυτα Βοιωτίας.
9. Συσκευασία : 9α. Είδος-Μέγεθος: 1. Κουτιά ή σακίδια 500, 800 γραμ. και 1 και 2 κιλών
2. Σακίδια 3 ,5, 10, 15, 20 και 25 κιλών
β. Υλικό:1. Κουτί χάρτινο με εσωτερική σακούλα πολυαιθυλενίου
2. Σακίδια πολυαιθυλενίου (PE) ή πλαστικό πολλαπλών επιστρώσεων με εσωτερική επίστρωση PE ή χάρτινα με εσωτερική επένδυση PE.
10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:
Καρβαμιδικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου κατά μασητικών εντόμων.
11. Τρόπος εφαρμογής. Επίπαση των φυτών.
12. Τρόπος παρασκευής του υγρού: -----
13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ Kg/στρέμα	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
13.1 Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, κιτριά, γκρέιπ-φρουτ)	- Κοκκοειδή (Aonidiella auranti, Lepidosaphes beckii, Chrysomphalus dictyospermi) - Ψευδόκκοκος (Planococcus citri) - Λεκάνιο (Saissetia olea) - Ανθοτρήτης (Prays citri) - Τζιτζικικάκια (Cicadellidae)	2-4	Σκόνισμα όταν εμφανιστούν τα έντομα (1)*,(2)*
13.2. Ακρόδρυα: (Αμυγδαλιά, καρυδιά, λεπτοκάρνα, φιστικιά)	- Ανθονόμος (Anthonomus ornatus) - Λεκάνιο (Sphairolecanium prunastri)	2-4	» (1)*,(2)*

13.3. Μηλοειδή: (Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά)	<ul style="list-style-type: none"> - Ανθονόμος (Anthonomus pomorum) - Καρπόκαψα (Cydia pomonella) - Ψώρα του San jose (Quadraspidiotus perniciosus) - Ρυγχίτης (Rynchites bacchus) - Αφίδες (Hyalopterus pruni, H. amygdalli, Brachyacarus sp., Myzus persicae) - Ψύλλες (Psylla spp.) - Κοκκοειδή (Diaspididae) - Τζιτζικάκια (Cicadella viridis) 	2-4	Σκόνισμα όταν εμφανιστούν τα έντομα (1)*, (2)*
13.4. Ροδακινιά	<ul style="list-style-type: none"> - Καρπόκαψα (Cydia molesta) - Ανθονόμος (Anthonomus ornatus) - Τζιτζικάκι (Cicadella viridis) - Κοκκοειδή (Diaspididae) - Αφίδες (Hyalopterus Pruni, H. Amygdalli, Brachyacarus sp Myzus persicae) 	2-4	» (1)*, (2)*
13.5. Βερικοκιά	<ul style="list-style-type: none"> - Καρπόκαψα (Anthonomus ornatus) - Ρυγχίτης (Rynchites bacchus) - Αφίδες, - Τζιτζικάκια (Cicadella Viridis) 	2-4	» (1)*, (2)*
13.6. Δαμασκηλιά	<ul style="list-style-type: none"> - Αφίδες (Hyalopterus pruni, Brachyadus sp, Myzys persicae) - Καρπόκαψα (Cydia molesta) 	2-4	» (1)*, (2)*
13.7. Κερασιά, βυσσινιά	<ul style="list-style-type: none"> - Ρυγχίτες (Rhynchites spp) - Αφίδες (Hyalopterus pruni, H. amygdalli, Brachyacarus sp., Myzus persicae) - Τζιτζικάκια (Cicadella viridis) 	2-4	» (1)*, (2)*

13.8. Αμπέλι	<ul style="list-style-type: none"> - Ευδεμίδα (<i>Lodesia bortrana</i>) - Ψευδόκοκκος (<i>Planococcus citri</i>) - Αλτης αμπέλου (<i>Haltica ampelophaga</i>) - Ωτιόρυγχος (<i>Otiorynchus evurnera</i>) - Βρωμούσες (<i>Pentatomidae</i>) 	2-4	Σκόνισμα όταν εμφανιστούν τα έντομα (1)*,(2)*
13.9. Φράουλα	<ul style="list-style-type: none"> - Αφίδες (<i>Aphis gossypi</i>, <i>Aphis fabae</i>) 	1,5-2,5	» (1)*,(2)*
13.10. Εληιά	<ul style="list-style-type: none"> - Κοκκοειδή (<i>Pollinia pollini</i>) - Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i>) - Πυρηνοτρήτης (<i>Prays oleae</i>) - Ρυγχίτης (<i>Rynchites cribripenni</i>) - Βρωμούσες (<i>Pentatomidae</i>) 	2-4	» (1)*,(2)*,(5)*
13.11. Λαχανικά (Τομάτα, κρεμμύδι, φασόλι, κουκιά, μελιτζάνα, λάχανο, αγκινάρα, αγγούρι)	<ul style="list-style-type: none"> - Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) - Βρωμούσες (<i>Pentatomidae</i>) - Θρίπες (<i>Thrips spp.</i>) - Τζιτζικάκια (<i>Cicadellidae</i>) - Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) - Αγρότιδες (6)* (<i>Agrotis spp</i>) - Προνούμφες Λεπιδοπτέρων 	1,5-2,5	» (1)*,(2)*
13.12. Βαμβάκι	<ul style="list-style-type: none"> - Ρόδινο σκουλήκι (<i>Platyedra gossypiella</i>) - Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>, <i>H. Peltigera</i>) - Θρίπες (<i>Thrips tabaci</i>) - Λύγκος (<i>Lygus spp.</i>) - Τζιτζικάκια (<i>Cicadellidae</i>) 	1,5-2,5	» (1)*,(2)*

	- Αγρότιδες (<i>Agrotis</i> spp)		
	- Ακρίδες (<i>Locustidae</i>)		
13.13. Πατάτα	- Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	1,5-2,5	Σκόνισμα όταν εμφανιστούν τα έντομα (1)*,(2)*
13.13.1 Φυτά στον αγρό	- Αγρότιδες (6)* (<i>Agrotis</i> spp.)		
	- Τζιτζικάκια (<i>Cicadella</i>)		
13.13.2 Πατατό-σπορος	- Φθοριμαία (<i>Phthorimaea operculella</i>)	100-200 γρ./ 100 κιλά σπόρου	Υπολογίζουμε πρώτα την ποσότητα φαρμάκου που χρειάζεται (αναλογεί) και οι πατάτες στρώνονται σε επίπεδα (1-2 πατάτες). Κάθε επίπεδο σκονίζεται με την ποσότητα που αναλογεί.
13.14. Αραβόσιτος	- Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>)	1,5-2,5	» (1)*,(2)*
	- Πυραλίδα (<i>Ostrinia nubilalis</i>)		
	- Σεζάμιες (<i>Sesamia nanagrioides</i> , <i>S.Cretica</i>)		
	- Αγρότιδες (6)* (<i>Agrotis</i> spp.)		
13.15.Ζαχαρότευ- τλα	- Αλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i>)	1,5-2,5	» (1)*,(2)*
	- Κλεονός (<i>Bothynoderes punctiventris</i>)		
	- Λύξος (<i>Lixus junci</i> , <i>Lixus</i> sp.)		
	- Θρίπες (<i>Thrips</i> spp.)		
	- Αγρότιδες (6)* (<i>Agrotis</i> spp.)		
	- Προνούμφες Λεπιδοπτέρων		
	- Ακρίδες (<i>Locustidae</i>)		

13.16. Μηδική, τριφύλλι	<ul style="list-style-type: none"> - Ωτιόρρυγχος (Otiorynchus sulcatus) -Φυτονόμος (Phytonomus variabilis) - Αγρότιδες (6)* (Agrotis spp.) - Άλτης (Longitarsus pratensis) - Ρυγχίτης (Rhynchites spp.) - Προνούμφες Λεπιδοπτέρων 	1,5-2,5	Σκόνισμα όταν εμφανιστούν τα έντομα (1)*,(2)*
13.17 Καλλωπιστικά φυτά (γαρύφαλο, χρυσάνθεμο, γλαδίολος, ντάλια, τριανταφυλλιά)	<ul style="list-style-type: none"> - Κοκκοειδή (Coccidae) - Βρωμούσες (Pentatomidae) - Θρίπες (Thrips spp.) - Τζιτζικάκια (Typhlocyba rosae, Thamnotetix fuscovenosus, Cicadella viridis) - Αγρότιδες (6)* (Agrotis spp.) - Προνούμφες Λεπιδοπτέρων 	1,5-2,5 Kg/ στρέμμα	» (1)*,(2)*

Παρατηρήσεις- Περιορισμοί κατά την χρήση:

- (1) Η χρήση του προκαλεί αύξηση του πληθυσμού των τετρανύχων, έχει όμως κατασταλτική δράση στα ERIOPHYIDAE.
- (2) Η χρήση του προκαλεί φθορά στα ωφέλιμα παράσιτα.
- (3) Στις μηλιές τα σκονίσματα αρχίζουν 30 ημέρες μετά την πλήρη άνθιση επειδή πρωιμότερες επεμβάσεις μπορεί να προκαλέσουν αραίωμα των καρπών.
- (4) Στην αχλαδιά μπορεί να προκληθεί ζημιά σε συνδυασμό με θερινό πολτό.
- (5) Στην Ελιά δεν χρησιμοποιείται περισσότερο από δύο φορές το χρόνο.
- (6) Για την καταπολέμηση της αγρότιδας να σκονίζονται τα φυτά και το έδαφος γύρω από το λαιμό τους μετά τη δύση του ηλίου.

14. Φυτοτοξικότητα: ----

15. Συνδυαστικότητα:

Το σκεύασμα δεν συνδυάζεται με τα πολύ αλκαλικά σκευάσματα (βορδιγάλειο πολτό, ασβεστούχα μίγματα, χαλκούς, ουρία, PROPANIL).

16. Σημάνσεις:

Τοξικότητας: Xi, Ερεθιστικό

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

(R37) Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις) :

- (RO1) Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.
- (RO6) Βλαβερό για τα ψάρια.
- (RO7) Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία (S, SY φράσεις) :

- (S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- (S13) Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- (S20/21) Μη τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.
- (S24/25) Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.
- (S26) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.
- (S27/SY6) Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί μετά την επέμβαση. Πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε.
- (S35) Πάρτε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να απορρίψετε το προϊόν ή τη συσκευασία του, καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με κάψιμο ή θάψιμο.
- (S36/37/39) Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
- (S44) Αν αισθανθείτε αδιαθεσία κατά ή μετά την επέμβαση καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.
- (SY5) Φοράτε μάσκα για σκόνες όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.
- (SY7) Πλύνετε τα ρούχα της δουλειάς μετά το σκόνισμα.
- (SY8) Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκάσμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

20. Πρώτες βοήθειες:

- (S46) Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.. Προκαλέστε εμετό, εφόσον ο πάσχων έχει τις αισθήσεις του. Πλύνετε τα μέρη του σώματος που ήρθαν σε επαφή με το φάρμακο.
Αντίδοτο: Ατροπίνη.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77.93.777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις) :

- (SO1) Μην σκονίζετε ανθισμένα φυτά.. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.
- (SO4) Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (A): ---

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (φράσεις Π) :

- Π1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Σταφύλια, φράουλες : 14 ημέρες
Λοιπές καλλιέργειες: 7 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Για δύο χρόνια, όταν φυλάσσεται στη συσκευασία του σε δροσερές και ξηρές συνθήκες. Δεν πρέπει να στοιβάζεται σε πολύ υψηλούς σωρούς.

II. Ετικέτα:

- α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2003**.

- β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ