

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ.Κωδ. : 10679 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο : 3617571

ΘΕΜΑ: Χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(φυτορρυθμιστική ουσία)
GIBBERELLIC ACID-QIANJIANG 4 SL.

ΠΡΟΣ: 1) INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Κηφισίας 31
115 23 - Αθήνα
(Με απόδειξη)
2) Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους
3) Δ/σεις Εμπορίου
Έδρες τους
4) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 "Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου γεωργικών φαρμάκων" και ειδικότερα την παρ.2 του άρθρου 2 και το άρθρο 5., παρ. 8.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας για την "τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων" Κεφ.Β, παρ.1.-
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 απόφασή μας (ΦΕΚ 599/24.8.88) όσον αφορά τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων", καθώς και το Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ. 104/Α/30-5-97).
4. Τη με αριθ. 68632/9-3-1994 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 8090 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) BRALLIN 4 SL..
5. Τη με αριθ. 358731/14-10-96 (ΦΕΚ. 939/Β/15-10-96) απόφαση του κ Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας. για "ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ.Δ. Σωτηρλή και Β. Γερανίδη".
6. Τις από 7-3-1995 και 3-5-1998 σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
7. Την από 22-9-1998 αίτηση της εταιρείας, με την οποία υπέβαλε τα συμπληρωματικά στοιχεία.

Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 8109 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: GIBBERELLIC ACID.
2. Μορφή: Υδατοδιαλυτό υγρό (SL).
3. Εγγραμμένη σύνθεση: Gibberellic acid 4% β/ο.
Βοηθητικές ουσίες: 93.3% β/β.

4. Καθαρότητα του technical από το οποίο παρασκευάζεται, του Οίκου QIANJIANG BIOCHEMISTRY, ΚΙΝΑΣ : 85 % min.
5. Παρασκευαστής: QIANJIANG BIOCHEMISTRY Co. Ltd., SOUTH OF XIASHI TOWN, HAINING, ZHEJIANG, CHINA.
6. Αντιπρόσωπος: INTRACHEM ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
7. Τυποποιητής: QIANJIANG BIOCHEMISTRY Co. Ltd.
8. Συσκευαστής: ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.
9. Συσκευασία: 9α. Είδος-Μέγεθος : Φιάλες των 30, 50 και 100 κ. εκ.
9β. Υλικό: COEX, PVC σκληρό, Αλουμίνιο.

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:

Αύξηση της καρπόδεσης, βελτίωση της ποιότητας, πρωιμότητα της παραγωγής στις καλλιέργειες: Αμπέλι (Σουλτανίνα και Μαύρη Κορινθιακή σταφίδα) αγκινάρα και σέλινο. Διεγείρει τη διαίρεση και την επιμήκυνση των κυττάρων. Δεν επιδρά στις ρίζες.

11. Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός καλύψεως (μέχρι απορροής).

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού :

Βάζουμε στο ψεκαστικό τη μισή ποσότητα νερού. Την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος τη διαλύουμε σε μικρή ποσότητα νερού, σε χωριστό δοχείο και το διάλυμα το ρίχνουμε στο ψεκαστικό. Ξεπλένουμε το δοχείο και ρίχνουμε το νερό στο ψεκαστικό. Συμπληρώνουμε στο ψεκαστικό το υπόλοιπο νερό.

13. Φάσμα δράσης :

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ../100 λίτρα νερού)	ΤΡΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΠΕΛΙ Σουλτανίνα για Επιτραπέζια	Αύξηση καρπόδεσης πρωίμιση παραγωγής	50-100	α. Στην πλήρη άνθηση (1) β. Μετά 5-12 ημέρες.
Σουλτανίνα για Σταφίδα	Αύξηση του μεγέθους των ραγών	5-15	Όταν οι ράγες γίνουν 3 mm.
Κορινθιακή Σταφίδα	Μείωση ανθόρροιας & καρπόπτωση (υποκατάσταση χαρακώματος)	2,5-12,5	Στην πλήρη άνθηση (2).
ΑΓΚΙΝΑΡΑ	Πρωίμιση & αύξηση Παραγωγής	40-87,5	Όταν τα φυτά έχουν 6-8 φύλλα ή 10-12 στα φυτά Ηλικίας 1 έτους (3).
ΣΕΛΙΝΟ	Πρωίμιση & αύξηση παραγωγής & μήκους στελέχους	125-175	4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή (4)

Παρατηρήσεις :

1. Ο πρώτος ψεκασμός να γίνεται όταν πέσει το 70% των πιλιδίων. Να γίνεται καλή διαβροχή των τσαμπιών.
2. Προσθήκη 1,5-2 γρ. /100 λίτρα νερού PCPA βελτιώνει το αποτέλεσμα. PCPA να μην εφαρμόζεται σε πρέμνα ηλικίας κάτω των τριών ετών. Όταν χρησιμοποιείται PCPA να μην γίνονται θειαφίσματα 7 ημέρες πριν και 4 μετά τον ψεκασμό.
3. Γίνονται 3 ψεκασμοί, με διάστημα 15-20 ημέρες μεταξύ τους. Να αυξάνεται η αζωτούχος λίπανση και το πότισμα.
4. Ο ψεκασμός να προγραμματίζεται στον αγρό κατά τμήματα ανάλογα με το χρόνο συγκομιδής.
5. Οι ψεκασμοί να γίνονται τις ψυχρές ώρες της ημέρας.
6. Στο ψεκαστικό να προστίθεται προσκολλητικό.

14. Φυτοτοξικότητα:

Όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως του δεν παρουσιάζει κίνδυνο για τα φυτά.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά διαλύματα. Όταν χρησιμοποιείται σαν υποκατάστατο της χαραγής στη Σουλτανίνα και την Κορινθιακή σταφίδα μπορεί να συνδυαστεί με σκευάσματα του PCPA για βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

16. Σημάνσεις: Για τον άνθρωπο: -

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):-

RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις)

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S15 Φυλάξτε το μακριά από θερμότητα.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.

S47/49 Διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία ίση ή κατώτερη των 32° C και μεγαλύτερη από 0° C.

SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

SY11 Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Σε περίπτωση δηλητηρίασης ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις): -

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): -

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):-

Π1: Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Σέλινο: 7 ημέρες.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια στην αρχική και κλειστή συσκευασία του σε ξηρό μέρος και θερμοκρασία πάνω από 0° C και κάτω από 32° C.

II.Κείμενο ετικέτας

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Η τελική ετικέτα να προσκομισθεί στην υπηρεσία το αργότερο εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης (1 ετικέτα για κάθε συσκευασία).

III.α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12. 2002.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, να υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ. ΣΩΤΗΡΛΗΣ