



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 12 - 3 - 2008

Αρ. πρωτ. : 116877

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 17671 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Γ.Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 9212164**

**ΠΡΟΣ: Arysta Life Science S.A.S.
(δια της ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ
Λεωφ. ΝΑΤΟ 19300 Ασπρόπυργος)
(με απόδειξη)**

**ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (ζιζανιοκτόνο) SELECT 12 EC”**

- ΚΟΙΝ.:** 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γεν. Γραμ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο **(με e-mail)**
Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους **(με e-mail)**
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης
Έδρες τους **(με e-mail)**
6) Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/σής μας
7) Γραμματεία της Δ/σής μας

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β (παρ. 1).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) Απόφασή μας, όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3.9.2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ καθώς και τη με αριθ. 108114/30.7.2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8.8.2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 90281/8-1-2004 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7577 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) SELECT 24 EC.
6. Το με αριθμ. 123951/14-6-2005 μας στο οποίο αναφέρονται τα εθνικά ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας clethodim.

7. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α’).
8. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β’/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”».
9. Τις από 6-6-2007 και 6-2-2008 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 6-2-2008 πρωτόκολλο εξέτασης φακέλου της εταιρείας ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **7854** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα :** SELECT 12 EC.
- 2. Μορφή:** Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση :** Clethodim 12% β/ο
Βοηθητικές ουσίες : 86,11% β/β
- 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: Clethodim 93,5 % min.
- 5. α.Παρασκευαστής της δ.ο :** Arysta Life Science North America Corp - ΗΠΑ
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο : Future Fuel Chemical Company- ΗΠΑ
γ.Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο: Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο Clethodim όπως προσδιορίζονται στο τμήμα (Εντυπα IV a, IV b & V) της αίτησης με ημερομηνία 6.6.2007 και παραμένουν στα αρχεία της Αρόδια Αρχής.
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** Arysta Life Science S.A.S. - Γαλλία
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας : ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ, Λεωφ. NATO 19300 Ασπρόπυργος
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ, Λεωφ. NATO 19300 Ασπρόπυργος
- 7. α. Παρασκευαστής του σκευάσματος :** Arysta Life Science S.A.S. - Γαλλία
β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος : Arysta Life Science S.A.S. - Γαλλία
- 8. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος :** ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ, Λεωφ. NATO 19300 Ασπρόπυργος
- 9. Συσκευασία: α. Μέγεθος :** Φιάλες των εκατό (100), εκατόν πενήντα (150), διακοσίων (200), διακοσίων πενήντα (250) , τριακοσίων (300), πεντακοσίων (500), επτακοσίων πενήντα (750), κ.εκ και ενός (1), πέντε (5) , δέκα (10) και είκοσι(20) λίτρων
β. Υλικό: Πολυαιθυλένιο PE (HDPE),
- 10 Στόχος για τον οποίο προρίζεται – Τρόπος δράσης :**
Εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική δράση σε αγρωστώδη ζιζάνια. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδιστής του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετοτυλο-συνενζύμου Α).
- 11.Τρόπος εφαρμογής :** Μεταφωτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα με τα συνήθη ψεκαστικά μέσα και με πίεση έως 3 Atm., με μπεκ τύπου σκούπας.
- 12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινείτε καλά την φιάλη συσκευασίας και προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας συγχρόνως για 2-3 λεπτά και απογεμίστε το δοχείο με συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./στρ	ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
ΒΑΜΒΑΚΙ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ΠΑΤΑΤΑ ΤΟΜΑΤΑ	<i>Alopecurus myosuroides</i> (αλεπονουρά), <i>Avena sterilis</i> (αγριοβρώμη), <i>Echinochloa crus-galli</i> (μουχρίτσα), <i>Setaria</i> spp. (σετάριες).	150-200	Ψεκασμός όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε στάδιο από 2-3 φύλλων μέχρι αδελφώματος	1
	<i>Sorghum halepense</i> (βέλιουρας).	200-250	Ψεκασμός στο στάδιο των 20-30 εκ.	
	<i>Cynodon dactylon</i> (αγριιάδα).	250-300	Ψεκασμός στο στάδιο των 20-30 εκ.	

Παρατηρήσεις:

Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το στάδιο και τις συνθήκες ανάπτυξης των ζιζανίων. Οι μεγάλες δοσολογίες εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο ανάπτυξης και οι χαμηλές στο μικρότερο στάδιο ανάπτυξης.

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα (SZ φράσεις)

- SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους, προστατευμένο από το κρύο.
- SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- SZ3 Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας και εφόσον πρόκειται να ακολουθήσει καλλιέργεια δημητριακών, είναι αναγκαία μια περίοδος αναμονής 3 μηνών πριν τη σπορά.
- SZ5 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- SZ7 Μην ψεκάσετε όταν φυσάει και αντίθετα με την φορά του ανέμου.
- SZ9 Ψεκάστε με πίεση έως 3 Atm. (40-50 psi)
- SZ10 Χρησιμοποιείτε μπέκ τύπου σκούπας.
- SZ11 Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.
- SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύντε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό.

14. Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις

15. Συνδυαστικότητα : Δεν συνιστάται ο συνδυασμός του με άλλα σκευάσματα. Δεν απαιτείται η προσθήκη λαδιού

16. Σημάνσεις : Xi – Ερεθιστικό, N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις)

R38 Ερεθιστικό για το δέρμα

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις)

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις)

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα , ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.

S36 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες –Αντίδοτο

Σε περίπτωση κατάποσης δώστε στον ασθενή νερό ή γάλα και καλέστε ιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό απουσία ιατρού.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε με άφθονο νερό & σαπούνι.

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Πλύνετε καλά τα μάτια κρατώντας τα ανοικτά με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον ασθενή σε καθαρό αέρα και αν τα συμπτώματα επιμένουν καλέστε γιατρό λέγοντάς του ότι το σκεύασμα περιέχει διαλυτή υδρογονάνθρακα.

Αντίδοτο : Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις)

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

S61 Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Οδηγίες για την ασφαλή αποκομιδή του προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία.), ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε το ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα δοχεία που θα καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις)

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Βαμβάκι 120 ημέρες

Ζαχαρότευτλα 110 ημέρες

Πατάτα	60 ημέρες
Τομάτα	30 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ

