



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα,, 16-10-2003

Αριθ. πρωτ.: 113011

Ταχ. Διεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5

Ταχ. Κώδικας : 101 64 – ΑΘΗΝΑ

TELEFAX : 210 36 17 103

Πληροφορίες : Κ. Καραμήτρος

Τηλέφωνο : 210 212 45 25

ΠΡΟΣ: 1. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Τιμ. Φιλήμονος 15

Τ.Κ. 115 21

ΑΘΗΝΑ

(με απόδειξη)

2. Διευθύνσεις Γεωργίας

Έδρες τους

3. Διευθύνσεις Εμπορίου

Έδρες τους

4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό

Ινστιτούτο

Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών

Φαρμάκων

Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο φυτοπροστα-  
τευτικό προϊόν (εντομοκτόνο)  
DIZIKTOL 10 GR ”

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 (ΦΕΚ 298/Α/1977) «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2 (παρ. 2) και το άρθρο 5 (παρ. 2 και 8).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» Κεφ.Β., παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83346/28.7.86 (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά τον «καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97) Προεδρικό Διάταγμα.
4. Τη με αριθ. 101386/7.7.86 Απόφασή μας με την οποία ανανεώθηκε η με αριθ. 1379/26.2.80 οριστική έγκριση κυκλοφορίας του όμοιας σύνθεσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνου) BASUDIN 10 G, καθώς και τη με αριθ. 61983/20.5.98 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 1707 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) ΕΦΝΤΙΑΖΟΝ 40 WP
5. Τη με αριθ. 399580/30.10.2001 (ΦΕΚ 1479/Β/31.10.2001) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη".
6. Τις από 24-7-2002, 19-2-2003, 28-2-2003, 4-3-2003 και 24-4-2003 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 4-4-2003 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.

## Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **14014** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** DIZIKTOL 10 GR
2. **Μορφή:** Κοκκώδεις (GR)
3. **Εγγραμμένη σύνθεση:** diazinon 10% β/β,  
βοηθητικές ουσίες: 89,47% β/β
4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται: 95% min.
5. **Παρασκευαστής:** MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD - ISRAEL
6. **Αντιπρόσωπος:** ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, Τιμ. Φιλήμονος 15, 11521 Αθήνα.
7. **Τυποποιητής:** ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, Οινόφυτα - Βοιωτίας
8. **Συσκευαστής:** ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, Οινόφυτα – Βοιωτίας

9. **Συσκευασία:** 9<sup>α</sup>. Είδος-Μέγεθος: Κουτιά των 500, 750 γραμ., 1 κιλού, 2, 3, 4 και 5 κιλών.

Σακίδια των 2, 3, 4, 5 & 10 κιλών.

9<sup>β</sup> Υλικό: Χάρτινα κουτιά με εσωτερικό σάκο από πολυαιθυλένιο.

Σύνθετα σακίδια πολυαιθυλενίου-πολυεστέρα ή πολυαιθυλενίου-αλουμινίου-πολυεστέρα.

10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:** Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, εφαρμοζόμενο πριν ή κατά τη σπορά για την καταπολέμηση εντόμων εδάφους και νηματωδών.

11. **Τρόπος εφαρμογής:** Ομοιόμορφος διασκορπισμός με διανομέα κοκκοδών που προσαρμόζεται στην σπαρτική ή φυτευτική μηχανή, ή με το χέρι, και ενσωμάτωση. Μετά την εφαρμογή του πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για την πλήρη ενσωμάτωση των κόκκων που έπεσαν στα άκρα του χωραφιού.

12. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** -----

13. **Φάσμα δράσης:**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
<b>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</b> Σκόρδο, Κρεμμύδι, Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι, Πεπόνι, Λάχανο, Μαρούλι	<b>Εντομα εδάφους:</b> Σιδεροσκούληκα (Elateridae),	4 – 10 κιλά/στρ σε όλη την επιφάνεια 1–1,85 γρ./μέτρο στη γραμμή	α. Εφαρμογή 1 – 2 ημέρες πριν τη σπορά ή μεταφύτευση με διασκορπισμό σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση β. Εφαρμογή κατά τη σπορά ή φύτεμα στις γραμμές, αυλακιές ή λάκκους φυτέματος. Ακολουθεί κυλίνδρισμα ή ελαφρό παράχωμα.
	Αγρότιδα, Καραφατμέ ή Κοφτοσκούληκα (Agrotis segetum)	4 κιλά/στρ σε όλη την επιφάνεια 0,75-1 γρ./μέτρο στη γραμμή	
	Πρασάγγουρας ή κρεμμυδοφάγος ή κολοκυθοκόφτης (Gryllotalpa gryllotalpa)	2 - 3 κιλά/στρ σε όλη την επιφάνεια 0,5 γρ./μέτρο στη γραμμή	
	Υλέμυιες (Hylemyia spp.)	3 – 4 κιλά/στρ σε όλη την επιφάνεια 0,5–0,75 γρ./μέτρο στη γραμμή	

<b>ΨΥΧΑΝΘΗ</b> Φασόλια, Μπιζέλια	<b>Εντομα εδάφους:</b> Σιδεροσκούληκα (Elateridae),  Αγρότιδα, Καραφατμέ ή Κοφτοσκούληκα (Agrotis segetum)  Πρασάγγουρας ή κρεμμυδοφάγος ή κολοκυθοκόφτης (Gryllotalpa gryllotalpa)  Υλέμυιες (Hylemyia spp.)	1–1,85 γρ./μέτρο στη γραμμή  0,75-1 γρ./μέτρο στη γραμμή  0,5 γρ./μέτρο στη γραμμή  0,5–0,75 γρ./μέτρο στη γραμμή	Εφαρμογή κατά τη σπορά στις γραμμές. Ακολουθεί κυλίνδρισμα.
<b>Βαμβάκι,  Αραχίδα</b>	<b>Εντομα εδάφους:</b> Σιδεροσκούληκα (Elateridae),  Αγρότιδα, Καραφατμέ ή Κοφτοσκούληκα (Agrotis segetum)  Πρασάγγουρας ή κρεμμυδοφάγος ή κολοκυθοκόφτης (Gryllotalpa gryllotalpa)  Υλέμυιες (Hylemyia spp.)	1–1,85 γρ./μέτρο στη γραμμή  0,75-1 γρ./μέτρο στη γραμμή  0,5 γρ./μέτρο στη γραμμή  0,5–0,75 γρ./μέτρο στη γραμμή	Εφαρμογή κατά τη σπορά στις γραμμές. Ακολουθεί κυλίνδρισμα.
<b>ΠΑΤΑΤΑ</b>	<b>Εντομα εδάφους:</b> Σιδεροσκούληκα (Elateridae),  Αγρότιδα, Καραφατμέ ή Κοφτοσκούληκα (Agrotis segetum)  Πρασάγγουρας ή κρεμμυδοφάγος ή κολοκυθοκόφτης (Gryllotalpa gryllotalpa)  Υλέμυιες (Hylemyia spp.)	1–1,85 γρ./μέτρο στη γραμμή  0,75-1 γρ./μέτρο στη γραμμή  0,5 γρ./μέτρο στη γραμμή  0,5–0,75 γρ./μέτρο στη γραμμή	Εφαρμογή κατά τη σπορά στις γραμμές. Ακολουθεί κυλίνδρισμα.
<b>Καλαμπόκι</b>	<b>Εντομα εδάφους:</b> Σιδεροσκούληκα (Elateridae),  Αγρότιδα, Καραφατμέ ή Κοφτοσκούληκα (Agrotis segetum)  Πρασάγγουρας ή κρεμμυδοφάγος ή κολοκυθοκόφτης (Gryllotalpa gryllotalpa)  Υλέμυιες (Hylemyia spp.)	1–1,85 γρ./μέτρο στη γραμμή  0,75-1 γρ./μέτρο στη γραμμή  0,5 γρ./μέτρο στη γραμμή  0,5–0,75 γρ./μέτρο στη γραμμή	Εφαρμογή κατά τη σπορά στις γραμμές. Ακολουθεί κυλίνδρισμα.
	Σεζάμια (Sesamia spp.),	2 κιλά/στρέμμα	Μία εφαρμογή με

	Πυραλίδα ( <i>Ostrinia nubilalis</i> )	(μία εφαρμογή) 1,5 κιλό/στρέμμα (δύο εφαρμογές).	ειδική συσκευή ώστε οι κόκκοι να πέφτουν στις συστροφές των φύλλων, στο μέγιστο της πτήσης των πεταλούδων. Αν παρατηρηθεί εκ νέου σποραδικό πέταγμα πεταλούδων, συνιστάται 2 <sup>η</sup> εφαρμογή 2-3 εβδομάδες αργότερα.
<b>Ρύζι</b>	Μυζητικά έντομα (αφίδες, θρίπες, τζιτζικάκια, κ.α.) Προνύμφες διπτέρων ( <i>Agromyza</i> , <i>Ghlorops</i> , <i>pachydiprosis oryzae</i> κ.α.)	1 - 1,5 κιλό/στρέμμα	2 – 3 εφαρμογές κάθε 20 – 25 ημέρες στο στεκούμενο νερό της άρδευσης, μόνο του ή μαζί με τα λιπάσματα, αρχίζοντας 50-60 ημέρες μετά την σπορά.
<b>Σακχαρότευτλα</b>	<b>Έντομα εδάφους:</b> Σιδεροσκούληκα ( <i>Elateridae</i> ),  Αγρόπιδα, Καραφατμέ ή Κοφτοσκούληκα ( <i>Agrotis segetum</i> )  Πρασάγγουρας ή κρεμμυδοφάγος ή κολοκυθοκόφτης ( <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> )  Υλέμυιες ( <i>Hylemyia</i> spp.)	1–1,85 γρ./μέτρο στη γραμμή  0,75-1 γρ./μέτρο στη γραμμή  0,5 γρ./μέτρο στη γραμμή  0,5–0,75 γρ./μέτρο στη γραμμή	Εφαρμογή κατά τη σπορά στις γραμμές. Ακολουθεί κυλίνδρισμα.
<b>Καπνός</b>	<b>Έντομα εδάφους:</b> Σιδεροσκούληκα ( <i>Elateridae</i> ),  Αγρόπιδα, Καραφατμέ ή Κοφτοσκούληκα ( <i>Agrotis segetum</i> )  Πρασάγγουρας ή κρεμμυδοφάγος ή κολοκυθοκόφτης ( <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> )  Υλέμυιες ( <i>Hylemyia</i> spp.)	1–1,85 γρ./μέτρο στη γραμμή  0,75-1 γρ./μέτρο στη γραμμή  0,5 γρ./μέτρο στη γραμμή  0,5–0,75 γρ./μέτρο στη γραμμή	Εφαρμογή κατά τη σπορά στις γραμμές. Ακολουθεί κυλίνδρισμα.
<b>ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ</b>	Νηματώδεις	48 κιλά/στρέμμα   15 γρ./μέτρο	Σε όλη την επιφάνεια  Εφαρμογή στις γραμμές

#### 14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες και δόσεις που συστήνεται η εφαρμογή του, στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

**15. Συνδυαστικότητα:**

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν χαλκό.

**16. Σημάνσεις τοξικότητας: -----**

**17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): -----**

**18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):**

- RO1 Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.
- RO5 Τοξικό για τα ψάρια.

**19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):**

- S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
- S37 Φοράτε κατάλληλα γάντια.
- SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή
- S35 Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με θάψιμο ή κάψιμο.

**20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:**

- S44 Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

**Αντίδοτο: Θεϊϊκή ατροπίνη.**

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.**

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**

- Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.
- SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):**

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

Π1 -Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Καλαμπόκι: 15 ημέρες.

Ρύζι: 15 ημέρες.

Λοιπές καλλιέργειες: ---- (εφαρμόζεται πριν ή κατά τη σπορά ή τη μεταφύτευση).

**24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Να φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία μακριά από ηλιακό φως.

Ημερομηνία λήξης: δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**II. Κείμενο ετικέτας:**

**α.** Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα Απόφαση.

**β.** Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην υπηρεσία εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης.

**III. α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2007**.

**β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ**