

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ.Κωδ.:10679 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ.Καραμήτρος
Τηλέφωνο: 5291411

ΘΕΜΑ: Χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας
στο γεωργικό φάρμακο (ζιζανιοκτόνο)
DESORMONE 60 SL

ΠΡΟΣ: 1 RHONE-POULENC
ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Μεσογείων 304 και Λοχ. Δεδούση 1
155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
(Με απόδειξη)
2. Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους
3.Δ/σεις Εμπορίου
Έδρες τους
4 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ

Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 "Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου γεωργικών φαρμάκων" και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 2 και το άρθρο 5., παρ. 8.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας για την "τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων" Κεφ.Β, παρ. 4.-
- 3 Τη με αριθ. 83345/28.7.88 απόφασή μας (ΦΕΚ 599/24.8.88) όσον αφορά τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων".
4. Τη με αριθ. 73512/23-1-1989 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7389 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο ομοίως σύνθεσης και μορφής, αλλά διαφορετικής περιεκτικότητας γεωργικό φάρμακο (ζιζανιοκτόνο) LINZAMIN 40 SL.
5. Τη με αριθ 358731/14-10-96 (ΦΕΚ 939/Β/15-10-96) απόφαση του κ Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για "ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ. Δημ. Σωτηρλή και Βασ. Γερανίδη".
6. Τις από 24-2-1994, 11-9-1995, 24-10-1997 και 10-2-1998 σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερομένης εταιρείας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 7528 γεωργικό φάρμακο (ζιζανιοκτόνο) με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: DESORMONE
2. Μορφή: Υδατοδιαλυτό Υγρό (SL)
3. Εγγυημένη σύνθεση: 2,4 D 60 % β/ο (υπό μορφή άλατος διμεθυλαμίνης).
Βοηθητικές ουσίες: 49,49 % β/β.-
4. Καθαρότητα του technical από το οποίο παρασκευάζεται: 99 % min.

5. Παρασκευαστής: RHONE-POULENC AGROCHIMIE S.A.-ΓΑΛΛΙΑ

6. Αντιπρόσωπος: ΡΟΝ-ΠΟΥΛΕΝΚ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

7. Τυποποιητής: Ο παρασκευαστής

8. Συσκευαστής: ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΕ.-Μάνδρα Αττικής..

9. Συσκευασία : 9α. Είδος-Μέγεθος : Φιάλες ενός (1) λίτρου και δοχεία (μπιτόνια) πέντε (5) λίτρων.-

9β. Υλικό : Φιάλες ενός (1) λίτρου από Πολυαιθυλένιο (PE), COEX και μεταλλικά δοχεία με εσωτερικό βερνίκι
Δοχεία από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE).

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται :

Μεταφυτρωτικό ορμονικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και μερικών πολυετών πλατυφύλλων ζιζανίων στα χειμερινά σιτηρά. Δρά δι' επαφής, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ταχεία ανάπτυξη.

11. Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός των ζιζανίων με 40-60 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα., με μπέκ τύπου σκούπας και πίεση μικρότερη των δύο (2) Atm. (30 PSI)..

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού :.

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέσου με νερό μέχρι τη μέση.

Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.-Μη χρησιμοποιείτε σκληρό νερό.

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύντε τα, ρίχνοντας τα νερά στο ψεκαστικό.

13. Φάσμα δράσης :

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ Κυβ.εκατ./στρέμμα	ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χειμερινά σιτηρά: (Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη)	Καταπολέμηση ετησίων και μερικών πολυετών πλατυφύλλων ζιζανίων (2)	85-335 (1)	Στο στάδιο του αδελφώματος και μέχρι την αρχή του καλαμώματος (πρώτος κόμβος). Τα ετήσια ζιζάνια ψεκάζονται στο νεαρό στάδιο ανάπτυξης τους, ενώ βρίσκονται ακόμη σε γρήγορη ανάπτυξη. Τα πολυετή ζιζάνια ψεκάζονται με την μεγαλύτερη δόση από το μπουμπούκισμα μέχρι πριν την άνθηση με επανάληψη στις τυχόν αναβλαστήσεις. Αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο έως δύο (2).
-Ρύζι	»	»	»
-Καλαμπόκι	»	55-65 (1)	Όταν έχει ύψος 10-30 εκατοστά. Μην ψεκάζετε μετά το ξεδίπλωμα των φύλλων ή στο στάδιο της φούντας. Μην ψεκάζετε με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 25 °C.-

-Γκαζόν	»	85-170 (1)	Το φθινόπωρο ή ενωρίς την άνοιξη.
-Ακαλλιέργητες εκτάσεις	»	155-335 (1)	Τα ετήσια ζιζάνια ψεκάζονται στο νεαρό στάδιο ανάπτυξης τους, ενώ βρίσκονται ακόμη σε γρήγορη ανάπτυξη. Τα πολυετή ζιζάνια ψεκάζονται με την μεγαλύτερη δόση από το μπουμπουκίασμα μέχρι πριν την άνθηση με επανάληψη στις τυχόν αναβλαστήσεις.

Παρατηρήσεις:

1)Οι υψηλές δόσεις χρησιμοποιούνται, όταν υπάρχουν πολυετή ζιζάνια.-

2)Ζιζάνια

α)Μερικά ευαίσθητα ζιζάνια

Ετήσια

Αγριόβικος (Vicia spp)
Αγριο σινάπι (sinapis arvensis)
Βλήτο (Amaranthus spp)
Βρούβα (Sinapis alba)
Ζωχός (Sonchus spp)
Θλάσπι (Thlaspi spp)
Καφέλα (Capsella bursa pastoris)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Πικρόχορτο (Sisymbrium irio)
Ρανούγκουλος (Ranunculus arvensis)
Ραφανίδα (Raphanus raphanistrum)
Τσουκνίδα μικρή (Urtica urens)

Πολυετή

Κίρσιο (Cirsium spp)
Λάπαθο (Rumex spp)
Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis)
Ραδίκι (Cichorium intybus)

β) Μερικά ανθεκτικά ζιζάνια:

Ετήσια

Αγριομαργαρίτα (Chrysanthemum segetum)
Ανθεμίδα (Anthemis spp)
Κολλητσίδα μεγαλόκαρπη (Gallium aparine)
Λαψάνα (Lapsana communis)
Φλώμος Euphorbia spp)
Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)

Πολυετή: Όλα, εκτός των αναφερομένων στα ευαίσθητα.-

3) Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτονα (SZ φράσεις):

SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

SZ3 Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε καμιά καλλιέργεια στην ψεκασμένη έκταση πριν περάσουν τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την εφαρμογή.

SZ5 Μη μολύνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες..

SZ6 Αν μολυνθούν τα νερά αρδεύσεως να μην χρησιμοποιηθούν πριν περάσουν τρεις (3) εβδομάδες.

SZ7 Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

SZ8 Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.

SZ9 Ψεκάστε με πίεση χαμηλή, μικρότερη από δύο (2) Atm (30 PSI).

SZ10 Χρησιμοποιείτε μπέκ τύπου σκούπας.

SZ11 Μη το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.

SZ12 Μετά τον ψεκασμό πλύντε τα ψεκαστικά μέσα και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με πετρέλαιο, στη συνέχεια πλύντε τα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Πριν τα ξαναχρησιμοποιήσουμε, ελέγχουμε αν έχει απομακρυνθεί το ζιζανιοκτόνο.

14. Φυτοτοξικότητα:

Είναι τοξικό στις καλλιέργειες: Βαμβάκι, Τομάτα, Τεύτλα, Καπνά, Αμπέλια, Δένδρα.

15. Συνδυαστικότητα: Δεν συνιστάται οσυνδυασμός του με άλλα σκευάσματα.-

16. Σημάνσεις: Για τον άνθρωπο: Επικίνδυνο- Ερεθιστικό, Χη-Χι.-Σταυρός Αγίου Ανδρέα.-
Λοιπές:-

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.

R36/37/38 Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):-

RO2 Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες

RO6 Βλαβερό για τα ψάρια.

RO10 Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις)

S1/2/9 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά σε χώρο καλά αεριζόμενο.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε και κατά τον ψεκασμό.

S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.

S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

S27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα στα οποία έπεσε πυκνό σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό, πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε.

S35 Μην ξαναχρησιμοποιήσετε τα κενά υλικά συσκευασίας αλλά καταστρέψτε τα με πίεση ή τρύπημα αφού τα ξεπλύνετε καλά.

S36/37/SY4 Φοράτε φόρμες, γάντια και γυαλιά.

SY11 Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση δηλητηρίασης καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Σε περίπτωση κατάποσης συστήνεται πλύση στομάχου με ενεργό άνθρακα και συνεχής παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας. Προσοχή στη χορήγηση αδρεναλίνης.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συνιστάται συμπτωματική θεραπεία.-

-Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):-

SO2 Μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες.

SO5 Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για δεκαπέντε (15) μέρες. Στο ίδιο διάστημα μην κόβετε χόρτο για τα ζώα.-

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

A1 Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε ακτίνα τετρακοσίων (400) μέτρων από ευαίσθητες καλλιέργειες (Βαμβάκι, Τομάτα, Τεύτλα, Καπνά, Αμπέλια, Δένδρα).-

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις).

Π1 Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:-

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε χώρο αεριζόμενο, δροσερό και ξηρό.

Σ' αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.

II.Κείμενο ετικέτας

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Η τελική ετικέτα να προσκομισθεί στην υπηρεσία το αργότερο εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12. 2002.

Ο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΔΗΜ. ΣΩΤΗΡΛΗΣ