



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 3-2-1999

Αριθ. Πρωτ.: 88140

**Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 ΑΘΗΝΑ**

TELEFAX: 3617103

**Πληροφορίες: Α.Φονταρά
Τηλέφωνο: 5291411**

**ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο γεωργικό
φάρμακο (μυκητοκτόνο)
VITAVAX 16,6/14,7 FS**

ΠΡΟΣ: 1) Κ. Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Δ. Γούναρη 4

54621 Θεσ/νίκη

(Με απόδειξη)

2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

α) Δ/σεις Γεωργίας

Έδρες τους

β) Δ/σεις Εμπορίου

Έδρες τους

3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό

Ινστιτούτο

Τμήμα Ελέγχου

Γεωργικών Φαρμάκων

Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2 και το άρθρο 5 παρ.2 και 8.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας για «την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ Β., παρ.3.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ.140481/851/4-2-82 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6063 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο ομοίας σύνθεσης αλλά διαφορετικής περιεκτικότητας και μορφής γεωργικό φάρμακο ΒΙΤΑΒΑΞ 2Θ, DUST.
5. Τη με αριθ. 3396/3-11-98 (ΦΕΚ 1165/Β/9-11-98) απόφαση του κ.Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά».
6. Τις από 10-7-96, 10-10-96 και 26-11-98 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, το από 10-10-96 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου καθώς και το από 26-11-98 συμπληρωματικό πρωτόκολλο πληρότητας.

Αποφασίζουμε

- I.** Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 6743 στο γεωργικό φάρμακο (μυκητοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. **Εμπορικό όνομα:** VITAVAX 16,6/14,7 FS
 2. **Μορφή:** Εναιώρημα για επένδυση σπόρων (FS)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** carboxin 16,6% β/ο
thiram 14,7 % β/ο
βοηθητικές ουσίες: 71,22 % β/β
 4. **Καθαρότητα technicals** από τα οποία παρασκευάζεται: carboxin 97 % min
thiram 97 % min
 5. **Παρασκευαστής:** UNIROYAL CHEMICAL LTD, Καναδάς
 6. **Αντιπρόσωπος:** Κ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. Γούναρη 4 54621 Θεσ/νίκη
 7. **Τυποποιητής:** ELMIRA ONTARIO-Καναδάς
 8. **Συσκευαστής:** Ο τυποποιητής
 9. **Συσκευασία: 9α.Είδος-Μέγεθος:** Φιάλες 100 κ.εκ., 150 κ.εκ., 200 κ. εκ., 500 κ.εκ.
1 λίτρου, 5 λίτρων και 20 λίτρων.

9β.Υλικό: Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE).

10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση για απολύμανση σπόρων σποράς. Έχει χρώμα κόκκινο πορφυρό και εφαρμόζεται με επένδυση των σπόρων σποράς.

11.Τρόπος εφαρμογής:

Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαλυμένο σε λίγο νερό (slurry) ή αδιάλυτο ως έχει αναλόγως των μηχανών επένδυσης που διαθέτουμε και του είδους των σπόρων. Κατά την ετοιμασία της διάλυσης (στην περίπτωση επένδυσης με slurry) ανακατεύετε το διάλυμα συνεχώς επί δύο λεπτά πριν την έναρξη της επένδυσης. Χρησιμοποιείτε το διάλυμα μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του.

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση για την εφαρμογή, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες των κατασκευαστών των μηχανών επένδυσης ώστε να επιτυγχάνεται η προτεινόμενη δοσολογία εφαρμογής.

12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

13. Φάσμα δράσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ../100 κιλά σπόρου	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σιτάρι	Ριζοκτονίαση (Rhizoctonia solani) Φουζαρίωση (Fusarium spp.) Άνθρακες γυμνοί και καλυμένοι (Ustilago tritici, U. hordei) Σεπτορίωση (Septoria spp.) Δαυλίτης (Tilletia tritici)	230-330	Πριν τη σπορά.

Κριθάρι	Άνθρακες γυμνοί και καλυμένοι (Ustilago nuda, U. hordei) Ελμινθοσπορίωση (Helminthosporium spp.) Σεπτορίωση (Septoria spp.)	230-330	Πριν τη σπορά.
Καλαμπόκι	Ριζοκτονίαση (Rhizoctonia solani) Ελμινθοσπορίωση (Helminthosporium sp.) Φουζαρίωση (Fusarium moniliformae)	280	Πριν τη σπορά.
Ρύζι	Ελμινθοσπορίωση (Helminthosporium oryzae) Φουζαρίωση (Fusarium sp.)	450-550	Πριν τη σπορά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Να μην χρησιμοποιούνται οι επενδεδυμένοι σπόροι για τροφή ανθρώπων ή ζώων.
2. Στους σάκους που συσκευάζονται οι επενδεδυμένοι σπόροι, να αναγράφεται η φράση «οι σπόροι αυτοί είναι επενδεδυμένοι με carboxin και thiram
Να μην χρησιμοποιηθούν για τροφή ανθρώπων ή ζώων».

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν προκαλεί μείωση της βλαστικότητας των σπόρων στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

15. Συνδυαστικότητα:

Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα μυκητοκτόνα ή εντομοκτόνα επενδυτικά σπόρων.
Δεν συνδυάζεται με τα ισχυρώς αλκαλικά ή τα ισχυρώς όξινα σκευάσματα.

16. Σημάνσεις:-

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

(R52) Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

19 Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- (S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
(S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
(S24/25) Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

- (S26) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά τουλάχιστον.
- (S27) Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το σκεύασμα.
- (S28) Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
- (S36/37) Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- (SY8) Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 24 ώρες πριν και μετά την εργασία με το σκεύασμα, αυξάνει τις πιθανότητες κινδύνου.

20.Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλείτε εμετό.

Δώστε άφθονο νερό να πιεί ο ασθενής και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Δείξτε την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων :(01)7793777

21.Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

Μη ρυπαίνετε με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του επιφανειακά νερά και χαντάκια.

22.Απαγορεύσεις(A φράσεις):

23.Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών(Π φράσεις):

(Π3) Μη χρησιμοποιείτε σπόρους επενδεδυμένους με VITAVAX 16,6/14,7 FS σαν τροφή ή κτηνοτροφή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

24.Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό καλά αεριζόμενο και θερμοκρασία μικρότερη των 25°C.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 , παρ.1 του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2003.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ