

Αθήνα 3 - 7 - 1998
Αριθ.Πρωτ. 67954

Ταχ.Διεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5

Ταχ.Κωδ.: 10679 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 3617 571

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (ζιζανιοκτόνο)
PILOT 36 SL.

ΠΡΟΣ: 1. ΙΜΠΕΞΠΑ ΕΠΕ
Φυλής 232
11252 ΑΘΗΝΑ
(Με απόδειξη)
2. Δ/νσεις Γεωργίας
Εδρες τους
3. Δ/νσεις Εμπορίου
Εδρες τους
4.Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2,14561 Κηφισιά
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 "Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου γεωργικών φαρμάκων" και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2 και το άρθρο 5,παρ.8.
2. Τη με αριθ.85418/24.8.88 απόφασή μας (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) κεφ.Β παρ.1. για την "τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων".
3. Τη με αριθ.83345/28.7.88 απόφασή μας (ΦΕΚ 599/24.8.88) όσον αφορά τον "καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων," καθώς και το Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97).
4. Τη με αριθ.83712/14-4-89 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7469/95 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) P1TBULL 36 SL.
5. Τη με αριθ. 59929/98 απόφασή μας με την οποία ανακλήθηκε η έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνου) P1TBULL 36 SL.
6. Τη με αριθ. 358731/14-10-96 (ΦΕΚ. 939/Β/15-10-96) απόφαση του κ.Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για "ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ.Δ.Σωτηρή και Β.Γερανίδη".
7. Τις από 15-4-98 και 13-5-98 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 7530 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1.Εμπορικό όνομα: P1LOT
- 2.Μορφή: Υδατικό διάλυμα (SL)
- 3.Εγγραμμένη σύνθεση: glyphosate 36% β/ο, υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης βοηθητικές ουσίες: 67,75% β/β
- 4.Καθαρότητα του technical του Οίκου SANACHEM (PTY) LTD. - Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ : glyphosate 95% min.

Τόσο το technical, όσο και το σκεύασμα θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του FAO.

5.Παρασκευαστής:IMPEXPA ΕΠΕ -Φυλής 232,11252 ΑΘΗΝΑ

6.Αντιπρόσωπος:-

7.Τυποποιητής: SANACHEM (PTY) Ltd. Νότιος Αφρική

8.Συσκευαστής: ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

9.Συσκευασία: 9α.Είδος-Μέγεθος: -Φιάλες 250 500,600 κ.εκ. και
-Δοχεία 1 , 3 , 5 και 6 λίτρων.

9β.Υλικό:-Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Μεταφωτρωτική καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών, πλατύφυλλων και υδροχαρών ζιζανίων και της οροβάγχης του καπνού .

11. Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό στο στρέμμα, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια με το φύλλωμα ή τους τρυφερούς βλαστούς των καλλιεργειών.

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Υπό συνεχή ανάδευση προσθέστε το υπόλοιπο νερό. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύντε τα ρίχνοντας το νερό στο ψεκαστικό. Μη χρησιμοποιείτε δοχεία από γαλβανισμένο ή μη επενδεδυμένο χάλυβα για την παρασκευή ή την εφαρμογή του ψεκαστικού υλικού.

Να μη χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για την διάλυση του φαρμάκου.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./στρ.	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1.Καπνός	Οροβάγχη (Orobanch ramosa)	Δυο ψεκασμοί με α. 40 β. 60	40 ημέρες μετά την μεταφύτευση 60 ημέρες μετά την μεταφύτευση
2.Πολυετείς καλλιέργειες:	Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)	150-200	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στη ζωηρή βλάστηση.
-Αμπέλια (Σταφίδες, Οινοποιήσιμα, Επιτραπέζια) -Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρεϊπ-φρούτ, κίτρα) -Ελιές -Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά,	Πολυετή ζιζάνια Αγριάδα Βέλιουρας Περικοκλάδα Κύπερη	500-1000 750-1000 500 1000 1η 600 2η 500	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. Σε περίπτωση αναβλάστησης.

Κυδωνιά) -Αμυγδαλιά -Πυρηνόκαρπα (βερικοκκιά, ροδακινιά, Νεκταρινιά) (ηλικίας άνω των δύο ετών)	Φτέρη	500	Μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής.
3.Ετήσιες γραμμικές καλλιέργειες με υπέργειο βρώσιμο μέρος (Βαμβάκι, Καλαμπόκι, Καπνός)	>>	>>	Ως ανωτέρω, με κατευθυνόμενο ψεκασμό μεταξύ των γραμμών.
4.Αγροί μετά την συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά.	>>	>>	>>
5.Ακαλλιέργητες εκτάσεις.	Ετήσια και πολυετή ζιζάνια και ξυλώδεις θάμνοι δένδρα, βάτα κλπ.	500-1000	>>
6.Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών.	Υδροχαρή ζιζάνια	800-1000	Κοντά ή κατά την άνθιση των ζιζανίων.

Παρατηρήσεις.

1. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν, πριν τη συγκομιδή τους.
2. Να μη χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή.
3. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια:
Malva spp. (Μολόχες)
Urtica spp. (Τσουκνίδες).
Polygonum spp.(Πολυκόμπι, λαπάτσα)
Portulaca oleracea (Αντράκλα)
η δόση να κυμαίνεται από 400-600 κ.εκ./στρέμμα, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους (οι μεγάλες δόσεις σε μεγάλα ζιζάνια).
4. Για την αγριάδα η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκ.
5. Να μη γίνεται ψεκασμός εάν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.
6. Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα - SZ:
SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σπόρους.
SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
SZ5 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό. Πάρτε αυστηρές προφυλάξεις

να μη μολυνθούν γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

SZ6 Αν ρυπανθούν τα νερά αρδεύσεως, να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση.

SZ7 Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

SZ8 Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.

SZ9 Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

SZ10 Χρησιμοποιείτε μπέκ τύπου σκούπας.

SZ11 Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.

SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύντε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό.

14. Φυτοτοξικότητα:

Είναι τοξικό για όλες τις καλλιέργειες αν έλθει σε επαφή με το φύλλωμα ή τους τρυφερούς βλαστούς ή τους μη ξυλοποιημένους κορμούς των δένδρων.

15. Συνδυαστικότητα: Να μη συνδυάζεται με άλλα γεωργικά φάρμακα.

16. Σημάνσεις: Για τον άνθρωπο: Χί Ερεθιστικό.

17. Κίνδυνοι (R φράσεις):

R18 Μπορεί να αντιδράσει με σίδηρο και χάλυβα και να σχηματίσει εύφλεκτους ατμούς.

R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

RO2 Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

S24/25 Αποφύγετε επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί.

S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών και προσώπου.

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή (Δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Δεν έχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση δηλητηρίασης ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:(01)77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO2 Μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες.

SO5 Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη επιφάνεια για 14 ημέρες.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):--

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Π1 Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:

Πολυετείς καλλιέργειες: 28 ημέρες

Λοιπές καλλιέργειες: 21 ημέρες

Π2 Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες με εδώδιμο το υπόγειο μέρος τους πριν την συγκομιδή τους.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης παραμένει σταθερό για δύο χρόνια.

II. Κείμενο ετικέτας:

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22 παρ.1 του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Η τελική ετικέτα να προσκομισθεί στην υπηρεσία εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12.2002.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ. ΣΩΤΗΡΛΗΣ