



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 26-3-2008

Αριθ. πρωτ.: 117425

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11
E-mail: svg046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: 1. ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γληνού 32
54249-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γεν. Γραμ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Γραφείο Γενικού Διευθυντή
Φυτικής Παραγωγής
4) Μ.Φ.Ι. (με e-mail)
5) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους (με e-mail)
6) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους (με e-mail)
7) Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/σής μας

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(ακαρεοκτόνο) VIVARO"

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ Α'/104/30.5.97) «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα τα άρθρα 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ Β'/674/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β' (παρ. 1).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ Β'/599/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων».
4. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 66815/24.2.88 Απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 2050 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ακαρεοκτόνο) APOLLO, το οποίο περιέχει την ίδια δραστική ουσία και έχει την ίδια περιεκτικότητα και μορφή.
6. Το με αριθ. 123951/14.6.2005 έγγραφό μας, στο οποίο αναφέρονται τα εθνικά ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας clofentezine στα τρόφιμα.
7. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α').
8. Τη με αριθ. 263545/4.1.2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18.1.2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με "Εντολή Υπουργού"
9. Τις από 24-7-2007, 13-12-2007, 6-12-2007, 23-1-2008 και 03-03-2008 αιτήσεις της εταιρείας ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε., καθώς και το από 03-03-2008 πρωτόκολλο εξέτασης φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε στην εταιρεία ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε., οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **2152** του φυτοπροστατευτικού της προϊόντος (ακαρεοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** VIVARO
- 2. Είδος (μορφή) σκευάσματος:** Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** Clofentezine 50% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 56,3% β/β
- 4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 97% min.
- 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** KINGTAI CHEMICALS CO., LTD, Κίνας.
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: KINGTAI CHEMICALS CO., LTD, Κίνας. (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε., Δ. Γληνού 32, 542 49 - Θεσσαλονίκη.
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: ---
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε. Δ. Γληνού 32, 542 49 - Θεσσαλονίκη.
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε., Δ. Γληνού 32, 542 49 - Θεσσαλονίκη.
- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** CHEMIA S.p.A., Ιταλία. (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
- 9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** CHEMIA S.p.A., Ιταλία. (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
β. Συσκευασίες: Είδος-Μέγεθος: Φιάλες των 60, 100, 150, 300 και 450 κ.εκ
- **Υλικό:** HDPE.
- 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:** Ακαρεοκτόνο επαφής με δράση στα αυγά και τις νεαρές προνύμφες των PANONYCHUS ULMI, P. CITRI και TETRANYCHUS SPP.
- 11. Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.
- 12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**
-Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού.
-Ανακινήστε το σκεύασμα καλά και αναδεύοντας προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος.
-Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
- 13. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./100 λιτ. νερό	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ Λίτρα/στρέμμα	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ. /στρέμμα	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/τική περίοδο.
Μηλοειδή Μηλιά Αχλαδιά	Χειμερινά αυγά του κόκκινου τετράνυχου πρίν την εκόλαση τους. (<i>Panonychus ulmi</i>) Κινητές μορφές κόκκινου τετράνυχου (<i>Panonychus ulmi</i>) και άλλων τετρανύχων (<i>Tetranychus spp</i>)	30 κ.εκ. 30 κ.εκ. + ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο στα 2/3 της δόσης	200-250	60-75 60-75 κ.εκ. + Ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο στα 2/3 της δόσης	Εφαρμόζεται από το φούσκωμα των οφθαλμών μέχρι το στάδιο της ρόδινης/λευκής κορυφής Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές. (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο)	2

Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά Βερικοκιά Δαμασκηλιά	Χειμερινά αυγά του κόκκινου τετράνυχου πρίν την εκόλαση τους. (<i>Panonychus ulmi</i>) Κινητές μορφές κόκκινου τετράνυχου (<i>Panonychus ulmi</i>) και άλλων τετρανύχων (<i>Tetranychus spp</i>)	30 κ.εκ. 30 κ.εκ. + ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο στα 2/3 της δόσης	200-250	60-75 60-75 κ.εκ. + Ακμαιο- κτόνο ακαρεο- κτόνο στα 2/3 της δόσης	Στο φούσκωμα των οφθαλμών Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές. (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο)	2
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά Μανταρινιά Λεμονιά Γκρεϊπ φρουτ Φράππα	Τετράνυχτοι (<i>Panonychus citri</i> , <i>Tetranychus spp</i>)	30 κ.εκ. + ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο στα 2/3 της δόσης	200-400	60-120	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές. (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο)\ (1)	1
Αγγούρι- κολοκύθι	Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus spp</i>)	30 κ.εκ. + ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο στα 2/3 της δόσης	50-80	15-24	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές. (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο) (1)	1
Βαμβάκι	Κηλιδωτός τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	40 κ.εκ. /στρέμμα + ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο στα 2/3 της δόσης	50-80	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές. (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο) (1)	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Το VIVARO 50SC χρησιμοποιείται μόνο μία φορά το χρόνο στην ίδια καλλιέργεια. Αν ο ψεκασμός γίνει νωρίς, στην περίοδο της νέας βλάστησης, απαλλάσσεται η καλλιέργεια από τις θερινές επεμβάσεις και παράλληλα επιτρέπεται η αύξηση των πληθυσμών των ωφέλιμων ακάρεων και εντόμων.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

15. Συνδυαστικότητα:

Συνδυάζεται με ακμαιοκτόνα ακαρεοκτόνα. Δεν συνδυάζεται με ακαρεοκτόνα που περιέχουν τη δραστική ουσία hexythiazox και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, την ίδια καλλιεργητική περίοδο, στις καλλιέργειες που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί το hexythiazox, και αντίστροφα.

Δεν συνδυάζεται με ισχυρώς αλκαλικά σκευάσματα.

16. Σημάνσεις: ----

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R-φράσεις): ---

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO-φράσεις και R-φράσεις):

R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς . Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία:

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.

S56- Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων

S59- Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/ προμηθευτή για ανάκτηση/ ανακύκλωση

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία , καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO και S φράσεις):

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις:

A1 Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π-φράσεις):

Π1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Εσπεριδοειδή: 35 μέρες

Βερικοκιά: 49 μέρες

Κολοκύθι, αγγούρι: 4 μέρες

Λοιπές καλλιέργειες: 49 μέρες

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

II. Ετικέτα:

α) Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/97, την Οδηγία 1999/45 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με την παρούσα Απόφαση.

β) Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.

β. Πριν τη λήξη της έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ

