



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 22 - 1 - 2003

Αριθ. πρωτ.: 90391

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδ.: 101 64-ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 36 17 103
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 212 45 08

ΠΡΟΣ: 1. INTRACHEM ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

Κηφισίας 31
115 23 - ΑΘΗΝΑ

(με απόδειξη)

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

α) Διευθύνσεις Γεωργίας

Έδρες τους

β) Διευθύνσεις Εμπορίου

Έδρες τους

3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό

Ινστιτούτο

Τμήμα Ελέγχου

Γεωργικών Φαρμάκων

Εκάλης 2, 145 61-Κηφισιά

4. Τμήματα Β, Γ και Ε Δ/σης μας

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (φερομόνη ανίχνευσης πλη-
θυσμού εντόμων) STORGARD-
-LASIODERMA SERRICORNE (CB) "

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. 2) και 5 (παρ. 2 και 8).
2. Τη με αριθ. 83345/28.7.1988 (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15.5.97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97) Προεδρικό Διάταγμα.
3. Τη με αριθ. 141017/24.1.84 Υπουργική Απόφαση σχετική με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας σε φερομόνες ανίχνευσης πληθυσμού εντόμων.
4. Τη γνωμοδότηση για το 5^ο θέμα της 5^{ης}/7.6.89 Συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ).
5. Το με αριθ. 317/3.12.2001 έγγραφο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
6. Τη με αριθ. 399580/30.10.2001 (ΦΕΚ 1479/Β/31.10.2001) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη".
7. Τις από 18-12-2001, 29-8-2002, 16-9-2002 και 22-10-2002 σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 16-9-2002 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **9051** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φερομόνη ανίχνευσης πληθυσμού εντόμων) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1.Εμπορικό όνομα: STORGARD – LASIODERMA SERRICORNE (CB).

2.Μορφή: Κάψουλα από καουτσούκ, εμποτισμένη με τη φερομόνη του εντόμου LASIODERMA SERRICORNE.

3.Εγγυημένη σύνθεση: serricornin 0,83% β/β.
βοηθητικές ουσίες: 99,17% β/β

4.Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται: 100%.

5.Παρασκευαστής: TRECE INCORPORATED, 1031 Industrial Street, Suite C, Salinas, CA 93901, Η.Π.Α.

6.Αντιπρόσωπος: INTRACHEM ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε., Κηφισίας 31, 115 23 – Αθήνα.

7.Τυποποιητής: Ο παρασκευαστής.

8.Συσκευαστής: Ο παρασκευαστής.

9.Συσκευασία: 9α. Είδος-Μέγεθος: Κάψουλες από καουτσούκ εμποτισμένες με τη φερομόνη. Κάθε κάψουλα φέρεται σε σφραγισμένα αεροστεγώς φύλλα αλουμινόχαρτου. Οι κάψουλες διατίθενται μαζί με τις παγίδες με τις οποίες εφαρμόζονται, σε ενιαία συσκευασία χαρτοκυτίου. Κάθε κουτί περιέχει: -5 χάρτινες παγίδες τύπου DISCREET που αποτελούνται από δύο τμήματα η κάθε μία (βάση και κάλυμμα) και -5 κάψουλες

9β Υλικό: Καουτσούκ.

10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:

Φερομόνη παρακολούθησης πληθυσμού του εντόμου Lasioderma serricorne (σκαθάρι του καπνού) σε καπναποθήκες. Χρησιμοποιείται εντός παγίδας.

11.Τρόπος εφαρμογής:

Χρησιμοποιούνται με την επίβλεψη γεωπόνου.

Οι παγίδες συναρμολογούνται σύμφωνα με το σχήμα που εσωκλείεται στη συσκευασία.

Οι κάψουλες τοποθετούνται απ' ευθείας πάνω στην προσκολλητική ουσία των τοιχωμάτων της παγίδας.

Ανάρτηση: Διπλώνεται το κάλυμμα (κέλυφος) στήριξης της παγίδας, όπως δείχνεται στο σχήμα και στερεώνεται στο σημείο που έχει επιλεγεί πάνω στον τοίχο της καπναποθήκης σε ύψος 1,80 μ. περίπου από το δάπεδο.

Διπλώνεται η παγίδα με την προσκολλητική ουσία επί της οποίας είναι τοποθετημένη η κάψουλα και εισάγεται κάτω από το κάλυμμα.

Κάθε παγίδα καλύπτει αποθηκευτικό χώρο 500 m³.

Πυκνότητα τοποθέτησης παγίδων:

Σε αποστάσεις 10 – 15 μέτρων μεταξύ τους.

Συχνότητα λήψης παρατηρήσεων:

Μία φορά την εβδομάδα μετριοούνται και καταγράφονται τα έντομα που συλλαμβάνονται στις παγίδες.

Δύο φορές την εβδομάδα γίνεται μέτρηση, όταν αναμένεται έξαρση του πληθυσμού των εντόμων.

Συντήρηση παγίδων:

Μετά από κάθε παρατήρηση αφαιρούνται τα έντομα και τα κατάλοιπά τους. Εάν η προσκολλητική βάση της παγίδας έχει χάσει τη κολλητικότητά της (λόγω σύλληψης μεγάλου αριθμού εντόμων), αντικαθίσταται.

Σε περιπτώσεις μεγάλων πληθυσμών (όπου οι προσκολλητικές βάσεις αντικαθίστανται συχνά λόγω μείωσης της κολλητικότητάς τους), οι κάψουλες μπορούν να τοποθετηθούν διαδοχικά σε

4 προσκολλητικές βάσεις ανά μήνα (χωρία να αντικατασταθούν), διότι παραμένουν ελκυστικές επί 1 μήνα.

Αντικατάσταση ελκυστικής ουσίας:

Η κάψουλα με την εντομοελκυστική ουσία αντικαθίσταται κάθε μήνα. Κατά την αντικατάστασή τους οι χρησιμοποιημένες κάψουλες πρέπει να απομακρύνονται από τις καπναποθήκες.

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: -----

13. Φάσμα δράσης (καλλιέργεια, εχθροί, δόσεις, χρόνος και τρόπος εφαρμογής):

Αποθηκευμένα καπνά. Ανίχνευση πληθυσμού του εντόμου *Lasioderma serricorne* (σκαθάρι του καπνού) σε καπναποθήκες.

Τρόπος εφαρμογής-δόσεις: Βλέπε παρ. 11.

Παρατηρήσεις:

-Η εφαρμογή των παγίδων και η αξιολόγηση των δεδομένων που συλλέγονται, γίνεται με τη βοήθεια και επίβλεψη γεωπόνου.

-**ΠΡΟΣΟΧΗ:** οι κάψουλες να μην τοποθετούνται σε παγίδες που έχουν χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση πληθυσμού άλλων εντόμων. Επίσης οι παγίδες που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη χρήση, δεν πρέπει στη συνέχεια να χρησιμοποιούνται για ανίχνευση πληθυσμών άλλων εντόμων.

14. Φυτοτοξικότητα: -----

15. Συνδυαστικότητα: -----

16. Σημάνσεις τοξικότητας: -----

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): -----

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις): -----

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 -Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

S8/9 -Φυλάξτε το σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

S13 -Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 -Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

S35 -Καταστρέψτε τα κενά κουτιά συσκευασίας με κάψιμο.

SY8 -Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τη χρήση.

20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

-Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Αν υπάρξει ερεθισμός, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

-Αν προκληθεί ερεθισμός στο δέρμα πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει συμβουλευτείτε δερματολόγο.

-Σε περίπτωση που καταποθούν κάψουλα/ες, χορηγήστε στον παθόντα νερό και καλέστε γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις): -----

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

- Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23.Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (II φράσεις): -----

24.Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Συνιστάται να διατηρείται στο ψυγείο, σε θερμοκρασία 5° C.

Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Στην κατάψυξη (σε θερμοκρασία -10° C) διατηρείται για πέντε (5) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Πριν από τη διάθεσή του σκευάσματος στην Ελληνική Αγορά, να προσκομιστεί στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα του.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2007**.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ