



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 12-7- 1999

Αριθ. Πρωτ.: 100586

**Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας : 101 64 ΑΘΗΝΑ**

TELEFAX: 3617103

**Πληροφορίες: Α.Φονταρά
Τηλέφωνο: 5291411**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο γεωργικό
φάρμακο (μυκητοκτόνο)
DODYLON 65 WP**

**ΠΡΟΣ: 1) Παπαοικονόμου Αγροχημικά ΑΒΕΕ
Τ.Θ. 89, ΒΙ.ΠΕ.Θ.
57022 Σίνδος Θεσ/νίκη
(Με απόδειξη)
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά**

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ.8.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» καθώς και το με αριθ. 115/5-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 90936/7-10-87 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6683 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιο με το αιτούμενο γεωργικό φάρμακο MELPREX 65 WP.
5. Τη με αριθ. 3396/3-11-98 (ΦΕΚ 1165/Β/9-11-98) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά».
6. Τις από 16-9-98 και 15-3-99 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 15-3-99 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 6775 στο γεωργικό φάρμακο (μυκητοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. **Εμπορικό όνομα:** DODYLON 65 WP
 2. **Μορφή:** Βρέξιμη σκόνη (WP)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** dodine 65 % β/β
βοηθητικές ουσίες 33 % β/β
 4. **Καθαρότητα Technical** από το οποίο παρασκευάζεται: 97 % min.
 5. **Παρασκευαστής:** Παπαιοκονόμου Αγροχημικά ABEE, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Τ.Θ. 89, 57022 Σίνδος
 6. **Αντιπρόσωπος :** -
 7. **Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής
 8. **Συσκευαστής:** Ο παρασκευαστής
 9. **Συσκευασία :** **9α. Είδος - Μέγεθος:** α1. Σακούλα μέσα σε κουτί 800 γραμ. και 1 κιλού
α2. Σακούλα τυπωμένη 800 γραμ. και 1 κιλού.
9β. Υλικό: β1. Σακούλα PE, κουτί χάρτινο.
β2. Σακούλα από PE+πολυεστέρα (πάχους 120 μ)
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**
Τοπικά διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση. Ειδικό για το Φουζικλάδιο Μηλιάς και Αχλαδιάς.
11. **Τρόπος εφαρμογής :** Ψεκασμοί καλύψεως μέχρις απορροής.
12. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Να αποφεύγεται η χρήση σκληρού νερού.

13. Φάσμα δράσης.

Καλλιέργειες	Ασθένειες	Δόσεις γρ./100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκαστικού υγρού λίτρα/στρέμμα	Χρόνος εφαρμογής
Μηλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)	60 (προληπτικά) 90-100 (θεραπευτικά)	100-200	Οι ψεκασμοί αρχίζουν από τη στιγμή που σκάζουν τα μάτια (πράσινη κορυφή) και συνεχίζονται μέχρι πλήρους σχηματισμού των καρπών. Από το στάδιο αυτό και μετά οι ψεκασμοί αραιώνουν.
Αχλαδιά Μουσμουλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia pirina</i> , <i>Venturia eriobotryae</i>)	90 (προληπτικά) 100-120 (θεραπευτικά)	100-200	Οι ψεκασμοί αρχίζουν από τη στιγμή που σκάζουν τα μάτια (πράσινη κορυφή) και συνεχίζονται μέχρι πλήρους σχηματισμού των καρπών. Από το στάδιο αυτό και μετά οι ψεκασμοί αραιώνουν.

Κερασιά Βυσσινιά	Ανθράκνωση (Gnomonia erythrostoma, Coccomyces hiemalis)	80-100	150-250	Ένας ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
Ελιά	Κυκλοκόνιο (Spilocaea oleagina)	100	150-300	2 ψεκασμοί: Ο πρώτος πριν την έναρξη των φθινοπωρινών βροχών και ο δεύτερος κατά το τέλος του χειμώνα πριν το κλάδεμα.
	Γλοιοσπόριο (Gloeosporium olivarium)	100	150-300	1-2 ψεκασμοί λίγο πριν την έναρξη αλλαγής του χρώματος του ελαιοκάρπου.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Μηλιά 2, Αχλαδιά-Μουσμουλιά 2, Κερασιά-Βυσσινιά 1, Ελιά 2.

Παρατηρήσεις:

1. Για τη Μηλιά θεραπευτικά το πολύ 48 ώρες μετά την έναρξη της βροχής, εφόσον δημιουργούνται συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.
 2. Η δράση του στην καταπολέμηση του Κυκλοκόνιου και Γλοιοσπόριου της Ελιάς είναι μέτρια.
14. **Φυτοτοξικότητα:**
Να μην ψεκάζεται σε αχλαδιές και μηλιές κατά τη διάρκεια της άνθησης ή αμέσως μετά την πτώση των πετάλων, εάν ο καιρός είναι πολύ ψυχρός (<5°C).
Μπορεί να προκαλέσει εσχάρωση στην ποικιλία μηλιάς Golden Delicious.
15. **Συνδυαστικότητα:**
Δεν συνδυάζεται με ασβέστιο, Θερινό ή Χειμερινό πολτό και γενικά πολύ αλκαλικά σκευάσματα.
16. **Σημάνσεις:** Xi, Ερεθιστικό.
17. **Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**
R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών.
18. **Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):**
RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.
RO5 Τοξικό για τα ψάρια.
19. **Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**
S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.
S22 Μην αναπνέετε τη σκόνη.
S25 Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια.
S35 Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας με τρύπημα. Η χρήση τους για οποιοδήποτε σκοπό είναι επικίνδυνη.
SY1/4 Φοράτε φόρμα, μπότες, γάντια, και γυαλιά όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.

SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

S43 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή την ετικέτα όπου είναι δυνατόν.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, κρατήστε τα ανοικτά και πλύντε τα με άφθονο νερό, συνέχεια, για 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αποφύγετε το αλκοόλ.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777

Γιατροί: Σε περίπτωση κατάποσης, διενεργήστε πλύση στομάχου. Θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 15 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες.

Προσοχή: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων και για το περιβάλλον.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρήστε το κλειστό, στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και σκιερό. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 , παρ.1 του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2003.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ