



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 20-6-2006

Αριθ. Πρωτ.: 118080

**Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας : 176 71 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Φονταρά
Τηλέφωνο: 210-9287227**

FAX: 210-9212090

**ΠΡΟΣ: 1) Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20
151 25 Μαρούσι
(Με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.: 1) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά**

2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

Έδρες τους

**3) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)**

Έδρες τους

**4) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής
μας**

5) Γραμματεία της Δ/σής μας

**ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν,
(μυκητοκτόνο) BAYFIDAN 312 SC**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3).
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β, παρ.4.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 79220/12-6-1992 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6548 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο μικρότερης περιεκτικότητας και διαφορετικής μορφής από το αιτούμενο σκεύασμα, BAYFIDAN 250 EC.

6. Τη με αριθ. 91923/23-1-2003 (ΦΕΚ 101/Β/30-01-03) ΚΥΑ όσον αφορά τα «Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων (abamectin, azocyclotin, bioresmethrin, bifenthrin, bitertanol, bromopropylate, clofentezine, cyromazine, cyhexatin, fenpropimorph, flucythrinate, hexaconazol, metacrifos, myclobutanil, penconazole, prochloraz, profenofos, resmethrin, tridemorph, triadimefon και triadimenol), επί και εντός προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης, σε εναρμόνιση προς την οδηγία **2002/79/ΕΚ** της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 2002».
7. Τη με αριθ. 100994/30-4-04 (ΦΕΚ 709/Β/13-5-2004) απόφασή μας για την «τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν σαν δραστική ουσία triadimenol, ως προς το φάσμα δράσης».
8. Τη με αριθ. Υ 132/11-10-2004 (Β'1533/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
9. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (Β'1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υφυπουργού”».
10. Τις από 15-3-2005 και 19-4-2006 αιτήσεις της εταιρείας Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, καθώς και το από 19-4-2006 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **60.058** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο), με τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. **Εμπορικό όνομα:** BAYFIDAN
 2. **Μορφή:** Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** triadimenol 31,29 % β/ο
βοηθητικές ουσίες : 71,2 % β/β
 4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 97 % min.
 - 5 **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Bayer CropScience AG – Γερμανίας
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο Bayer CropScience AG – Γερμανίας. (Η διεύθυνση του Εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο triadimenol, όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (Εντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης, με ημερομηνία 15-3-05 (αρ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 122096) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
 - 6 **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Bayer CropScience AG, Γερμανίας
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Bayer CropScience AG, Γερμανίας
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Bayer CropScience AG, Γερμανίας
 9. **α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Ύπατο, Θηβών.
β. Συσκευασία: β1. Είδος - Μέγεθος: Φιάλες 100, 200, 250, 500 κ.εκ. και 1 λίτρο
β2. Υλικό : HDPE
Σύνολο συσκευασιών: Πέντε (5)
 10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:**
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση.
 11. **Τρόπος εφαρμογής :** Ψεκασμοί φυλλώματος.
 12. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**
-Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού.

-Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ/ΚΟΥ ΥΓΡΟΥ λίτρα/στρ.	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./στρέμ.	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλ/τική περίοδο	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά	Ωίδιο (<i>Podospaera leucotricha</i>)	8	200	16	4	Εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, εφαρμογές στα στάδια πράσινης, ρόδινης κορυφής και πτώσης των πετάλων.
Αμπέλι	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>)	8-16	150	12-24	2	Εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, εφαρμογές: -όταν οι βλαστοί αποκτήσουν 2-3 φύλλα και -κατά την άνθηση.
Τομάτα, Πιπεριά	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica, Oidium lycopersicum</i>)	24-32	100	24-32	3	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες.
Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Κολοκύθες, Καρπούζι	Ωίδιο (<i>Erysiphe sp., Sphaerotheca sp.</i>)	8-16 8-16	200 100	16-32 8-16	3	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες
Αγκινάρα	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica, Oidium cynarae</i>)	24-32	100	24-32	1	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.
Σιτάρι, Κριθάρι	Ωίδιο (<i>Erysiphe graminis</i>)	40	60	24	1	Περί το τέλος αδελφώματος-αρχή καλαμώματος, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.

	Σκωριάσεις (<i>Puccinia</i> <i>spp.</i>)	40		24		Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.
--	--	----	--	----	--	---

Παρατηρήσεις:

- Συνιστάται για λόγους αποφυγής ανάπτυξης ανθεκτικότητας η εφαρμογή του να γίνεται σε μίγμα με μη διασυστηματικό, προστατευτικό μυκητοκτόνο (επαφής).
- Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.
- Στις καλλιέργειες αμπέλι, μηλιά, και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
- Στο αμπέλι, η εφαρμογή του πρέπει απαραίτητα να εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα επαφής και οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μη ξεπερνούν τις δύο (2) ανά καλλιεργητική περίοδο.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στη συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

15. Συνδυαστικότητα: -

16. Σημάνσεις: -

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):-

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R & RO φράσεις):

R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

(S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

(S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

Απομακρυνθείτε από τη ζώνη κινδύνου. Εάν ο πάσχων έχει συμπτώματα λιποθυμίας, μεταφέρετέ τον και τοποθετήστε τον σε σταθερή πλευρική θέση.

Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν βραχεί με το σκεύασμα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα με άφθονο νερό και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και καλέστε αμέσως γιατρό.

Για το γιατρό: δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Πλύση στομάχου, μετά φαρμακευτικός άνθρακας (carbo medicalis) και θειικό Νάτριο.

Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210)-7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S & SO φράσεις) :

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση των κενών μέσω συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες), ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγούμενος, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις) : Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών: (Π φράσεις):

(ΠΙ) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι: 35 ημέρες

Σιτάρι, κριθάρι: 30 ημέρες

Μηλιά, Τομάτα, Πιπεριά, Κολοκυνθοειδή, Αγκινάρα: 15 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2010.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ