



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 17 – 3 - 2003

Αριθ. πρωτ.: 95884

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 36 17 103
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 21 24 508

ΠΡΟΣ: 1. ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε.
1^ο χιλ. Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας-Βέροιας
Τ.Θ. 45
593 00 - Αλεξάνδρεια
(με απόδειξη)
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Διευθύνσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση προσωρινής
έγκρισης κυκλοφορίας
στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (εντομοκτόνο)
ROTENA 6 EC "

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2538/97 (ΦΕΚ 242/Α/1.12.97) και ειδικότερα το άρθρο 1 (παρ. 2α).
2. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15.5.97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97) Π.Δ.
3. Τις από 23-12-2002 και 7-3-2003 σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας διάρκειας τεσσάρων (4) ετών με αριθμό 1981 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) ROTENA 6 EC με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: ROTENA 6 EC
2. Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα (EC).
3. Εγγυημένη σύνθεση: rotenone 6,24% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 94 % β/β.
4. Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται το σκεύασμα: 98% min.
5. Παρασκευαστής: Serbios S.r.l., Via XXIV Maggio 59, 45021 Polesine-Rovigo (Ιταλίας).

- 6. Αντιπρόσωπος:** EYΡΩΦΑΡΜ ΑΕ., Αλεξάνδρεια Βέροιας.
- 7. Τυποποιητής:** Saphyr, Z.I des Terriers 06600, Antibes (Γαλλίας).
- 8. Συσκευαστής:** Saphyr, Z.I des Terriers 06600, Antibes (Γαλλίας).
- 9. Συσκευασία:** α) Είδος-Μέγεθος: Φιάλες των **500, 600, 1000** και **1200** κ.εκ.
β) Υλικό: i) COEX, ii) Σύμμεικτο υλικό από αλουμίνιο-κασσίτερο.
- 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται–Τρόπος δράσης:** Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, με βάση τη ροτενόνη (φυσικό μόριο που εξάγεται από τροπικά φυτά).
- 11. Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να έχει αναδευτεί καλά πριν αρχίσει ο ψεκασμός.
- 12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**
Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Υπό συνεχή ανάδευση προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	Δόσεις (κ.εκ./100 λίτρα νερό)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά, αχλαδιά	-Αφίδες (Aphis sp)	250-300	Με την εμφάνιση των εντόμων. Επανάληψη εφαρμογής (αν χρειαστεί) μετά από 10-12 ημέρες.
Ροδακινιά	-Πράσινη αφίδα (Myzus persicae)	250-300	>>
Κερασιά	-Αφίδες (Aphis sp.)	250-300	>>
Τομάτα, μελιτζάνα	-Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata)	250-300	>>
Πατάτα	-Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata)	250-300	>>
Καλλωπιστικά	-Αφίδες (Aphis sp.)	250	>>

Παρατηρήσεις:

- Η εφαρμογή του σκευάσματος είναι προτιμότερο να γίνεται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί.
- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: πέντε (5) εφαρμογές.
- Όγκοι ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:
Μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά, κερασιά: 150-250 λίτρα.
Τομάτα, μελιτζάνα, πατάτα, καλλωπιστικά: 250 λίτρα.

14. Φυτοτοξικότητα:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις δόσεις και οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

15. Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα και με οξειδωτικές ουσίες.

16. Σημάνσεις Τοξικότητας: Xn – επικίνδυνο, Xi – ερεθιστικό.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R22 -Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.

R36 -Ερεθίζει τα μάτια.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

RO2 -Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες.

RO4/RO7 -Πολύ τοξικό για τα ψάρια και γενικώς τους υδρόβιους οργανισμούς.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 -Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 -Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 -Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.

S24/25 -Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

S36/37/39 -Φοράτε φόρμα, μπότες, γάντια, μάσκα και γυαλιά, όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.

S45 -Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.

20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης:

Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Πλύντε τα αμέσως ρίχνοντας άφθονο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα και πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε. Αν παρουσιαστεί ερεθισμός ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής:

Απομακρύνετε τον παθόντα από την περιοχή που εφαρμόστηκε το σκεύασμα. Εάν υπάρχει αναπνευστικό πρόβλημα ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO2 -Μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες.

SO3 -Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): -Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π-φράσεις):

(Π1) -Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 10 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες.

24. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από φωτιά και πηγές ανάφλεξης.

Δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C.

Σε αυτές τις συνθήκες, το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

II. Ετικέτα:

α. Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 (παρ.1) του Ν.721/77 και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα προσωρινή έγκριση ισχύει μέχρι 17-3-2007.

IV. Η εταιρεία ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. υποχρεούται να ενημερώνει τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για την ποσότητα και την περιοχή που θα χρησιμοποιείται το σκεύασμα τον πρώτο μήνα μετά την εφαρμογή του κάθε χρόνο και να αναφέρει κάθε παρατήρηση φαινομένων που έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω έγκριση.

V. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και τις τυχόν παρενέργειές του ανήκει στην εταιρεία ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

E. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ