



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 5-5-2008

Αριθ. Πρωτ.: 118392

**Ταχ.Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα
FAX: 210-92 12 090
Πληροφορίες: Α. Φονταρά
Τηλέφωνο: 210-9287227**

**ΠΡΟΣ: Basf Agro Ελλάς ΑΒΕΕ
Αιγιάλειας 48, Παράδεισος
151 25 Μαρούσι, Αθήνα
(Με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γ. Γρ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης
(με e-mail), Έδρες τους
6) Τμήματα Β, Γ & Ε της Δ/σής μας
7) Γραμματεία της Δ/σής μας**

**ΘΕΜΑ: “Ανανέωση της έγκρισης
του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (μυκητοκτόνο)
DELAN 50 SC και τροποποίησή
της, ως προς το φάσμα δράσης.”**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-1997 (Α'104/30-5-1997) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 4, (παρ. 4 και 6) και το άρθρο 8, (παρ. 2 και 3).
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 149/2008 της Επιτροπής της 29-1-2008 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων II, III και IV για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα I του κανονισμού».
3. Το Π.Δ. 206/2007 / (ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Έντολή Υπουργού”».
5. Την από 21-12-2005 αίτηση της εταιρείας Basf Agro Ελλάς ΑΒΕΕ για την ανανέωση της έγκρισης του σκευάσματός της DELAN 50 SC.

Αποφασίζουμε

I. Ανανεώνουμε για μία πενταετία από **1-1-2006** έως **31-12-2010** τη με αριθμό **6635** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο), **DELAN 50 SC** (dithianon 50% β/ο), παρασκευής της εταιρείας BASF Agro B.V., Ελβετία, η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία Basf Agro Ελλάς ABEE με τη με αριθ. 70666/11-4-1996 απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα (ανανεώθηκε με την αριθ. 97197/29-5-2001 /ΦΕΚ 741/Β/13-6-2001 απόφασή μας, έως τις 31-12-2005 και τροποποιήθηκε με την αριθ. 99355/4-6-2002 απόφασή μας).

II. Τροποποιούμε την ανωτέρω έγκριση, ως προς το **φάσμα δράσης**, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./100 λίτρα νερό	Όγκος Ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./στρ.	Μέγ. αριθμός εφαρμ. ανά καλλιεργ περίοδο	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis V.pirina</i>)	120 (πριν την άνθηση) 75 (μετά την άνθηση)	100-200	120-240 75-150	4	Πράσινη κορυφή, ρόδινη κορυφή, πτώση πετάλων, 10-15 ημέρες αργότερα, (καρπίδιο).
	Φαιά σήψη (<i>Monilinia spp.</i>)	100-150		100-300		Κατά την έκπτυξη των οφθαλμών. λευκή ή ρόδινη κορυφή, πλήρη άνθηση.
	Σήψεις καρπών (<i>Gloeosporium spp. Physalospora spp.</i>)	100-150		100-300		Εφαρμογές το καλοκαίρι 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.
Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά	Φαιά σήψη (<i>Sclerotinia laxa</i>)	140	150	210	2	Δύο εφαρμογές: στη ρόδινη κορυφή και στην άνθηση.
		50		75		
Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά,	Κορύνεο (<i>Stigmina carrophila</i>)	120-140	150	180-210		Δύο εφαρμογές: μία το φθινόπωρο (πτώση 75% των φύλλων)

Κερασιά, Δαμασκηλιά		50	150	75		ή το χειμώνα (πριν τη διόγκωση των οφθαλμών) και η δεύτερη την άνοιξη στην έναρξη της βλάστησης.
Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά	Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i> , <i>Taphrina pruni</i>)	120-140	150	180-210		Μια εφαρμογή κατά την περίοδο του χειμερινού λήθαργου και οπωσδήποτε πριν από τη διόγκωση των οφθαλμών.
Κερασιά, Δαμασκηλιά		50	150	75		
Αμπέλι	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	120-150	50-100	60-150	4	Εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.
	Φώμοψη (<i>Phomopsis viticola</i>)	150		75-150		Έκπτυξη οφθαλμών, αμέσως μετά το σχηματισμό του 1ου φύλλου, στάδιο 2-3 φύλλων.
Λυκίσκος	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)	90-150	250	225-375	4	α. Όταν οι βλαστοί ευρίσκονται στα 3/4 της διαδρομής των επί των υποστηριγμάτων β. Όταν οι βλαστοί φθάσουν στην κορυφή των υποστηριγμάτων. γ. Λίγο πριν την άνθηση, και δ. Αμέσως μετά την άνθηση.
Χρυσάνθεμο Τριανταφυλλιά	Σεπτορίωση (<i>Septoria spp.</i>) Μελανή κηλίδωση φύλλων (<i>Diplocarpon rosae</i>)	150	50-100	75-150		Προληπτικές εφαρμογές και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες, ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:
Μηλοειδή 4, Πυρηνόκαρπα 2, Αμπέλι 4, Λυκίσκος 4.

Παρατηρήσεις

-Στο φουζικλάδιο εκτός από προστατευτικά δρα και θεραπευτικά εφόσον χρησιμοποιηθεί εγκαίρως μέσα σε 48 ώρες από τη μόλυνση (δηλαδή από τη βροχή που την προκαλεί).

-Στις καλλιέργειες μηλοειδή, αμπέλι και πυρηνόκαρπα να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

-Δεν διασπάται εύκολα γι' αυτό μετά τους πρώιμους ψεκασμούς να εφαρμόζονται οι μικρές δόσεις, γιατί υπάρχουν ακόμη υπολείμματα του φαρμάκου πάνω στο φύλλωμα των φυτών.

II. Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 149/2008.

III. Το κείμενο ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα απόφαση.

IV. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύουν οι με αριθ. 70666/11-4-1996, 97197/29-5-2001 (ΦΕΚ 741/Β/13-6-2001) και 99355/4-6-2002 αποφάσεις μας, όπως ισχύουν σήμερα.

**Ε. Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ