



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 5-5-2008

Αριθ. Πρωτ.: 118397

**Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας : 101 64 Αθήνα**

FAX: 3617103

**Πληροφορίες: Α.Φονταρά
Τηλέφωνο: 212 44 98**

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση οριστικής έγκρισης
του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(μυκητοκτόνο) DITHIANON -
ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ 75 WP, ως προς
το φάσμα δράσης.»**

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.

**Μουρούζη 9
106 74 - Αθήνα
(Με απόδειξη)**

- ΚΟΙΝ.:** 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γ. Γρ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης
(με e-mail), Έδρες τους
6) Τμήματα Β, Γ & Ε της Δ/σής μας
7) Γραμματεία της Δ/σής μας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-1997 (Α' 104/30-5-1997) για "την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί" και ειδικότερα το άρθρο 4, (παρ. 6) και το άρθρο 8, (παρ.2 και 3).
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 149/2008 της Επιτροπής της 29-1-2008 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων II, III και IV για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα I του κανονισμού».
3. Το Π.Δ. 206/2007 / (ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β' /18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με "Εντολή Υπουργού"».

Αποφασίζουμε

I. Τροποποιούμε τη με αριθμό **60. 087** οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο), **DITHIANON-ANOPΓKAXHM 75 WP (dithianon 75% β/β)**, η οποία χορηγήθηκε στην παρασκευάστρια εταιρεία ANOPΓKAXHM A.E., με τη με αριθ. **121795/24-10-2006** απόφασή μας, ως προς το **φάσμα δράσης**, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

13 Φάσμα δράσης.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ γρ./100 λίτρα νερό	Όγκος Ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ	ΔΟΣΕΙΣ γρ./στρ	Μέγ. αριθμός εφαρμογ ανά καλλιεργ περίοδο	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis V.pirina</i>)	75 (πριν την άνθηση) 50 (μετά την άνθηση)	100-200	75-150 50-100	4	Πράσινη κορυφή, ρόδινη κορυφή, πτώση πετάλων, 10-15 ημέρες αργότερα, (καρπίδιο).
	Φαιά σήψη (<i>Monilinia spp.</i>)	70-100		70-200		Κατά την έκπτυξη των οφθαλμών. λευκή ή ρόδινη κορυφή, πλήρη άνθηση.
	Σήψεις καρπών (<i>Gloeosporium spp. Phyalospora spp.</i>)	70-100		70-200		Εφαρμογές το καλοκαίρι 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.
Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά	Φαιά σήψη (<i>Sclerotinia laxa</i>)	95	150	140	2	Δύο εφαρμογές: στη ρόδινη κορυφή και στην άνθηση.
		30	150	45		
Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά	Κορύνεο (<i>Stigmia carophila</i>)	75-95	150	112-140		Δύο εφαρμογές: μία το φθινόπωρο (πτώση 75% των φύλλων) ή το χειμώνα (πριν τη διόγκωση των οφθαλμών) και η δεύτερη την άνοιξη στην έναρξη της βλάστησης
		30	150	45		

Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά	Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i> , <i>Taphrina pruni</i>)	75-95	150	112-140		Μια εφαρμογή κατά την περίοδο του χειμερινού λήθαργου και οπωσδήποτε πριν από τη διόγκωση των οφθαλμών.
Κερασιά, Δαμασκηνιά		30	150	45		
Αμπέλι	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	75-100	50-100	37-100	4	Εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. Έκπτυξη οφθαλμών, αμέσως μετά το σχηματισμό του 1ου φύλλου, στάδιο 2-3 φύλλων.
	Φώμοψη (<i>Phomopsis viticola</i>)	100		50-100		
Λυκίσκος	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)	60-100	250	150-250	4	α. Όταν οι βλαστοί ευρίσκονται στα 3/4 της διαδρομής των επί των υποστηριγμάτων β. Όταν οι βλαστοί φθάσουν στην κορυφή των υποστηριγμάτων. γ. Λίγο πριν την άνθηση, και δ. Αμέσως μετά την άνθηση.
Χρυσάνθεμο Τριανταφυλλιά	Σεπτορίωση (<i>Septoria spp.</i>) Μελανή κηλίδωση φύλλων (<i>Diplocarpon rosae</i>)	100	50-100	50-100	4	Προληπτικές εφαρμογές και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες, ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Μηλοειδή 4, Πυρηνόκαρπα 2, Αμπέλι 4, Λυκίσκος 4, Καλλωπιστικά 4.

Παρατηρήσεις

-Στο φουζικλάδιο εκτός από προστατευτικά δρα και θεραπευτικά εφόσον χρησιμοποιηθεί εγκαίρως μέσα σε 48 ώρες από τη μόλυνση (δηλαδή από τη βροχή που την προκαλεί).

-Στις καλλιέργειες μηλοειδή, αμπέλι και πυρηνόκαρπα να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

-Δεν διασπάται εύκολα γι' αυτό μετά τους πρώιμους ψεκασμούς να εφαρμόζονται οι μικρές δόσεις, γιατί υπάρχουν ακόμη υπολείμματα του φαρμάκου πάνω στο φύλλωμα των φυτών.

II. Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 149/2008.

III. Το κείμενο ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα απόφαση.

IV. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 121795/24-10-2006 απόφασή μας.

**Ε. Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ

