



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 8 - 2 - 2010
Αριθ. πρωτ.: 180988**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11**

ΠΡΟΣ: Πίνακα αποδεκτών (με απόδειξη)

**ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Υπουργού Κας Αικ. Μπατζελή
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μ. Καρχιμάκη
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γεν. Δ/σης Φυτ. Παραγωγής, κ. Δ. Μπαμπίλη
4. Μ.Φ.Ι. (με email)
5. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Δ/σεις Γεωργίας Έδρες τους (με email)
6. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.- Έδρες τους (με email)
7. Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής μας
8. Κ+Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Α.Β.Ε.Ε. (με email)**

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση προσωρινής έγκρισης διάρκειας 120 ημερών με βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115/97, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν TELONE II 92% LC”

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο**

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α'/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί».
2. Τη γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) για το 15^ο θέμα της 13^{ης}/25.11.2009 συνεδρίασής του.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α'/7-10-09) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη με αριθμό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/Β'/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιμάκη».
5. Την από 11-5-2009 αίτηση της ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, που έγινε και για λογαριασμό των:

1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
2. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
3. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
4. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ)
5. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΖΩΝ (ΚΡΗΤΗ)
6. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΚΡΗΤΗ)
7. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ (ΚΡΗΤΗ)
8. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΕΛΗΝΗΣ (ΚΡΗΤΗ)

9. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
10. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ –ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
11. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΙΑΤΟΥ
12. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ
13. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
14. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
15. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
16. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ)
17. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ (ΑΡΓΟΛΙΔΑ)
18. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
19. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Σε εφαρμογή του άρθρου 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115/97 χορηγούμε στους:

1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
2. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
3. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
4. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ)
5. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΖΩΝ (ΚΡΗΤΗ)
6. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΚΡΗΤΗ)
7. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ (ΚΡΗΤΗ)
8. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΕΛΗΝΗΣ (ΚΡΗΤΗ)
9. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
10. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ –ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
11. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΙΑΤΟΥ
12. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ
13. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
14. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
15. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
16. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ)
17. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ (ΑΡΓΟΛΙΔΑ)
18. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
19. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
20. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΚΡΗΤΗ)

προσωρινή έγκριση διάρκειας 120 ημερών για χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **TELONE II 92% LC**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα :** TELONE II
2. **Μορφή :** ΥΓΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (LC)
3. **Εγγυημένη σύνθεση :** 1,3-dichloropropene : 94,5 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 2,58 % β/β
4. **Παρασκευαστής :** DOW AGROSCIENCES LLC, Η.Π.Α.
5. **Κάτοχος έγκρισης:** K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ. 57022
6. **Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ. 57022
7. **Εργοστάσιο παρασκευής :** DOW AGROSCIENCES LLC, Η.Π.Α.
8. **Εργοστάσιο συσκευασίας :** DOW AGROSCIENCES LLC, Η.Π.Α.
9. **Συσκευασία :** σιδερένια δοχεία των 20, 50 και 200 λίτρων.

10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης :**

Νηματώδοκτονο υποκαπνιστικό εδάφους. Δρα εξ' επαφής καταπολεμώντας όλα τα είδη νηματωδών ,εντόμων εδάφους και έμμεσα επιδρά σε μύκητες εδάφους, βακτήρια, ιούς και ζιζάνια.

11. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής :

Εφαρμόζεται κατά την προετοιμασία του εδάφους και 3-4 εβδομάδες πριν από τη σπορά ή τη φύτευση των παραπάνω καλλιεργειών.

Εφαρμόζεται καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου, όταν η θερμοκρασία του εδάφους κυμαίνεται από 5°C έως 27°C.

Το έδαφος πρέπει να είναι στον ρώγο του και να μην υπάρχουν αχώνευτα υπολείμματα από προηγούμενη καλλιέργεια.

Να μη χρησιμοποιείται σε τελείως αργιλλώδη, βαριά εδάφη.

Πριν από την εφαρμογή του κάντε όσο το δυνατόν βαθύτερο όργωμα και καλή προετοιμασία του εδάφους.

Το TELONE II πρέπει να πέφτει σε αυλάκια βάθους 20 εκατοστών (30 εκατοστών σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες) που να απέχουν μεταξύ τους μέχρι 30 εκατ. (για φυτείες μέχρι 40 εκατοστών).

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΡΟΠΟΥΣ:

Για μεγάλες εκτάσεις με τρακτέρ ή φρέζα με ειδικό ρυθμιζόμενο σύστημα με έναν ή περισσότερους εγχυτήρες που τους ακολουθεί ένας κύλινδρος.

Σε μικρές εκτάσεις η εφαρμογή του μπορεί να γίνει με δοσομετρικό εγχυτήρα.

Συνιστάται πάντα μετά την εφαρμογή στο έδαφος να υφίσταται κυλίνδρισμα ή ελαφρό πότισμα.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Μετά την εφαρμογή να μην πειράξετε καθόλου το έδαφος για 7-14 μέρες. Ύστερα αερίζετε καλά το έδαφος με βαθύ φρεζάρισμα ή καλλιέργεια.

7-10 μέρες μετά από αυτό και όταν το χώμα δεν μυρίζει πια καθόλου αρχίστε την σπορά ή το φύτεμα. Αν όμως φυτέψετε δένδρα αφήστε να περάσουν 1-2 μήνες μετά την εφαρμογή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Για σωληνώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολυπροπυλένιο, νάιλον, τεφλόν, πολυαιθυλένιο, ατσάλι, χαλκός. **ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ, ΤΣΙΓΚΟΥ.**

2. Όταν το δοχείο αδειάσει, τοποθετείστε το ανάποδα σε ανοικτό χώρο και αφήστε το να εξαεριστεί για μία εβδομάδα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ

Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

Μη σπέρνετε αγρωστώδη φυτά πριν περάσουν τρεις μήνες από την εφαρμογή του.

Μη μολύνετε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες (καλαμπόκι, ρύζι, σόργο, σιτηρά).

Μετά το ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα αρχικά με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορρυπαντικό.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού :

Δε διαλύεται στο νερό αλλά χρησιμοποιείται αυτούσιο με τη βοήθεια εγχυτήρα ή ποτιστηριού.

13. Φάσμα δράσης :

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος λ./ στρ.	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
<p>ΛΑΧΑΝΙΚΑ σε ανοικτούς χώρους (Παντζάρια, Καρότο, Ρεπάνια, Σκόρδα, Κρεμμύδια Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες, Μπάμιες, Κολοκύθια, Αγγούρια, Πεπόνια, Καρπούζια, Κουνουπίδια, Λάχανα, Μαρούλια, Σέλινα, Φασόλια, Ρεβίθια, Αρακά, Πράσα), ΦΡΑΟΥΛΑ, ΠΑΤΑΤΑ, ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ πριν την εγκατάστασή τους, ΑΡΑΧΙΔΑ, ΒΑΜΒΑΚΙ, ΣΙΤΗΡΑ, Σιτάρι, Καλαμποόκι, Ρόζι, ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΚΑΠΝΟ (Χωράφι, σπορείο), ΤΡΙΦΥΛΛΙ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΦΥΤΑ</p> <p>Επίσης πριν εγκαταστήσετε καινούργιες φυτείες σε εδάφη που υπήρχαν παλιές.</p>	<p>Καταπολέμηση νηματώδων και ορισμένων εντόμων εδάφους.</p> <p>Καταπολεμά επίσης <u>Symphyta</u> (ιούλους), <u>ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ</u> <u>Meloidogyne</u> (που κάνει εξογκώματα στις ρίζες), <u>Globodera</u> (κυστονηματώδης της πατάτας), <u>Heterodera</u> (κυστονηματώδεις διάφοροι) <u>Platylenchus</u> (που δημιουργεί νεκρώσεις ριζών) κλπ. Διάφορα εκτοπαράσιτα είδη, που δημιουργούν δευτερογενείς μολύνσεις.</p>	<p>14-22 κιλά στο στρέμμα (11,5-18 λίτρα στο στρέμμα)</p>	<p>Εφαρμόζεται κατά την προετοιμασία του εδάφους και 3-4 εβδομάδες πριν από την σπορά ή τη φύτευση των καλλιεργειών</p>	<p>1</p>

Παρατηρήσεις:

1. Η μεγάλη δόση αφορά σοβαρή προσβολή.
2. Οι μεγάλες δόσεις επίσης χρησιμοποιούνται σε βαριά εδάφη ενώ οι χαμηλές σε αμμώδη.
3. Για τις ετήσιες καλλιέργειες για καλλίτερα αποτελέσματα να γίνεται εφαρμογή κάθε χρόνο.
4. Έμμεσα περιορίζει σήψεις, φουζαριώσεις και βακτηριώσεις στις ρίζες (ασθένειες δηλαδή που μεταδίδονται από τις πληγές που κάνουν οι νηματώδεις).
5. Επίσης αναστέλλει τη βλάστηση διαφόρων σπόρων ζιζανίων σε ικανοποιητικό βαθμό.

14. **Φυτοτοξικότητα :** Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό αν χρησιμοποιηθεί 2-3 εβδομάδες πριν τη φύτευση της καλλιέργειας σε όλες τις αναφερόμενες καλλιέργειες. Δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε βαριά αργιλώδη εδάφη. Το έδαφος δεν πρέπει να μυρίζει TELONE II όταν πρόκειται να σπαρεί ή να φυτευτεί η καλλιέργεια.

15. **Συνδυαστικότητα :** Δε συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

16. **Σημάνσεις:** T-Τοξικό, N-επικίνδυνο για το περιβάλλον.

17. **Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

R10 Εύφλεκτο.

R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται

R24 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

R25 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.

R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα

R38 Ερεθίζει το δέρμα.

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα

18. **Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R και RO φράσεις) :**

R51 Τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς.

R53 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

RO13 Βλαβερό για τα πουλιά

19. **Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις) :**

(S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

(S13) Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρωτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.

(S23) Μην αναπνέετε τους ατμούς. Διατηρείστε τη συσκευασία ερμητικά κλεισμένη.

(S24/ S25) Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

(S26) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

(S27) Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα και τα παπούτσια στα οποία έπεσε σκεύασμα και πλυθείτε καλά. Πλύνετε τα και αερίστε τα καλά πριν τα ξαναφορέσετε.

(S28) Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

(S36/37) Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια PVC, όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.

(S35) Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με κόψιμο ή τρύπημα. Η χρήση τους για οποιονδήποτε σκοπό είναι επικίνδυνη. Όταν το χρησιμοποιείτε στα θερμοκήπια να έχετε πόρτες και παράθυρα ανοικτά και μην μένετε μέσα κατά την εφαρμογή του.

(S39) Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών /προσώπου.

(SY8) Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσεως

20. **Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :**

(S45) Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

21. **Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις) : ----**

(S60) Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

(S61) Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες /το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις) :

A3 Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από αυτές.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Δεν ορίζεται. Εφαρμόζεται 3-4 εβδομάδες πριν τη σορά ή τη φύτευση της καλλιέργειας.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης :

Διατηρείται σταθερό στην αρχική του συσκευασία σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για (2) δύο χρόνια τουλάχιστον.

II. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις αυτών, μετά από αίτηση των οποίων τους χορηγείται η παρούσα έγκριση, θα είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των χρηστών μελών τους όσον αφορά την ανωτέρω χρήση. Οι ανωτέρω συνεταιρισμοί είναι επίσης υποχρεωμένοι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος.

III. Ημερομηνία λήξης της προσωρινής έγκρισης: 120 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΞΕΝΗΣ

M. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών

1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
2. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
3. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
4. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ)
5. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΖΩΝ (ΚΡΗΤΗ)
6. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΚΡΗΤΗ)
7. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ (ΚΡΗΤΗ)
8. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΕΛΗΝΗΣ (ΚΡΗΤΗ)
9. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
10. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ –ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
11. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΙΑΤΟΥ
12. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ
13. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
14. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
15. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
16. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ)
17. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ (ΑΡΓΟΛΙΔΑ)
18. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
19. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
20. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΚΡΗΤΗ)