



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 2 - 6 - 2008

Αριθ. πρωτ.: 119466

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 17671 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 9212090  
Πληροφορίες: Γ.Τσιάμπα  
Τηλέφωνο: 210 928 7228

ΠΡΟΣ: ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.,  
Δ. Γληνού 32,  
542 49 - Θεσσαλονίκη  
(με απόδειξη)  
ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού  
2) Γραφείο Γεν. Γραμ. κ. Κ. Σκιαδά  
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά  
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης  
6) Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/σής μας  
7) Γραμματεία της Δ/σής μας

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό  
προϊόν (ζιζανιοκτόνο)  
YPSILON-PROVA 25 EC"**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για "την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί" και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β (παρ. 1).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) Απόφασή μας, όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3.9.2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την "ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων", όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ, καθώς και τη με αριθ. 108114/30.7.2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8.8.2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 149/2008 της Επιτροπής της 29-1-2008 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων II, III και IV για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα I του κανονισμού».
6. Τη με αριθ. 123898/6-12-2006 Απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. 7231 οριστική έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) RONSTAR 25 EC.
7. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α').

8. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Εντολή Υπουργού”».
9. Τις από 20-2-2008 και 22-04-2008 αιτήσεις, με το από 22-04-2008 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου της εταιρίας ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**I.** Χορηγούμε στην εταιρεία ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε. οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **7869** του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** YPSILON-PROVA 25 EC.
- 2. Μορφή:** Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** Oxadiazon 25% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 73.7% β/β Περιέχει Cyclohexanone.
- 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία : 96% min
- 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** JIANGSU BAILING AGROCHEMICAL CO., LTD, Κίνας.  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:** JIANGSU BAILING AGROCHEMICAL CO., LTD., Κίνας (η Δ/ση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στη Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και είναι εμπιστευτική).
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε., Δ. Γληνού 32, 542 49 - Θεσσαλονίκη.  
**β. Υπεύθυνος επικοινωνίας :** -  
**γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε., Δ. Γληνού 32, 542 49 - Θεσσαλονίκη .
- 7. α. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε., Δ. Γληνού 32, 542 49 - Θεσσαλονίκη.  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** CHEMIA s.p.A, ΙΤΑΛΙΑ  
(η Δ/ση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στη Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και είναι εμπιστευτική).
- 8. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: :** CHEMIA s.p.A, ΙΤΑΛΙΑ
- 9. Συσκευασία: 9α. Είδος-Μέγεθος:**Φιάλες 1 (ενός) λίτρου.  
**9β. Υλικό:** COEX.
- 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:**  
Προφυτρωτικό-Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια σε γαρύφαλλα, γλαδίολους, αμπέλια, σπυροφόρα και ρύζι.
- 11. Τρόπος εφαρμογής:**  
Εφαρμόζεται με ψεκασμό.
- 12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**  
Γεμίζετε το ψεκαστικό με το 1/3 του απαιτούμενου νερού και προσθέτετε το σκεύασμα. Υπό συνεχή ανάδευση προστίθεται το υπόλοιπο νερό.
- 13. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ Καλλιεργητική περίοδο
		κ. εκ./ στρέμμα	Ογκος ψεκ. υγρού λίτρα /στρέμμα		
Γαρύφαλλα	Αγρωστώδη και	1000 – 1500	150-200	Ψεκασμός λίγες μέρες μετά τη φύτευση των	<b>1</b>

	Πλατύφυλλα Ζιζάνια			μοσχευμάτων ή σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης των γαρύφαλλων, όταν τα ζιζάνια είναι ακόμη μικρά.	
Γλαδίολοι	Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1000 - 1500	150-200	Ψεκασμός λίγες μέρες μετά τη φύτευση.	<b>1</b>
Ρύζι		350 - 400		Ψεκασμός σε ψιλοχωματισμένο έδαφος 4-5 ημέρες πριν την κατάκλυση.	<b>1</b>
Αμπέλια		Προφυτρωτικά 1000 – 1500		Στα Αμπέλια ψεκάζουμε πριν φουσκώσουν τα μάτια ή μετά το στάδιο των 10-12 φύλλων. Στα Οπωροφόρα 2-4 εβδομάδες μετά την καρπόδεση. Σε ροδακινιές μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δέντρα από 2 ετών και πάνω.	<b>1</b>
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά),  Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά- Νεκταρινιά, Βερικοκιά)					
Κρεμμύδια από κοκάρι		300 - 400		Η εφαρμογή γίνεται μετά τη φύτευση του κοκαριού (3 ημέρες) και προφυτρωτικά.	<b>1</b>
Κρεμμύδια από σπόρο		150 - 300		Η εφαρμογή γίνεται όταν η καλλιέργεια φτάσει τα 3-4 φύλλα. Ποτίζουμε για να βοηθήσουμε την αποτελεσματικότητα.	<b>1</b>

Σε εδάφη με πολύ οργανική ουσία χρησιμοποιήστε τις υψηλές δοσολογίες.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αγρωστώδη ζιζάνια: *Agrostis spica-venti* (άγρωστις), *Avena fatua* (αγριοβρώμη), *Cyperus* sp. (κύπερη – εκτός της rotundus), *Digitaria* sp. (διγιτάρια), *Echinochloa crus-galli* (μουχρίτσα), *Festuca* sp. (φεστούκα), *Leptochloa* sp. (λεπτόχλοα), *Lolium* (ήρα – λόλιο), *Paspalum* (πάσπαλο), *Phalaris* (φαλαρίδα), *Setaria* (κολλητσίδα).

### Πλατύφυλλα ζιζάνια:

*Abutilon theophrasti* (αβούτιλο), *Alisma plantago* (άλισμα), *Amaranthus* spp. (βλήτα), *Ambrosia artemisifolia* (αμβροσία), *Anagalis arvensis* (αναγαλίδα), *Anthemis* sp. (αγριομαργαρίτα), *Brassica* spp., *Capsela bursa-pastoris* (καψέλλα), *Cerastium arvense* (κεράστιο), *Chenopodium* sp. (χηνοπόδι – λουβουδιά), *Convolvulus arvensis* (περικοκλάδα), *Datura* sp. (τάτουλας), *Fumaria officinalis* (καπνόχορτο), *Galinsoga parviflora* (γαλινσόγα), *Galium* sp. (μεγαλόκαρπη κολλητσίδα), *Lamium* sp. (λάμιο), *Matricaria* sp. (χαμομήλι), *Oxalis* sp. (οξαλίδα), *Plantago* sp. (πλαντάγο), *Polygonum* spp. (πολύγωνο), *Raphanus* sp. (αγριοραφανίδα), *Senecio vulgaris* (μαρτιάκος), *Sinapis arvensis* (σινάπι), *Scirpus* sp. (Σκίρπο), *Sonchus* spp. (ζωχού), *Urtica* spp.(τσουκνίδα), *Veronica* spp. (βερονίκη).

Ιδιαίτερα αποτελεσματικό εναντίον της περικοκλάδας (*Convolvulus* sp.), προ και μεταφυτρωτικά.

Στις μεταφυτρωτικές εφαρμογές ψεκάζουμε την περικοκλάδα όταν έχει μήκος 10-20 εκ

## **ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ**

Κύπερη Πορφυρή (*Cyperus rotundus*), Κίρσιο (*Cirsium spp.*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Αγριοκουκιά (*Agrostemma spp.*) και Στελλάρια (*Stellaria media*).

### **Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα:**

- SZ1** Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- SZ5** Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- SZ7** Μην ψεκάσετε όταν φυσάει.
- SZ8** Μη διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- SZ11** Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται
- SZ12** Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα, με άφθονο νερό και υγρό απορρυπαντικό.

### **14. Φυτοτοξικότητα:**

Να προφυλάσσονται οι νεαρές κορυφές από τον ψεκασμό. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα τριαντάφυλλα.

### **15. Συνδυαστικότητα:** -

### **16. Σήμανση τοξικότητας: Xn - Επιβλαβές**

**N** - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

### **17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

- R10** Εύφλεκτο
- R65** Επιβλαβές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
- R67** Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

### **18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις και R φράσεις):**

- R50/53** Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

### **19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- S23** Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος.
- S24** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα
- S43** Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε ξηρά χημικά, διοξείδιο του άνθρακα, ψεκασμό νερού ή αφρό.
- S59** Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση
- S62** Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αμέσως αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του
- SY8** Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- SY11** Μη ρυπαίνετε τα νερά άρδευσης ή ύδρευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

**« Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης »**

### **20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:**

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή την ετικέτα όπου είναι δυνατόν. Θεραπεία συμπτωματική.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.**

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις και S φράσεις):**

**S60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

**S61** Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες /το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και των κενών μέσων συσκευασίας :**

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποθέτονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση.

**22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):**

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

**23. Περιορισμοί για τη προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): --**

**24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) τουλάχιστον χρόνια κάτω από κανονικές συνθήκες, και σε θερμοκρασία από 0 έως 35 °C μέσα στη συσκευασία του.

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.**

**β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



**Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ**