



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 92 12 164

**ΘΕΜΑ:** "Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο φυτοπροστα-  
τευτικό προϊόν (εντομοκτόνο)  
CEKUCYRO 75 WP

Αθήνα, 13-01-2005

Αριθ. πρωτ.: 120046

- ΠΡΟΣ:**
1. ΕΜΑΒΠ  
Θ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ-Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ο.Ε.  
Χαλκοκονδύλη 37, 104 32-ΑΘΗΝΑ  
(με απόδειξη)
  2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α) Διευθύνσεις Γεωργίας  
'Εδρες τους  
β) Διευθύνσεις Εμπορίου  
'Εδρες τους
  3. Μ.Φ.Ι.  
Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών Φαρμάκων
  4. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/νσής μας  
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 (ΦΕΚ 298/A/77) «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. 2) και 5 (παρ. 2 και 8).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/B/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» Κεφ. Β., παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83346/28.7.86 (ΦΕΚ 599/B/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά τον «καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/97 (ΦΕΚ 104/A/30.5.97) Προεδρικό Διάταγμα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3.9.2002 (ΦΕΚ 1214/B'/19.9.2002) KYA με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30.7.2003 (ΦΕΚ 1121/B'/8.8.2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της KYA 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 80275/29.6.92 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 1588 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης εντομοκτόνο σκεύασμα TRIGARD 75 WP, καθώς και τη με αριθ. 119526/4.8.2004 Απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε το φάσμα δράσης του.
6. Τη αριθμ. Υ132/11.10.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (1533 TB/14.10.2004) καθώς και τη αριθμ. 301509/19.11.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν “με εντολή Υφυπουργού” (1762 TB/30.11.2004».
7. Τις σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 6-11-2003 πρωτόκολλο πληρότητας φακέλου.

## Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

**I.** Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **14065** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** CEKUCYRO 75 WP
2. **Μορφή:** βρέξιμη σκόνη (WP)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** cyromazine 75% β/β  
βοηθητικές ουσίες: 23,47% β/β
4. **Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** 98% min
5. **Παρασκευαστής:** CEQUISA S.A., Muntaner, 322, 1º 08021 Barcelona, Ισπανίας.
6. **Αντιπρόσωπος:** EMABIP, Θ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ-Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ο.Ε., Χαλκοκονδύλη 37, 104 32 – ΑΘΗΝΑ.
7. **Τυποποιητής:** ο παρασκευαστής.
8. **Συσκευαστής:** ο παρασκευαστής.
9. **Συσκευασία:** 9.a. **Είδος-Μέγεθος:** i) Σακουλάκια ή βαζάκια των 100, 150, 200 και 250 γραμ.  
ii) Χαρτοκύτια 1 κιλού.  
iii) Σάκοι 5 κιλών.  
9.b. **Υλικό:** i) **Λαμιναρισμένα σακουλάκια ή πλαστικά βαζάκια μέσα σε χαρτοκύτια.**  
ii) Σακίδια σύνθετα, από χαρτί / πολυαιθυλένιο (PE) / φύλλο αλουμινίου /  
/ πολυαιθυλενίου (PE), εντός χαρτοκυτίου με τυπωμένη ετικέτα.  
iii) Χαρτόσακοι με τρία στρώματα χαρτιού Kraft και ένα εσωτερικό στρώμα  
σκληρού πολυαιθυλενίου (PE-HD).
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:** Διασυστηματικό εντομοκτόνο απορροφούμενο από τα φύλλα και τις ρίζες. Δρα ως ρυθμιστής ανάπτυξης των εντόμων.
11. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος ή ριζοπότισμα.

**12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

- Αναμιγνύουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος με μία μικρή ποσότητα νερού.
- Προσθέτουμε την “κρέμα” μέσα σε καθαρό νερό στον ψεκαστήρα.
- Συμπληρώνουμε με την υπόλοιπη ποσότητα νερού, ανακατεύουμε καλά το ψεκαστικό διάλυμα και εφαρμόζουμε μέσα σε λίγες ώρες.

**13. Φάσμα δράσης:**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
<b>Καρποφόρα Λαχανικά Σολανώδη (Τομάτες, Μελιτζάνες)</b>	-Λιριόμυζα (Liriomyza spp.)	18,5 γραμ. / 100 λίτρα νερό	Με ψεκασμό φυλλώματος προληπτικό ή στα αρχικά στάδια προσβολής κάθε 7 ημέρες.
Τομάτες, Μελιτζάνες (θερμοκηπίου)		30 γραμ. / 100 λίτρα νερό	Με εκδηλωμένη έντονη προσβολή και μέχρι την καταστολή της, κάθε 7 ημέρες.
		20-100 γραμ. / στρέμμα	Από το έδαφος εφαρμογή είτε με το σύστημα ποτίσματος είτε με ριζοπότισμα φυτό-φυτό. Η δόση είναι ανάλογη με τη διάρκεια δράσης που θέλουμε να επιτύχουμε και αντιστοιχεί σε 1-3 μήνες.

<b>Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό</b> (Αγγούρια, Κολοκύθια)	-Λιριόμυζα ( <i>Liriomyza spp.</i> )	18,5 γραμ. / 100 λίτρα νερό  30 γραμ. / 100 λίτρα νερό  20-100 γραμ. / στρέμμα	Με ψεκασμό φυλλώματος προληπτικό ή στα αρχικά στάδια προσβολής κάθε 7 ημέρες.  Με εκδηλωμένη έντονη προσβολή και μέχρι την καταστολή της, κάθε 7 ημέρες.  Από το έδαφος εφαρμογή είτε με το σύστημα ποτίσματος είτε με ριζοπότισμα φυτό-φυτό. Η δόση είναι ανάλογη με τη διάρκεια δράσης που θέλουμε να επιτύχουμε και αντιστοιχεί σε 1-3 μήνες.
<b>Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό</b> (Πεπόνια)	-Λιριόμυζα ( <i>Liriomyza spp.</i> )	18,5 γραμ. / 100 λίτρα νερό  30 γραμ. / 100 λίτρα νερό  20-100 γραμ. / στρέμμα	Με ψεκασμό φυλλώματος προληπτικό ή στα αρχικά στάδια προσβολής κάθε 7 ημέρες.  Με εκδηλωμένη έντονη προσβολή και μέχρι την καταστολή της, κάθε 7 ημέρες.  Από το έδαφος εφαρμογή είτε με το σύστημα ποτίσματος είτε με ριζοπότισμα φυτό-φυτό. Η δόση είναι ανάλογη με τη διάρκεια δράσης που θέλουμε να επιτύχουμε και αντιστοιχεί σε 1-3 μήνες.
<b>Φυλλώδη λαχανικά και νωπά αρωματικά φυτά Σέλινο</b>	-Λιριόμυζα ( <i>Liriomyza spp.</i> )	18,5 γραμ. / 100 λίτρα νερό  30 γραμ. / 100 λίτρα νερό	Με ψεκασμό φυλλώματος προληπτικό ή στα αρχικά στάδια προσβολής κάθε 7 ημέρες.  Με εκδηλωμένη έντονη προσβολή και μέχρι την καταστολή της, κάθε 7 ημέρες.
<b>Στελεχώδη λαχανικά Αγκινάρα (μόνο αγρού)</b>	-Λιριόμυζα ( <i>Liriomyza spp.</i> )	18,5 γραμ. / 100 λίτρα νερό  30 γραμ. / 100 λίτρα νερό	Με ψεκασμό φυλλώματος προληπτικό ή στα αρχικά στάδια προσβολής κάθε 7 ημέρες.  Με εκδηλωμένη έντονη προσβολή και μέχρι την καταστολή της, κάθε 7 ημέρες.
<b>Ανθοκομικά</b>	-Λιριόμυζα ( <i>Liriomyza spp.</i> )	18,5 γραμ. / 100 λίτρα νερό  30 γραμ. / 100 λίτρα νερό	Με ψεκασμό φυλλώματος προληπτικό ή στα αρχικά στάδια προσβολής κάθε 7 ημέρες.  Με εκδηλωμένη έντονη προσβολή και μέχρι την καταστολή της, κάθε 7 ημέρες.

		18,5-130 γραμ./ στρέμμα	Από το έδαφος εφαρμογή είτε με το σύστημα ποτίσματος είτε με ριζοπότισμα φυτό-φυτό. Η δόση είναι ανάλογη με τη διάρκεια δράσης που θέλουμε να επιτύχουμε και αντιστοιχεί σε 1-3 μήνες.
--	--	----------------------------	--

**Παρατηρήσεις:**

1. Δεν πρέπει να σπέρνεται ή να φυτεύεται άλλη καλλιέργεια πλην του γλυκού Καλαμποκιού πριν περάσουν 3 μήνες από την εφαρμογή.
2. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:  
Τομάτα, Μελιτζάνα (αγρού-θερμοκηπίου), Πεπόνι, Αγγούρια, Κολοκύθι (αγρού-θερμοκηπίου) για την εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος, Αγκινάρα μόνο αγρού, Σέλινο: **3.** Τομάτα και Μελιτζάνα (αγρού-θερμοκηπίου), Αγγούρια, Κολοκύθια και Πεπόνια θερμοκηπίου για την εφαρμογή από εδάφους: **1.**

**14. Φυτοτοξικότητα:**

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

**15. Συνδυαστικότητα:** -----

**16. Σήμανση τοξικότητας:** **Xi - ερεθιστικό**

**17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

**R36/38** Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

**18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις και R φράσεις):**

**(RO3)** Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

**(RO15)** Βλαβερό για τα πουλιά.

**19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**

**(S1/2)** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

**(S13)** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές.

**(S20/21)** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.

**(S22)** Μην εισπνέετε την σκόνη.

**(S26)** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**SY12** Κρατήστε μακριά από την ψεκασμένη περιοχή άσχετα πρόσωπα για 7 ημέρες.

Να μην εισέρχονται στην περιοχή δίχως προστατευτική ενδυμασία πριν περάσουν 7 ημέρες από την εφαρμογή.

Να μην εκτίθενται στο σκεύασμα οι έγκυες.

**20. Πρώτες βιοήθειες - Αντίδοτο:**

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση κατάποσης πιείτε 1-2 ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό ενεργώντας με μηχανικό τρόπο στο φάρυγγα.

Χορηγήστε ενεργό άνθρακα με την προϋπόθεση ότι ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του.

Αν υπάρξει ερεθισμός του δέρματος ή των οφθαλμών ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αν εισπνευσθεί μεταφερθείτε σε καθαρό αέρα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.**

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO και S φράσεις):**

(SO6) Κρατήστε τα κοτόπουλα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 7 ημέρες.

**22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):** Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες καλλιεργητές.

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Καλλιέργειες θερμοκηπίου: 7 ημέρες

Καλλιέργειες υπαίθρου: 14 ημέρες

**24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Το σκεύασμα αποθηκευμένο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**II. Ετικέτα:**

**α)** Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα Απόφαση.

**β)** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2009**.**

**β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

**E.Y.  
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Θ. ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ**