



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 21 - 7 - 2008

Αριθ. Πρωτ.: 120963

Ταχ.Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα
FAX: 210-92 12 090
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210-928 7228

ΠΡΟΣ: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ,
Εθνικής Αντιστάσεως 73,
152 31 Χαλάνδρι

(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γεν. Γραμ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
6) Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/νσής μας
7) Γραμματεία της Δ/νσής μας

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της έγκρισης
του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο),
GALIGAN 24 EC,
ως προς το φάσμα δράσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-1997 (Α'104/30-5-1997) για "την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί" και ειδικότερα το άρθρο 4, (παρ. 6) και το άρθρο 8, (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Β, παρ. 1, 7.
3. Τη με αριθμό 116876/12-3-2008 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 7853 έγκριση κυκλοφορίας στο ίδιας μορφής και περιεκτικότητας φυτοπροστατευτικό προϊόν OXYFLUORFEN ΛΑΠΑΦΑΡΜ 24 EC, που περιέχει την ίδια δραστική ουσία.
4. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α').
5. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με "Έντολή Υπουργού"».
6. Την από 10-6-2008 αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, για την τροποποίηση (διεύρυνση) της έγκρισης του σκευάσματός της GALIGAN 24 EC.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Τροποποιούμε (διευρύνουμε) τη με αριθ. **7527**, οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο), GALIGAN 24 EC, (δ.ο. oxyfluorfen 24%), με παρασκευαστή την εταιρεία AGAN CHEMICAL MANUFACTURER, Ltd., - Ισραήλ, και κάτοχο της έγκρισης την εταιρεία ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 58132/27-3-1998 και διευρύνθηκε με την αριθ. 126914/26-9-2005 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης για χρήση και στην καλλιέργεια του **βαμβακιού**

και συγκεκριμένα η παράγραφος **13** διαμορφώνεται ως ακολούθως:

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./στρ.	Όγκος ψεκαστικού υγρού λίτρα/στρ.	ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Αριθμός εφαρμογών
-Εσπεριδοειδή: Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπφρουτ, Κίτρο	Ετήσια και πολυετή ζιζάνια (πλατύφυλλα και αγρωστώδη) (1), (9)	500	30-60	Προφυτρωτικά (2), (3)	1
-Μηλοειδή: Μηλιά, Αχλαδιά	>>	500	30-60	Προφυτρωτικά (2), (3)	1
-Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηινιά, Νεκταρινιά, Κορομηλιά, Κερασιά, Βυssινιά	>>	500	30-60	Προφυτρωτικά (2), (3)	1
-Αμπέλι: (Σταφίδες, Οινοποιήσιμο, Επιτραπέζιο) (4)	>>	500	30-60	Προφυτρωτικά (2), (3)	1
-Ελιές	>>	500	30-60	Προφυτρωτικά (2), (3)	1
Κράμβες: Κουνουπίδι, Λάχανο (5)	>>	250-300	30-60	Πριν τη μεταφύτευση και ακολουθεί κατάκλιση.	1
Μελιτζάνα (5)	>>	250-300	30-60	Πριν τη μεταφύτευση και ακολουθεί κατάκλιση.	1

Αγκινάρα	>>	300	30-60	Προ της βλαστήσεως του ξηροφύτου.	1
Κρεμμύδι (6) (7)	>>	150	30-60	α) Μεταφυτρωτικά ως προς την καλλιέργεια, στο στάδιο των 3-4 φύλλων στο κρεμμύδι από σπόρο. β) Εντός δύο (2) ημερών από την φύτευση στο κρεμμύδι από κοκκάρι.	1
Ηλιάνθος (8)	>>	100	30-60	Μετά τη σπορά και πριν το φύτευμα της καλλιέργειας	1
Βαμβάκι	>>	100-300	30-60	Πριν το φύτευμα της καλλιέργειας.	1
Καπνός				Ομοιόμορφος ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, σε έδαφος ψιλοχωματισμένο και απαλλαγμένο από τα ζιζάνια.	1
α) Ανατολικά καπνά και Virginia		200-300	20-40	α) Πριν τη μεταφύτευση, ψεκασμός σε γυμνό έδαφος.	
Καπνά Burley		300-400	20-40		
β) Ανατολικά καπνά		100	20-40	β) Κατά το παράχωμα ή «γέμισμα», με κατευθυνόμενο ψεκασμό του εδάφους μεταξύ των γραμμών.	
Καπνά Burley		200-300	20-40	Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται υπό συνεχή ανάδευση, με μπεκ τύπου σκούπας και με πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 atm.	

Παρατηρήσεις:

1. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο του σπόρου μέχρι τα 2-4 φύλλα.
2. Να μη γίνεται δεύτερη εφαρμογή τον ίδιο χρόνο.
3. Η εφαρμογή να γίνεται σε ποτισμένο έδαφος.
4. Το αμπέλι πρέπει να είναι ηλικίας άνω των τριών (3) ετών και να είναι υποστυλωμένο ή αναρριχώμενο, γιατί αν είναι σε πολύ μικρή απόσταση από το έδαφος υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας.
5. Για τις κράμβες και τη μελιτζάνα η μεγάλη δοσολογία εφαρμόζεται όταν ο πληθυσμός των ζιζανίων είναι μεγάλος και τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο ανάπτυξης.
6. Να χρησιμοποιείται μόνο στο κρεμμύδι που προορίζεται για παραγωγή ξηρών βολβών.
7. Στο κρεμμύδι να μην εφαρμόζεται με κρύο και υγρό καιρό.
8. Στον ηλιάνθο δόση μεγαλύτερη από 120 κ.εκ./στρ. δρα φυτοτοξικά.

9. Ζιζάνια

α) Καταπολεμούμενα ζιζάνια

Αγριοπαμπακιά (*Abutilon theophrasti*),
Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*),
Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*),
Αντράκλα (*Portulaca oleracea*),
Βερόνικα (*Veronica spp.*),
Δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*),
Ελευσίνη (*Eleusine indica*),
Ζωχοί (*Sonchus spp.*),
Ήρες (*Lolium spp.*),
Λουβουδιά (*Chenopodium album*),
Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*),
Μεγάλοβλήτο (*Amaranthus retroflexus*),
Μικρήτσουκνίδα (*Urtica urens*),
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*),
Οξαλίδα (*Oxalis pes-caprae*),
Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*),
Σετάριας (*Setaria spp.*), Στελλάρια (*Stellaria spp.*),
Στύφνος (*Solanum nigrum*),
Τάτουλας (*Datura stramonium*),
Φυσαλίδα (*Physalis spp.*)
Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis*)

Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*)
Τριβόλι (*Tribulus terrestris*)
Βέλιουρας από σπόρο (*Sorghum halepense*)
Αγριάδα (*Cynodon dactylon*)
Κύπερη (*Cyperus spp.*)

β) Ανθεκτικά ζιζάνια

Καλεντούλα (*Calendula arvensis*),
Λάπαθα (*Rumex spp.*)

10. Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα (SZ):

- SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
SZ3 Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν δέκα (10) μήνες από την

εφαρμογή του.

SZ4 Αποφεύγετε τη χρήση του σε οργανικά εδάφη.

SZ5 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

SZ6 Αν ρυπανθούν τα νερά άρδευσης να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση.

SZ7 Μην ψεκάσετε όταν φυσάει.

SZ8 Μη διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.

SZ9 Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

SZ10 Χρησιμοποιείτε μπέκ τύπου σκούπας.

SZ11 Μη το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.

SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορρυπαντικό.

II. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύουν οι αριθ. 58132/27-3-1998 και 126914/26-9-2005 αποφάσεις μας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ