



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Τ.Κ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Λ. Σωτηροπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 40 518
FAX: 210 92 12 090**

**Αθήνα 7 - 4 - 2005
Αριθ. πρωτ.: 122816**

Προς:
1) **AGROLOGY**
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 1089
57 022 - Σίνδος -
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(με απόδειξη)
2) **Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις**
α) Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/σεις Εμπορίου
Έδρες τους
3) **Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.**
Έδρες τους
4) **Μ.Φ.Ι.**
Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων
5) **Εσωτερική διανομή**
Τμήματα Β', Γ', Δ' & Ε'
Της Δ/σης μας

**ΘΕΜΑ: "Έγκριση οριστικής διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο)
PALLADIUM 5,5 EW".**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη¹:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί, και ειδικότερα το άρθρο 8².παρ. 2 και 3.
2. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων»,

¹ Μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με την περίπτωση

² Αλλάζει εκάστοτε ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. προσωρινή έγκριση, οριστική έγκριση κ.λ.π.)

όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.

3. Τη με αριθ. 93270/12-2-2003 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7675 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας μορφής και περιεκτικότητας σε δραστική ουσία φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) FELMON 5,5 EW.
4. Τη με αριθ. Υ132/11-10-2004 (1533/Β/14-10-2004) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό»
5. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού»
6. Τις από 20-11-2003 και 28-2-2005 αιτήσεις με το πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου της ενδιαφερόμενης εταιρείας AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο 8³ παρ. 2 και 3 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) PALLADIUM 5,5 EW³ με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης⁴

7745
7 - 4 - 2005
31 - 12 - 2009

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

PALLADIUM

1.2.β Μορφή⁵:

Εναιώρημα λάδι σε νερό (EW).

1.3 Δραστική ουσία (εξ)⁶

α) Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO⁷

Fenoxaprop-p-ethyl

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

95 % (β/β)
min

³ ορίζεται ανάλογα με την περίπτωση

⁴ Η έγκριση χορηγείται για διάρκεια πέντε (5) ετών και μπορεί να ανακαλείται εάν οι όροι για την απόκτηση της πάγουν να πληρούνται.

⁵ Κατά GIFAP π.χ. υδατοδιαλυτή σκόνη, (SP), υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) κ.λ.π.

⁶ Σε περίπτωσησκευασμάτων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, οι πληροφορίες θα επαναλαμβάνονται για την κάθε δραστική ουσία

⁷ Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοινή κατά ISO ονομασία της δραστικής ουσίας, δίνεται η χημική της ονομασία κατά IUPAC ή CA.

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

ANHUI FENGLE
AGROCHEMICAL CO.,
LTD – Κίνα.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.⁸

ANHUI FENGLE AGROCHEMICAL CO.,
LTD Changjiang West Road 727, Hefei, P. R.
China

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας
Fenoxarprop-p-ethyl όπως προσδιορίζονται
στα Έντυπα IVa, IVb της αίτησης με
ημερομηνία 20-11-2003 (Αρ. Πρ. ΥΓ
116542), τα οποία προέρχονται από τον
παρασκευαστή του δρώντος συστατικού και
παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης⁹:

AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
ΑΜΕ¹⁰:
Τ.Κ. 57 022
Τηλ.: 2310 796 556
Fax: 2310 796 506
E-mail

β) Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι
διαφορετικός από τον κάτοχο της
έγκρισης)¹¹:

Ο κάτοχος της έγκρισης.

γ) Παρασκευαστής του σκευάσματος

AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του
σκευάσματος¹²

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης: ANHUI FENGLE
AGROCHEMICAL CO., LTD – Changjiang
West Road 727, Hefei, P. R. China

⁸ Αναγράφεται η διεύθυνση του κατόχου του εργοστασίου. Τα στοιχεία που αφορούν την διεύθυνση του εργοστασίου παραμένουν στα αρχεία της υπηρεσίας.

⁹ Είναι ο αιτών και έχει έδρα σε κάποιο ΚΜ της ΕΕ.

¹⁰ Αριθμός Μητρώου Εταιρείας (ΑΜΕ). Δίδεται από την Αρμόδια Αρχή.

¹¹ Προκειμένου για εγκρίσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 8.2. του ΠΔ 115/1997 ως υπεύθυνος για την έγκριση κυκλοφορίας νοείται αυτός που υποβάλει την αίτηση για έγκριση (π.χ. αντιπρόσωπος)

¹² Προκειμένου για εγκρίσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 8.2. του ΠΔ 115/1997 ως εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος νοείται ο **τυποποιητής**

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος¹³

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57 022 - ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Fenoxarop-p-ethyl 5,5% (β/β)
Βοηθητικές ουσίες 94,03% β/β
Περιέχει τον αντιφυτοτοξικό παράγοντα fenchlorazole ethyl 3,5%.
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Έντυπο II της αίτησης με ημερομηνία 20-11-2003 (Αρ. Πρ. ΥΓ 116542) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2 Συσκευασία(ες) (σύνολο 9)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	250κ. εκ.	COEX, Αλουμίνιο
2	«	500	COEX, Αλουμίνιο
3	«	1 λίτρο	COEX, Αλουμίνιο
4	Δοχείο	3 λίτρα	COEX
5	«	5	COEX
6	«	10	COEX

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με 10-30 λίτρα νερό στο στρέμμα με πίεση 2,5 -3 ατμ. (38-45 PSI) και μπεκ τύπου σκούπα

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά τα 3/4 με νερό .Ανακινείστε καλά τη φιάλη συσκευασίας και προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό.

Ξεπλύνετε τρεις φορές τα κενά υλικά συσκευασίας και ρίξτε το νερό του ξεπλύματος στο δοχείο του ψεκαστικού.

Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση

Καθαρισμός ψεκαστήρα: -

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Προϊόν: Δεν επιτρέπεται να εναποθεθεί μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.

Κενές συσκευασίες: Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.

¹³ Προκειμένου για εγκρίσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 8.2. του ΠΔ 115/1997 ως εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος νοείται ο **συσκευαστής**

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μεταφυτρωτική καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων στο ΣΙΤΑΡΙ. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και μεταφέρεται στις ρίζες και τα ριζώματα.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής/ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ. εκ./ στρέμμα	κ. εκ.. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	
Σιτάρι	Ετήσια Αγρωστώδη ζιζάνια	125-150		10-30	Από το στάδιο των 2 φύλλων μέχρι και το σχηματισμό του δευτέρου κόμβου των ζιζανίων. Ειδικά στη φάλαρη συνιστάται να εφαρμόζεται μέχρι τα μέσα του αδελφώματος.

5.2 Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: --

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. **α) Δεν καταπολεμά τα ζιζάνια:**

Αγρόπυρο (*agropyron repens*)
Βρόμος (*bromus spp*)
Φεστούκα (*festuca spp*)
Αγριοκρίθαρο (*hordeum murinum*)
Δεματόχορτο (*imperata cylindrica*)
Ηρα (*lolium spp.*)
Κοινή πόα (*poa annua*)
Λεία λειβαδοπόα (*poa pratensis*)
Όλα τα κυπερώδη (*cyperaceae*)
και όλα τα πλατύφυλλα

β) Ευαίσθητα ζιζάνια:

Σετάρια (*setaria spp.*)
Τραχεία λειβαδοπόα (*poa trivialis*)
Αλεπονουρά (*alopecurus spp.*)
Αγριοβρώμη (*avena spp.*)
Φάλαρη (*phalaris spp.*)
Ανεμόχορτο (*apera spica-venti*)

2. Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια ξεπεράσουν το στάδιο του αδελφώματος καθώς επίσης και για την καταπολέμηση της φάλαρης.

3. Να μην ψεκάσετε όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες

<p>6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί</p>	<p>SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.</p> <p>SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.</p> <p>SZ5 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.</p> <p>SZ7 Μη ψεκάζετε όταν φυσάει.</p> <p>SZ8 Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μη αυξάνετε τις δόσεις.</p> <p>SZ11 Μη το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.</p> <p>SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα, με νερό και απορρυπαντικό</p> <p>Συνδυάζεται με diclofor-methyl, για ταυτόχρονη καταπολέμηση και του LOLIUM SPP. (ήρα).</p> <p>Για ταυτόχρονη καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων συνδυάζεται με bromoxynil octanoate, ioxynil octanoate, mecoprop Εστέρα, MCPA Εστέρα, chlorsulfuron και metsulfuron-methyl.</p>
---	--

<p>7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:</p> <ul style="list-style-type: none"> - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα 	<p>--</p> <p>SZ3 Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 30 ημέρες από την εφαρμογή του ή προκειμένου για σιτηρά 120 ημέρες</p> <p>SO5 Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή και μη χρησιμοποιείτε ψεκασμένα φυτά για διατροφή ζώων</p>
--	---

<p>8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.</p>	<p>Δεν είναι φυτοτοξικό στο σιτάρι, στη σίκαλη και στο triticale. Είναι φυτοτοξικό για τα υπόλοιπα σιτηρά</p>
--	---

<p>9 Σήμανση σκευάσματος:</p>	<p>Xi – Ερεθιστικό</p> <p>N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον</p>
--------------------------------------	--

<p>10 Φράσεις R</p>	<p>R38 Ερεθίζει το δέρμα.</p> <p>R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.</p> <p>R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.</p> <p>R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.</p>
----------------------------	--

11 Φράσεις S

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από τα παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε
S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S37/39 Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο
S61 Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων.

Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

- S63** Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής: απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε γιατρό αν χρειασθεί.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)¹⁴

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Σιτάρι	0,02*

* Όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
--	--

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος¹⁵.

Στην αρχική, κλειστή συσκευασία του σε ξηρό χώρο και σε θερμοκρασία 5-30° C διατηρείται σταθερό για 2 (δύο) χρόνια.

¹⁴ Ορίζονται μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται εθνικά ή κοινοτικά MRLs ή τα υφιστάμενα δεν ικανοποιούν την εγκρινόμενη Ορθή Γεωργική Πρακτική. Στις περιπτώσεις που έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs αναγράφεται η φράση: «Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs».

15 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες --

16 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Οι κάτοχοι των εγκρίσεων είναι υποχρεωμένοι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Οι κάτοχοι των εγκρίσεων θα πρέπει να διατηρούν συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση
4. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ

¹⁵ Η ημερομηνία λήξης θα αναγράφεται στην ετικέτα εάν είναι μικρότερη των δύο (2) ετών