



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 23 - 1 - 2008

Αριθ. πρωτ.: 114781

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 17671 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Γ.Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 9212164**

ΠΡΟΣ: ΙΝΑΓΚΡΟ ΕΠΕ

**Καπετάν Μητρούση 4,
546 46 - Θεσσαλονίκη
(με απόδειξη)**

- ΚΟΙΝ.:** 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γεν. Γραμ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο **(με e-mail)**
Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους **(με e-mail)**
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης
Έδρες τους **(με e-mail)**
6) Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/σής μας
7) Γραμματεία της Δ/σής μας

**ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (ζιζανιοκτόνο)
FENOXAROP-P-ETHYL
INAGRO 5.5 EW”**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β (παρ. 1).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) Απόφασή μας, όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3.9.2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ καθώς και τη με αριθ. 108114/30.7.2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8.8.2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 123942/13-12-2006 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7806 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) FENOFARM 5.5 EW.
6. Το με αριθμ. 123951/14-6-2005 μας στο οποίο αναφέρονται τα εθνικά ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας fenoxarop-p-ethyl.
7. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α’).

8. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Εντολή Υπουργού”».
9. Τις από 8-11-2005 και 4-1-2008 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 4-1-2008 πρωτόκολλο εξέτασης φακέλου της εταιρείας **ΙΝΑΓΚΡΟ ΕΠΕ**.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Χορηγούμε στην εταιρεία **ΙΝΑΓΚΡΟ ΕΠΕ** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **7840** του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** FENOXAPROP-P-ETHYL INAGRO 5.5. EW.
- 2. Μορφή:** Εναιώρημα λάδι σε νερό (EW).
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** Fenoxa-prop-p-ethyl 5.5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 94.35 % β/β
Περιέχει αντιφυτοτοξικό παράγοντα Fenchlorazole ethyl 2.30% β/β
- 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία : 95% min
- 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο:** Hangzhou Udragon Chemical Co., Ltd., Κίνας.
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. : Hangzhou Udragon Chemical Co., Ltd., Κίνας (η Δ/ση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στην Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και είναι εμπιστευτική).
- γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο. :** Όπως προσδιορίζονται στο σημείο ζ (ΕΝΤΥΠΙΑ IVa, IVb και V) της αίτησης με ημερομηνία 29-11-2007 και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης :** ΙΝΑΓΚΡΟ ΕΠΕ , Καπετάν Μητρούση 4, 546 46, Θεσσαλονίκη
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας : -
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση : Ο κάτοχος της έγκρισης.
- 7. α. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ΙΝΑΓΚΡΟ ΕΠΕ, Καπετάν Μητρούση 4, 546 46, Θεσσαλονίκη.
β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Zhejiang Changxing Zhong Shan Chemical Industry Co., Ltd. Κίνας
- 8. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ-ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη.
- 9. Συσκευασία: 9α. Είδος-Μέγεθος:** α.1 Φιάλες των 250, 500 κ.εκ. και 1 λίτρο
: α.2 Δοχεία των 3 (τριών), 5 (πέντε) και 10 λίτρων.
9β. Υλικό συσκευασίας: β1. COEX, Αλουμίνιο
β2. COEX
- 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:**
Μεταφυτρωτική καταπολέμηση αγροστωδών ζιζανίων στο σιτάρι.
Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και μεταφέρεται στις ρίζες και τα ριζώματα.
- 11. Τρόπος εφαρμογής:**
Ψεκασμός φυλλώματος με 10-30 λίτρα νερό στο στρέμμα με πίεση 2.5-3 ατμ. (38-45 PSI) και μπεκ τύπου σκούπας.
- 12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά τα 3/4 με νερό. Ανακινείστε καλά τη φιάλη συσκευασίας και προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό. Στην περίπτωση που αδειάζει η φιάλη, τότε ξεπλύνετε τρεις φορές και ρίξτε το νερό του ξεπλύματος στο δοχείο του ψεκαστικού.

Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./στρ.)	Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.)	ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Σιτάρι (σκληρό και μαλακό)	Αγρωστώδη ζιζάνια	125-150	10-30	Από το στάδιο των 2 φύλλων μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου των ζιζανίων. Ειδικά στη φάλαρη συνιστάται να εφαρμόζεται μέχρι τα μέσα του αδελφώματος.	1

Παρατηρήσεις:

1. α) Δεν καταπολεμά τα ζιζάνια:

Αγρόπυρο (*agropyron repens*)
 Βρόμος (*bromus spp*)
 Φεστούκα (*festuca spp*)
 Αγριοκρίθαρο (*hordeum murinum*)
 Δεματόχορτο (*imperata cylindrica*)
 Ηρα (*lolium spp.*)
 Κοινή πόα (*poa annua*)
 Λεία λειβαδοπόα (*poa pratensis*)
 Όλα τα κυπερώδη (*cyperaceae*)
 και όλα τα πλατύφυλλα

β) Ευαίσθητα ζιζάνια:

Σετάρια (*setaria spp.*)
 Τραχεία λειβαδοπόα (*poa trivialis*)
 Αλεπονουρά (*alopcurus spp.*)
 Αγριοβρώμη (*avena spp.*)
 Φάλαρη (*phalaris spp.*)
 Ανεμόχορτο (*apera spica-venti*)

2. Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια ξεπεράσουν το στάδιο του αδελφώματος καθώς επίσης και για την καταπολέμηση της φάλαρης.

3. Να μην ψεκάσετε όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.

4.Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα (SZ):

SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

SZ2 Χρησιμοποιείστε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

SZ3 Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 30 ημέρες από την εφαρμογή του ή προκειμένου για σιτηρά 120 ημέρες.

- SZ5 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
SZ7 Μην ψεκάσετε όταν φυσάει.
SZ8 Μην διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
SZ11 Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνίσταται.
SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στο σιτάρι, στη σικάλη και στο triticale. Είναι φυτοτοξικό για τα υπόλοιπα σιτηρά.

15. Συνδυαστικότητα:

Συνδυάζεται με diclofor-methyl, για ταυτόχρονη καταπολέμηση και του Lolium spp. (Ηρα).
Για ταυτόχρονη καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων συνδυάζεται με bromoxynil octanoate, ioxynil octanoate, mecoprop Εστέρα, MCPA Εστέρα, clorsulfuron .

16. Σήμανση τοξικότητας: Xn - Επιβλαβές N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

- R22** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
R65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

- R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από τα παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.
S37/39 Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε γιατρό αν χρειασθεί.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επι 15 λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

- S60/61** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή την συσκευασία του.

S05 Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή και μην χρησιμοποιείτε ψεκασμένα φυτά για διατροφή ζώων.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής , για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):

A1 Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

A2 Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):-

Π1-Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: --

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική, κλειστή συσκευασία του σε ξηρό χώρο και σε θερμοκρασία 5-30°C διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ

